

14. DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO 2

DURATA : 05:25

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO


Questo video esplora in profondità i diversi strati dell'occhio, in particolare il canale di Cloquet, l'umore acqueo, l'umore vitreo e lo sviluppo del cristallino dall'ectoderma. I concetti chiave includono l'importanza dell'invaginazione nella formazione del cristallino e la distinzione tra le parti anteriore e posteriore dell'occhio, comprendenti la vescicola del cristallino e la retina. Svelando le connessioni tra le strutture oculari, il video mette in luce complessi processi embriologici che arricchiscono la pratica dei terapisti e la loro comprensione delle patologie oculari.

I DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO

Rimane un **sottile canale** nell'occhio, chiamato **canale di Cloquet**. Questo canale è un residuo nell'umore vitreo.

L'**umore acqueo** e l'**umore vitreo** sono due tipi di umori presenti nell'occhio. L'umore vitreo può essere immaginato come un **pallone d'acqua gelatinosa** che galleggia nell'occhio, con al suo centro un sottile canale che si connette direttamente al **cristallino**. Questo canale è anche legato al **nervo ottico** o al **canale ialoide**.

Il cristallino deriva dall'**ectoderma** di superficie. Durante la quinta settimana di sviluppo, un'**invaginazione** forma una **vescicola cristallina** circondata da **mesenchima vascolarizzato**. La placode si invagina per diventare il cristallino, un processo simile a quello della formazione del **tubo neurale**. Questo movimento lascia uno spazio all'interno, che diventa il cristallino.



Formation du cristallin

FIG. — Invaginazione dell'ectoderma

Il cristallino subisce un'evoluzione che forma delle **linee primitive**. È essenziale comprendere come si sviluppa come un tubo neurale per diventare la lente dell'accomodazione.

La **fessura colobomatica** presenta una linea che, con le arterie, darà il canale di Cloquet. Questo canale si chiude con l'**arteria** e la **vena ialoide** che si trovano al centro. La vescicola cristallina primaria evolve per diventare una vescicola cristallina secondaria con la placode.

All'esterno, lo strato formato è la **sclera**, che costituisce la prima calza. La **coroide** forma la seconda calza, collegando il cristallino. L'occhio può essere diviso in due parti: **anteriore** e **posteriore**. La parte anteriore si divide in **camera anteriore** e **camera posteriore**.

La **congiuntiva** e la **cornea** sono in continuità, la cornea essendo trasparente e in continuità con la sclera. La coroide, chiamata anche **UV** (dal latino *uva*, che significa uva), è una pelle ricca di vasi sanguigni. Si divide in tre parti: la coroide, la cornea anteriormente, e l'**iride** posteriormente, che è una continuità della coroide.

L'**iride** è mantenuta da un **legamento sospensore** e da **muscoli ciliari**.

Infine, la **retina** è lo strato più interno dell'occhio. Essa deriva dalla prima vescicola, la **vescicola ottica primaria**, che si sviluppa formando una struttura a forma di calice. La retina è composta da due strati, interno ed esterno, ed è qui che si verifica un **distacco della retina**.

