

09. 一般的なことの続き

所要時間 : 05:52

学習シート

コース概要

このビデオは、胚発生の基本的な側面、特に「形態形成場」の概念と、物質を伴わないエネルギーの重要性について解説しています。メカノトランスダクション、極性、熱や光などのさまざまな環境要因といったメカニズムが探求されます。細胞の位置がその分化にどのように影響するか、また外胚葉、内胚葉、中胚葉由来の組織を含む胚組織間の違いについて学びます。ビデオは、あらゆる治療実践にとって深く不可欠な胚発生の段階の概要で締めくくられます。

胚発生の概要

胚発生の可能性は、「形態場」に例えられます。これは、物質のないエネルギーを含む仮説的な場を表す表現です。この概念は複雑で、核レベルでの影響、テンセグリティ、マトリックスの重要性などの要素を含みます。

私たちは、単純な電磁場を超えるメカニズムを検討してきました。温度、熱、機械的ストレス、静水圧、電場、酸化還元システムなどの要因はすべて、システムのホメオスタシスにおいて重要な役割を果たします。

素粒子の存在、電磁エネルギー、分極した人間、電磁場、マクスウェルの法則、そして空間と時間の概念も不可欠です。光も考慮すべき重要な要素です。

細胞分化

多数の細胞はどのように分化するのでしょうか？私たちは、わずかな変化でさえメカノトランスダクションに関連していることを観察しました。

かなりの光の入力はパラメーターを変更します。電場が存在する場合、常に電磁場が存在し、これがシステムの凝集性を確保し、参照を提供します。したがって、特定の場所にある細胞は、別の細胞と同じ空間参照を持ちません。

細胞の遺伝的遺産は、すべての細胞が最初は同じ遺産を持っているにもかかわらず、異なる時点で異なる発現をします。細胞層は、正中線と電場に対する年代順と場所に応じて、異なる空間と時間で発現します。

電磁場は情報を提供します。この場に対する位置が情報を解放します。酸性度のような他のパラメーターも関与していますが、極性が最初の非常に重要な主要な構成要素です。

起源と局在

極性、**年齢**、そしてこれらの力はどこから来るのでしょうか？それらは私たちのずっと前から存在し、私たちの後も存在し続けるでしょう。

光のように集中した**振動物質のエネルギー**は、物質、流体、電気、そして**緻密化**を誘発し、その後消散します。ある細胞が**肝臓**になり、別の細胞が**脳**になるのは、その**局在**です。空間と時間におけるこの局在が分化を決定します。

細胞の塊が移動して再分化することもあります、それは発生の時期によります。

組織と胚性派生

これで、**上皮組織**と**結合組織**の違いをよく理解できました。また、**外胚葉**、**内胚葉**、**中胚葉**の組織を区別することもできます。

舌を例にとりましょう。舌には**筋肉**（中胚葉）が含まれ、上皮組織で覆われています。これは**内胚葉組織**（上皮）と**中胚葉組織**（筋肉）の混合物です。

膵臓は内胚葉の派生です。すべてのホルモン構造は上皮組織、別名**エミン組織**から派生します。言い換えれば、**外分泌腺**であろうと**内分泌腺**であろうと、すべての**腺**は常に上皮組織から発生し、外胚葉または内胚葉から派生し、中胚葉からは決して派生しません。

起源を明確にした今、これは覚えておくべき重要な点です。**神経頭蓋**、**内臓頭蓋**、**頭蓋底**は、神経頭蓋と内臓頭蓋の間のバランスを表しています。

胚発生の段階

組織の派生は最初の3週間で形成されます。3週目の初めには、プロセスはかなり進んでいます。発生を3つの大きな期間に分けることができます。

- **胚発生**の自由期間。
- **器官形成**の自由期間。
- **周産期**の自由期間（2ヶ月間）。

2〜3ヶ月で、すべての**高貴な構造**はすでに形成されています。その後は、主に**成熟**と**成長**です。

成長の概念と、**運動性**が常に体内に存在する動きであり、発生システムによって定義されるという事実を強調することが不可欠です。この動きは、さまざまな状況で複雑になります。

成長と**自己発生の範囲**は基本的なプロセスです。