

# 11. 受精

所要時間：14:26

学習シート

## コース概要

このセッションでは、受精のプロセス、排卵から卵母細胞による精子の受容までを深く掘り下げます。卵巣の可動性、受精に対する自然な障壁、ZP3による膜認識の概念が、生殖の複雑なダイナミクスを理解するために議論されます。このセッションでは、体外受精技術の意味合いにも焦点を当て、母と子の間の本質的な感情のおよびエネルギー的つながり、ならびにホリスティックな健康のために個人の歴史を知ることの重要性を強調します。

## 受精

### 排卵と卵巣の可動性

**排卵**は極めて重要なプロセスであり、**卵巣の可動性**を理解することが不可欠です。卵巣の卵管采は、このメカニズムにおいて重要な役割を果たします。

小骨盤、子宮、卵巣の解剖学的構造は複雑です。そこには、**広靱帯**、**円靱帯**、**腰卵巣靱帯**といった構造があり、これらはすべて同じ組織で構成されています。

子宮の発生学と解剖学は、子宮が**後壁腹膜**のひだであることを示しています。この構造は、**卵母細胞**を捕捉するために可動性が必要です。この捕捉には、運動性に関連する半球状の動きが必要です。

消化器系を考えると、**トル筋膜**は後壁腹膜に付着しています。例えば、**虫垂炎**の場合、エネルギーの喪失や筋膜の乱れが卵巣の可動性に影響を与え、卵母細胞の捕捉を妨げる可能性があります。

受精を可能にするためには、腹膜が自由でなければなりません。卵母細胞が捕捉されない場合、骨盤腔内に留まり、危険な**子宮外受精**を引き起こす可能性があります。膣と腹腔の間には直接的なつながりがあり、この可動性の重要性を強調しています。

### 受精に対する自然な障壁

男性の場合、**ミューラー管**と**ウォルフ管**のために生殖器構造間の接続がないため、受精は複雑です。

女性の場合、いくつかの自然な障壁が存在します。最初の障壁は**膣の酸性度**であり、不要な細菌を破壊するのに役立ちます。次に、子宮頸部にある**粘液栓**が重要な役割を果たします。この栓は月に一度開き、精子が通過できるようにします。開かない場合、通過はブロックされます。

子宮に入ると、精子は前進を助ける**繊毛**の中を移動しなければなりません。精子は熱、糖、電気信号に引き寄せられます。しかし、成功するのは1つの精子ではなく、卵母細胞に到達する精子の集団です。

## 膜認識：ZP3

精子が卵母細胞に到達すると、**卵母細胞**が精子を受け入れる準備ができている最適な領域に到達する必要があります。卵母細胞の膜には、認識の鍵として機能する**ZP3**と呼ばれる**糖タンパク質**があります。

この膜認識は不可欠です。それが失敗すると、受精は起こりません。

## 体外受精とその影響

**体外受精**（IVF）は一般的な方法であり、特に**ICSI**（卵細胞質内精子注入法）では、精子が卵母細胞に直接注入されます。この技術は自然な認識を迂回するため、長期的な不妊症の問題を引き起こす可能性があります。

IVFで生まれた子供は合併症を示すことがあります。診察時には、妊娠について、特に流産の可能性について質問することが重要です。子宮はこれらの出来事に関連する残留エネルギーを帯びている可能性があり、エネルギー的な浄化が必要です。

子供を認識し、母親と子供の間に絆を築くことが不可欠です。母親は、このつながりを促進するために、子供と身体的および感情的な接触を確立する必要があります。

## 自分の歴史を知ることの重要性

自分の歴史を知るとは根本的です。例えば、精子提供によって生まれた子供は、自分の起源を知らずに、嘘を抱えている可能性があります。組織は嘘をつかず、オステオパシー医は手を通してこの真実を感じることができます。

## 卵母細胞の極性化の役割


**卵母細胞**は極性化しています。精子が到着すると、卵母細胞の軸が再編成され、背腹軸と頭尾軸が形成されます。この象徴的な瞬間は、原始的な心臓とのつながりです。

## 卵母細胞膜への攻撃

精子は**透明帯**に到達するためにいくつかの層を通過しなければなりません。膜に到達すると、膜認識が起こらなければなりません。結合に成功した精子は、アクロソーム酸を放出し、卵母細胞への侵入を可能にします。

## 最初の生命細胞

2つの細胞の遺伝的遺産の出会いによって、最初の生命細胞が形成されます。この動的なプロセスは、最初の2つの**割球**、つまり最初の生殖細胞である母細胞を生み出します。



図一 受精卵

極性と胚発生の初期段階に関するこの研究は、生命の基礎を理解するために不可欠です。