

13. 胚盤葉の移動

所要時間 : 01:12

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚盤胞が卵管を通して子宮に移動し、4日目から6日目の間に子宮に着床する過程を探ります。このプロセスには、母体の熱を求めることが含まれ、それが胚盤胞を最適な着床部位、通常は子宮の前部に導きます。子宮内膜は受容的になり、膨らみ、この発生の重要な段階にある接合子にとって不可欠な熱、糖、酸素などの必須栄養素を提供する準備をします。

胚盤胞の移動

私は今、**卵管**の中を進んでいます。この道を通り、**4日目から5日目頃**、そして**6日目頃**には、徐々に子宮に到達します。

その間、私は成長しました。**栄養細胞**はまだありますが、今は新しい段階に入っています。


この段階で私に必要なものは何でしょうか？**母の温かさ**が必要です。だから、私は暖かい場所に定着しに行きます。通常、**子宮の前部**、**膀胱**に近い場所に定着します。この領域はより暖かいからです。

私は**子宮粘膜**を探します。子宮粘膜はどうなっていたのでしょうか？とても居心地の良い状態になっています。膨らんで、たくさんの**腺**を作り、**血液**で満たされて、とても暖かくなっています。

接合子は子宮に到着します。そこにいます。そして、私、接合子は何を必要としているのでしょうか？**熱**、**糖分**、**電解質活動**、そして将来の発生のための初期の**酸素**が必要です。

休憩の後、**着床**の瞬間について説明します。


I 'eclosion



**Trophectoderme mural
synthetise la strypsine**

MCI

ZP



図一 胚盤胞の孵化