

39. 動きの要約

所要時間 : 05:02

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の動きの核心に迫り、電気軸と電磁軸が成長速度の差を確立する上で果たす極めて重要な役割を詳述します。脊索形成プロセスがどのように脳化を開始し、消化管や心臓系などの必須構造の発達に影響を与えるかを学びます。心臓、脳、その他の臓器間のダイナミクスをよりよく理解するために、触診と異なる胚層間の相互接続の概念を探索します。胚を形作る複雑な相互作用に光を当てるこの豊かな統合をお楽しみください。

動きの概要

軸の確立と分化成長

初期プロセスには、**電気軸**と**電磁軸**の確立が含まれます。この軸は、徐々に**分化成長速度**を組織化します。

この成長速度は、システムに組み込まれた**アルゴリズム**として機能し、ある時点で**脊索**の正確な「ホラ」（波）を引き起こします。

脊索および中胚葉プロセス

脊索プロセスが形成され、同時に**側方中胚葉**プロセスの確立を可能にします。同時に、**対称性**が確立され始めます。

頭蓋底、正確には将来の**蝶形後頭軟骨結合**のレベルに**支点**が出現します。この支点は、**仙骨**の発達の可能性によって支えられています。

脳化と同時発達

この発達は**脳化**の始まりを示します。脳化は**心臓化**を誘発し、それが**横隔膜化**、そして**肝臓化**を引き起こします。

後方の成長は**気化**を引き起こし、その後、後方の**副腎化**などが続きます。

脳の進化と重要なポイント

頭部成長の段階で、**モンロー孔**が側方に開き、**脳室系**を解放します。このプロセスは脳化と**皮質化**を伴います。

後方神経管形成が再出現し、**島**と呼ばれる重要なポイントに依存します。

根本的な静止点は脊索の先端のままです。しかし、脳内では、**島**が発達にとって不可欠な支点であり、転換点となります。

上昇と下降の動き

上昇プロセスと**下降**プロセスが発達全体を組織化します。これら2つの動きは相互に依存しています。

脳化が起こると、同期した事象が発生します。

- **消化管**の発達
- **心臓管**の発達
- **肺管**の発達

この管の上昇と下降は極めて重要です。これらの現象を可能にする最も重要な領域は、**心臓**と母親との関係です。

脊索、神経板、および心臓前領域

脊索は、胚の前方に**神経板**の形成を誘発します。2つの**流体経路**が生成されます。

これらの経路は上方に巻き上がり、**心臓前領域**を形成します。

触診の深さとヒッチポイント

考慮すべきさまざまな**触診の深さ**があります。

1. **ヒッチポイント（支点）の触診**：脳の発達に関連しています。
2. **脳の触診**：その位置と発達のダイナミクスに関連しています。
3. **純粋な発達**：心臓、肝臓、消化器系との関係に関するものです。

深さの観点から、いくつかの層を特定できます。

- **表層領域**：髪の毛、次に皮膚と骨との接触。
- **第一層**：骨のすぐ後ろにある**硬膜内臓層**。
- 脳を保護する**液体層**。
- **皮質層**：その動きを感じるため。
- **核**：さらに深く降りていくと。
- **脳室平面**：主に側方。

