

30. 腹膜の特性

所要時間：04:49

学習シート

コース概要

このビデオでは、過小評価されがちな腹膜を、活動的でダイナミックな器官として探求します。この教育では、腹腔内液の可動性におけるその本質的な機能、胚発生学的統合におけるその役割、および生体内での分子交換への関与が強調されています。細胞の連続性とホメオスタシスの概念が深掘りされ、腹膜レベルでの相互作用が、アレルギー反応などの遠隔免疫応答をどのように引き起こすかを示しています。腹膜と喘息などの一見無関係な症状との関連性に関する貴重な洞察は、このビデオをあらゆる身体療法専門家にとって不可欠なものにしています。

腹膜の特性

腹膜は、**腹腔内液の受動的**かつ一定の**可動性**において不可欠な役割を果たします。また、特に腹膜固定の場合には歩行にも関与します。上肢と下肢は、この腹膜嚢の**拡張**と見なすことができます。この領域で起こることは、他の領域での発達を反映している可能性があり、**細胞的**、**組織的**、**分子的**、さらには**エネルギー的**な**連続性**を示しています。

腹膜を**活動的な臓器**と見なすことが重要です。腹膜は**免疫防御能力**を持ち、分泌と吸収に応じて**組織ホルモン**、例えば**プロスタグランジン**を放出します。これは、**脳脊髄液**の量に近い一定の液体量を維持しようとすることを意味します。

外部細胞塊から**内部細胞塊**への統合は、**神経管**の統合と同様のダイナミクスで進行します。これは、**羊水**の神経管への統合と、**卵黄嚢外液**の腹膜系への統合に例えることができます。このプロセスは**28日目**頃に完了し、腹膜の体積は、脳と腹膜の両方で**恒常性型**の静水圧平衡を確保するために**一定**を維持しようとしています。

腹膜は分子交換にも関与しています。腹膜には**間葉系細胞**が含まれており、これらは前索板を超えて**心膜**と**横中隔**になります。これらの細胞は、胚の全体的な動き、特に**卵黄嚢**と相互作用する心臓の発達中に統合されます。この統合プロセスは**22日目**から**28日目**の間に起こります。

腹膜は**細動脈**が豊富な臓器であり、血漿と**浸透圧的**に交換し、**細胞内植物**の状態に関する情報を提供する滲出液を供給します。腹膜は、その間質液を介して、周囲の臓器の消化および代謝状態に関する情報を常に受け取っています。

マクロファージ、**多形核白血球**、**肥満細胞**などの**中皮細胞**は、腹膜レベルでの防御反応において重要な役割を果たします。**免疫グロブリンE (IgE)** に敏感な肥満細胞は、アレルギー反応や喘息反応に関与しています。例えば、腹膜レベルでの感染性攻撃は、喘息反応のように遠隔で現れる**肥満細胞脱顆粒**を引き起こす可

能性があります。

腹膜レベルでの免疫バリアの機能不全は、望ましくない高分子が通過することを可能にし、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。例えば、牛乳アレルギーは、感染源が最初は腹膜であったとしても、喘息反応を引き起こす可能性があります。

外部組織と見なされる消化管も、アレルゲンに対する反応として、喘息や気管支炎などの症状によって問題を表すことがあります。**気管支拡張薬**や**抗生物質**などの治療法は症状を緩和することができますが、根本的な原因を常に解決するわけではありません。その原因は、イチゴなどの食品に対する単なるアレルギーである可能性があります。