

32. MEP 消化管 2: 胃、腔の停止、大網

所要時間: 17:08

学習シート

コース概要

このビデオでは、胃と腹膜環境に焦点を当て、消化管のメカニズムと組織を深く掘り下げて探求します。有機的な発達、胃の回転、血管の相互作用といった概念が絡み合い、これらの要素が消化と消化器の健康にどのように影響するかを説明します。骨盤臓器のホルモン影響を考慮に入れながら、横隔膜と食道の緊張を解放することで、胃の機能不全を効果的に治療する方法を学びます。胃と腹膜の内部ダイナミクスを深く理解することは、患者の健康を改善したいと願うすべてのセラピストにとって不可欠です。

消化管のメカニズムと組織：胃と大網

胃の**内臓腹膜**は、**左葉**と**右葉**に分かれています。壁側腹膜と内臓腹膜、そして肝臓腹膜は、腹腔の組織化において重要な役割を果たします。

小網は、胃肝靱帯とも呼ばれ、左葉に位置しています。この胃内臓腹膜の右葉は、胃のダイナミクスを理解するために不可欠です。

臓器の発達

肝臓のような臓器の発達は、血管系を介した**栄養素**と**情報**の供給によって影響を受けます。肝臓はエンジンのように機能し、肝臓-胃-脾臓腔内の他の臓器の動きを組織します。この動きは通常、**時計回り**です。

腹腔動脈幹は、重要な血管組織の中心です。これには、胃動脈、冠状動脈、脾動脈が含まれ、それぞれ胃と脾臓に栄養を供給します。

胃の動き

胃は、肝臓の成長に影響される**回転**運動をします。この動きは、**後胃嚢**、別名大網嚢を形成し、胃の適切な機能に不可欠です。この嚢は、胃が自由に動き、**混合**と**消化**を促進することを可能にします。

複数の葉の結合によって形成される大網は、胃、脾臓、脾臓を結びつける重要な組織です。それは胃の**解放**に役割を果たし、適応の空間を構成します。

腹膜の重要性

腹膜は、すべての臓器に関する情報を含む膜であり、リンパ器官として機能します。感染の場合、免疫細胞を動員して患部を浄化します。

後胃囊は、前後の胃腹膜を結びつける重要な胚性支持点です。この組織は、心臓や肺を含む周囲の臓器の適切な機能に不可欠です。

胃の治療と解放

胃を治療するためには、**滑り**の空間を回復させ、横隔膜と食道の緊張を解放することが重要です。**ヒス角**によって表現される胃内緊張は、胃の機能を改善するために働きかけることができます。

骨盤臓器が胃に与える影響も考慮することが重要です。小骨盤のホルモンバランスの乱れは、胃の機能に影響を与える可能性があります。

結論

さまざまな臓器間の相互作用と腹腔内でのそれらの組織を理解することは、胃の機能不全を効果的に治療するために不可欠です。緊張の解放と臓器の適応は、良好な消化器の健康を維持するための重要な要素です。