

19. 静脈系：ノート

所要時間：07:29

学習シート

コース概要

このビデオでは、静脈系の重要な役割について深く掘り下げ、脊椎神経叢とその神経系との関連、および身体の健康にとって効果的な静脈ドレナージュの重要性などのトピックを取り上げます。頸部痛や骨盤の不調などの慢性的な痛みを引き起こす可能性のある静脈圧迫を特定し、解放する方法を学びます。さらに、腹圧と横隔膜機能が循環バランスにどのように影響し、感情的および身体的幸福に直接的な影響を与えるかを説明します。リンパおよび静脈ドレナージュを改善するための実践的なテクニックも説明され、これらの知識を治療実践に適用できるようになります。

静脈系

椎骨神経叢と神経系

神経学的には、**椎骨神経叢**はいくつかの重要な部分で構成されています。

- 深部脊髄系。
- 硬膜と硬膜静脈洞の間に位置する**椎骨内静脈系**。
- **椎骨外静脈叢**。
- 頭蓋骨に特有の**板間静脈系**と**導出静脈**。




Figure 12. Rapports des plexus vertebraux. Référence (36), p 116.

図一 椎骨神経叢

また、**脊髄神経叢**と**内側神経叢**、特に**翼突筋静脈叢**も存在し、うっ血の部位となることがあります。このシステムを解放することを学ぶことは非常に重要であり、うっ血の場合には安全弁として機能します。

慢性的な頸部痛や**急性斜頸**の場合、多くは静脈の圧迫が原因です。神経内（神経周膜、神経内膜、神経上膜）の小さな血管が血液で充満し、神経系を圧迫することがあります。この場合、私たちの役割はこれらの領域を**減圧**することです。

椎間板症は、**静脈うっ滞**が**サイトカイン**を放出し、システムを破壊する酸性度を生み出すときに発生します。圧力を再調整することが最も重要です。**硬膜静脈洞**は椎骨神経叢と連続しており、**仙骨**の可動性が頭痛に影響を与える可能性があります。


静脈ドレナージと頭蓋静脈洞

静脈血は**頭蓋静脈洞**に向かいます。具体的には、**直静脈洞**、**上矢状静脈洞**、**下矢状静脈洞**、**直静脈洞**、**横静脈洞**です。

これらのシステムは**第四脳室**、特に**マジャンディ孔**と関連しており、これは**脳脊髄液（LCR）**システムの拍動に参与する開口部です。血管系を末梢から深部へと解放することで、血管領域が再開され、システム全体が再ドレナージされます。

このドレナージは**頸動脈、椎骨動脈**、および椎骨神経叢を介したすべての静脈洞から行われ、自由な仙骨が直接関与します。

骨盤静脈と下肢の機能的単位



図一 ヒトの静脈系

骨盤静脈と**下肢**の静脈は機能的な単位を構成しています。下肢（足、膝、骨盤）の不均衡は**泌尿生殖器系**に影響を与えます。

例えば、歩行は**ルジャー足底**と、横隔膜のように機能する**舟状骨-立方骨関節**のおかげでドレナージを活性化します。女性の小骨盤の障害の場合、この還流力を回復するために足をチェックし解放することが不可欠です。そうしないと、うっ滞が発生する可能性があります。

うっ血と側副路




Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne.
Référence (37).

図一 内腸骨静脈

下肢の痛みは、泌尿生殖器系に起因しない**神経圧迫**に関連している場合があります。一部の**循環側副路**は、生理的条件下で退行する胎児状態の再出現です。

子宮後屈は頻繁なうっ血を引き起こす可能性があります。**静脈弁**の貧弱さは双方向の循環を促進し、うっ血の場合に血液が方向を変えることを可能にしますが、局所的なうっ滞領域（前立腺など）を作り出す可能性もあります。

腹圧は静脈血の経路に影響を与えます。この圧力の増加は、血液を椎骨神経叢に導き、椎骨のうっ血や消化器系の**腰痛**を引き起こす可能性があります。肝臓を軽減し、動的平衡を回復するために圧力を再調整することがしばしば必要です。

静脈循環障害の影響




Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

図一 骨盤の血管 後面図

静脈循環障害は、複数の症状の原因となる可能性があります。

- 持続的な深部性交疼痛。
- 月経困難症。
- 便秘。
- しぶり腹。
- 全身症状（倦怠感、抑うつ傾向、感情的過敏性）。

横隔膜ポンプとリンパドレナージ

大きな鍵は横隔膜ポンプにあります。これは血管系、動脈系、リンパ系の両方に作用します。血管系の発達
は毛細血管に血圧を発生させ、細胞間ネットワークに滲出液を生成します。このネットワークは、特に縦方
向の新しい経路を形成します。

乳び槽（またはキール槽）は非常に重要なネットワークであり、左鎖骨下窩での大量の再吸収を担っていま
す。大腰筋は、腎周囲筋膜のおかげで、その動きによって1日あたり最大1.5リットルのリンパを排出します。

大腰筋は毒素を保持する可能性のある厚い器官です。毒素過負荷はそれをブロックし、腹膜から静脈系およ
びリンパ系への毒素の放出を妨げることがあります。首の小さな筋肉である肩甲挙筋は、大腰筋と同様の構
造を持ち、毒素の再吸収にも関与しています。


7つの横隔膜

私たちは、身体にとって重要な**7つの横隔膜**が存在すると考えています。

1. 足
2. 膝
3. 小骨盤
4. 胸腹横隔膜
5. 小脳と頭蓋底との平衡
6. 頭頂骨
7. LCRシステムにとって最も重要なドレナージ空間、頭頂骨の上。

頭頂骨は**ソーラーパネル**のように呼吸し、光を捉える必要があります。ちょうど**橈骨**が「ソーラーボーン」であるように。これらのシステムを脳に統合することは、**卵黄嚢**および**臍帯システム**と**頂点ショック**に関連して、脳をリラックスさせます。

- Sinus sagitalis superior
- Sinus sagitalis inferior
- Sinus rectus
- Sinus transverses
- Sinus occipitalis
- Sinus sigmoideus
- Sinus petrosus superior
- Sinus petrosus inferior
- Sinus cavernosus
- Plexus basilaris
- Sinus marginalis



図一 頭蓋静脈洞