

35. 生殖器系の統合

所要時間 : 03:26

学習シート

コース概要

このビデオは、生殖器系の発達に関する詳細な要約を提供し、胚発生の類似点と男性および女性の性器の分化に焦点を当てています。ホルモンの影響下で未分化の構造がどのように変化し、陰茎や陰核のような異なる器官を形成するか、また正中線に沿った閉鎖プロセスがどのように統合されるかを学びます。性腺の性別、胚性管、および精神的葛藤の身体的影響の概念も扱われ、施術者にとって豊かな治療アプローチを可能にします。

生殖器系の統合

生殖器系の発生は、未分化の同一胚から生じる男性と女性の構造間に顕著な対応関係を示します。これらの構造はホルモンの影響下で進化し、**正中線**に沿った段階的な閉鎖を調節します。

外性器の分化

当初、構造は未分化ですが、その後、**男性**または**女性の性器**に特化します。

- **生殖結節 :**

- 男性 : 亀頭と陰茎体
- 女性 : 亀頭と陰核体

- **尿生殖洞 :**

- 男性 : 陰茎尿道
- 女性 : 膣前庭

- **尿道ヒダ :**

- 男性 : 陰茎と陰茎尿道
- 女性 : 小陰唇

- **陰唇陰嚢ヒダ :**

- 男性 : 陰嚢

- 女性：大陰唇

これらの構造の正中線に沿った段階的な閉鎖は、重要なプロセスです。まず、**総排泄腔**と**直腸**の分離が起こります。

外性器の分化は明確に確認できます。

- 陰核は小陰唇と大陰唇に発達します。
- 男性では、胚性陰核が亀頭と陰茎になります。
- 胚性小陰唇は閉鎖して陰嚢を形成します。

この分化は、妊娠**5週目**から**8週目**の間に始まり、肝臓と副腎の発達と同時に起こります。


正中線と胚学的類似性

胚の後方からの視点では、**鎌状靭帯**、**円索靭帯**、および**正中ヒダ**が明らかになります。白線は、正中線に沿った閉鎖の結果として生じるこの組織の連続性です。これは、この融合運動全体の最終結果です。

生殖器の形成と、体の他の正中構造の形成との間には類似性があります。

- 鼻は子宮のように発達します。
- 胸骨は子宮系のように発達します。

これらすべてのシステムは、胸骨、顔、または生殖器であろうと、正中線に収束します。これは前正中線の閉鎖です。



図一 唇/口蓋裂の血管分布

生殖腺の性別と胚性管

生殖管の発達、生殖腺の性別に依存します。

- **アンドロゲン分泌がない場合（女性）：**

- ウォルフ管は退化します。
- ミュラー管は卵管、子宮、膣を形成するために発達します。
- 尿生殖洞は開いたままです（前庭、小陰唇）。内胚葉に由来するこれらの構造は、尿道とその周囲の前立腺部分を形成します。

- **アンドロゲン分泌がある場合（男性）：**

- ウォルフ管は精巣上体、精管、精嚢、射精管になります。
- ミュラー管は退化します。
- 尿生殖洞は閉鎖します。

男性の生殖結節は陰茎になり、女性では陰核になります。生殖隆起は女性の小陰唇と大陰唇を形成します。




Fig. 1 a.






Fig. 1 b.



図一 生殖器の発達

心理的葛藤の身体化



図一 外部の胚発生

私たちの体は心理的葛藤を**身体化**することに注意することが重要です。葛藤が解決されない場合、その象徴性に応じて身体的に現れる可能性があります。

- **分離**：皮膚に影響を与える可能性があります。
- **尿生殖器、代謝、リズム、または神経感覚の葛藤**：対応する器官系で表現されます。




Fig. 3.




Fig. 4. — Organes
génitaux exter-
nes féminins.

図 — 女性の生殖器




Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique. Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.




Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonephrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonephrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

図一 生殖器の下降

説明図

図一 説明図





図 — ヒトの性分化

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

図 — 外性器の発達



図一 前腹壁