

44. 四肢の発生

所要時間 : 10:30

学習シート

コース概要

このビデオでは、四肢の発達と、脳や消化管を含む内部構造との間の魅力的なつながりに焦点を当てています。小児期の怪我が現在の痛みにどのように影響するか、また、中国医学とオステオパシーのアプローチを統合して腱炎やその他の関節痛を治療する方法を学びます。取り上げられる主要な概念には、腹膜のダイナミクス、四肢形成における血管の重要性、および発達中の骨と筋肉の相互作用が含まれます。これらの複雑な関係を理解することで、四肢の病変を効果的に治療し、患者の全体的な健康を改善するための準備が整います。

四肢の発生

四肢の発生は、**脳**や**消化管**などの内部構造と並行して起こります。回転後、下肢と上肢は同時に形成されます。

腱炎は、**腹膜**の回転不全を反映している可能性があります。例えば、手首に痛みがあり、しばしば**テニス肘**と診断される人が、そのスポーツをしていなかったとします。問題の根源を理解するためには、**肺**や**内臓**の側面を探ることが重要です。システムの組織を分析することで、内臓を治療して四肢を解放することができます。

中国医学では、内部の問題を治療するために、末梢の特定のツボが刺激されます。腹膜の痕跡が再活性化され、以前の機能が再利用されることがあります。人生の大きな怪我は、しばしば5歳未満で発生し、中には胚期にまで遡るものもあります。体内で起こっていることは、四肢に反映されることがあります。

細胞腫と**神経管**は発生において重要な役割を果たします。特定の角度が吸引場を作り出し、成長に影響を与えます。制限領域と過成長領域を持つ代謝場は、血管系に影響される分化成長運動を引き起こします。活発な代謝は、**間葉組織**に強力な流れを生成し、**外胚葉組織**の成長を促進します。






図 — 吸引と制限の場の概念は、これらのメカニズムが細胞と神経管で説明された後に論理的に配置される



図一 肢芽

発生において最初に現れるのは手であり、その後にシステムの伸長が続きます。胚の屈曲は、大動脈に対する成長速度に関連しています。関節も同様のプロトコルに従い、血管の存在が構造の密度と形状に影響を与えます。外旋運動の後に内反回転が続き、これは血管場によって調整されます。


中胚葉は四肢の誘導を担っており、四肢は**心臓-胸膜-腹膜囊**の拡張です。四肢の損傷の治療には、**胸膜-心膜-腹膜**との再平衡化が必要です。四肢を解放することで、上部および下部構造のより良い出現が可能になります。



図一 肢の発達

血管軸は、分節化と四肢の配置を理解するために不可欠です。各分節は血管と神経堤によって組織され、各椎骨は臓器に対応しています。椎骨の皮膚痛は、肝臓や胆嚢などの特定の臓器に関連しています。


細胞腫の誘導は血管場によって方向付けられ、四肢の成長に影響を与えます。骨と筋肉の間のダイナミクスは不可欠です。最初は骨が活動的であるのに対し、筋肉は受動的で、時間が経つにつれて、筋肉が引き継ぎ、四肢の形状を定義します。




図一 胚の肢の発達

上肢と下肢の両方の四肢の発生は、**反回転**と腹膜の組織に関連しています。頭蓋底と脊柱は**軸傍間葉**に由来し、四肢の骨格は**体壁中胚葉**に由来します。


四肢の損傷を治療することは、それらを腹膜腔に再統合することを意味し、これは胚性支点を理解するための鍵となります。



図一 上肢の回転



図一 下肢の回転



図一 胚のランゲル線

