

09. 眼の様々な層 1

所要時間 : 05:01

学習シート

コース概要

眼球組織学（強膜、脈絡膜、毛様体突起、網膜）とその機能的特異性の分析。組織診断アプローチとしての虹彩学の原則の紹介。光受容体と色素層の活動の詳細な説明、視覚伝達の生化学的メカニズムの図解。

目の様々な層

目は、何枚もの靴下を重ねたように、いくつかの層で構成されています。

1. 強膜

最初の層は**強膜**と呼ばれ、前方の**角膜**と連続しています。角膜は**透明な**構造で、光が目に入るのを可能にします。**角膜縁**と、**強膜**として知られる目の白い部分が、この最初の靴下を構成しています。




Fig. 3.

図一 眼の一般図

2. 脈絡膜

強膜を取り除くと、非常に**血管が豊富な層**である**脈絡膜**が現れます。脈絡膜は前方の**虹彩**へと続いています。**虹彩学**は、虹彩を通して健康に関する情報を読み取る実践であり、虹彩は**硫黄**のような様々な要素を蓄えることができます。

3. 毛様体突起

毛様体突起と**虹彩の懸垂靱帯**は、目の**生理機能**において重要な役割を果たします。これらの構造は**調節システム**に不可欠であり、**水晶体**が形を変えることで、画像が**網膜**に適切に投影されるようにします。

4. 網膜

3番目の靴下は**網膜**で、最も深い神経組織であり、**脳**の延長です。網膜は内層と外層の2つの層で構成されています。**網膜剥離**は、これら2つの層の間に空間が生じたときに起こります。




Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

図 — 眼の被膜、毛様体突起、網膜

5. 色素層と光受容体

網膜には**色素層**と**光受容体**も含まれており、これらは**錐体**と**桿体**に分かれます。これらの細胞は**光変換**に不可欠であり、光子が電気エネルギーに変換されるプロセスであり、それによって視覚認識が可能になります。

結論

目のこれらの異なる層は、それぞれがこの複雑な器官の機能において特定の重要な役割を果たし、協力して視覚を可能にしています。