

11. 実践：V4とゾーンBの圧迫

所要時間：07:04

学習シート

コース概要

このビデオでは、マンガリ孔と脳内および脳外環境のバランスに関連して、第4脳室圧迫（CV4）の実践について探求します。参加者は、脳脊髄液の循環と身体の調和を促進するために、このテクニックを効果的に使用する方法を学びます。これには、中立的な態度や広範な注意の重要性といった主要な概念が組み込まれます。臨床例と正確な指示を通じて、このセッションはセラピストを圧迫の技術へと導き、治癒プロセスにおける忍耐と心身のつながりの重要性を強調します。

実践：V4圧迫とゾーンB

このセッションでは、**第4脳室の心室圧迫（CV4）**について説明します。このテクニックは、**脳外空間**の探索を表す重要な概念である**マンガリ**と関連しています。

第4脳室レベルでの接続は不可欠です。なぜなら、それは**脳脊髄液**を生成する**脈絡叢**と関連しているからです。後方には、**脳内液**コンパートメントへの開口部があり、第4脳室を第3脳室、眼、側脳室に接続しています。この通路は**マンガリ孔**として知られています。

この実践の目的は、脳内環境と脳外環境の間の**バランス**を追求することです。眼はこのバランスにおいて重要な役割を果たしており、CV4を通してこの調和の状態を達成するために取り組みます。

圧迫は少なくとも**7分間**持続させ、体が**表現**し、解放されることを可能にする必要があります。この段階では、**EV4**、つまり第4脳室の**ゾーンB**への拡張を行い、周囲の空間を満たすために注意深く耳を傾けることが重要です。

この実践中は**中立性**の態度をとることが不可欠です。「うまくやろう」とすることは、内的な競争を引き起こす可能性があるため避けてください。空間が自然に形成されるようにしてください。なぜなら、**2つの中立**が会うことで治癒が起こるからです。

例として、ベッカーを治療した**ジャルーズ**医師の例があります。数分間の治療後、ベッカーは焦りを感じましたが、ジャルーズは、真の治療はしばしば操作の終了後に始まると説明しました。プロセスが定着し、部屋が落ち着く時間を許すことが重要です。

CV4を視覚化するには、**イニオン**のすぐ下、**小脳**の後ろに位置します。**頸動脈**を圧迫しないように注意してください。もし青くなったら、圧迫を中止する必要があります。親指はわずかに緩め、良い**支点**を見つけることが重要です。

CV4には、手だけでなく体全体が関与します。前方、後方、左、右のバランスを見つけ、自身の**重心**に集中してください。圧迫は意識的な行為であり、体と心が手の奉仕にあるべきです。

視線で圧迫しないことが重要です。集中しすぎると意識を失う可能性があります。**広々とした注意**を維持し、ゾーンBと内部の液体をバランスさせるように努めてください。

反応を感じた場合、それは**EV4**を示します。これは、**マルジャンディ**と関連して、脳外コンパートメントと脳内コンパートメントの間の再平衡化を表す開口部です。