

17. 眼と皮質化の動き

所要時間 : 08:22

学習シート

コース概要

このビデオでは、眼と脳の発達における皮質化運動との間の動的なつながりを探ります。頭部と頸部の屈曲プロセス、および顔面および内臓構造に関連する脳組織の再編成が検討されます。眼は、脳鎌と小脳テントの形成に影響を与え、ホルモン系との関連を通じて心理的および感情的な側面を統合する、この運動の中心的な役割を果たすものとして提示されます。平衡横隔膜と終末支点の概念が導入され、眼の再平衡化と身体の調和を促進するための十字縫合の安定化の重要性が強調されています。このレッスンは、胚発生とその治療的意味をよりよく理解したい開業医に、実践的および理論的な鍵を提供します。

眼と皮質化の動き

脳は、当初は平坦な組織として認識されていましたが、その発達の過程で著しい変化を遂げます。テーブルに横たわった個人が、手に脳を持っていると想像してみてください。最初に覚えておくべき情報は、**拡張と神経管の形成**です。

このプロセスは、**頭部屈曲運動**から始まり、続いて**頸部屈曲**、そして**橋部**の発達と**終脳化**のプロセスへと進みます。脳が直立するにつれて、小さな構造もこの発達運動に追随し、方向の変化を示します。


眼は、その発達の螺旋の中で、**皮質化**の情報を含んでいます。この直立の際に、組織全体が回転運動で再編成され、**正中線**に近づきます。下部では組織が心臓と消化器系に向かって引っ張られ、上部では直立します。この動きは、**脳の上昇**と**心臓・内臓の下降**によって生み出されます。

眼は、この**皮質化**現象において重要な役割を果たし、**大脳鎌**と**小脳テント**の発達に貢献します。これらはクリノイド突起に挿入されます。その近くには、考慮すべき不可欠な要素である**視交叉**があります。

もう一つの重要な側面は、**平衡の横隔膜**と**トノンの被膜**であり、これらは眼を顔面全体システムと体中のすべての筋膜に接続します。これは、眼が統合された**単位**であり、顔面全体の情報を含んでいることを意味します。また、ホルモン物質によって伝達される感情的および精神的な情報も受け取ります。したがって、精神状態はホルモン状態および感情状態と本質的に関連しています。


したがって、眼を治療することは、**腹膜**、**末梢**、および**皮質**の発達の両方に取り組むことです。眼は、その表現と発達において身体全体と関係しています。各臓器には独自の視点があり、各臓器は象徴です。

26日目頃に、内部接続に関連する**視溝**が現れます。この溝は、表面の壁に触れる小胞によって刺激されます。頭部と頸部の屈曲は、脳と心臓の間の出会いをもたらし、眼が心臓の上に置かれます。これにより、**橋部彎曲**として知られる**後部ひだ**が形成され、そこには仙骨と小脳テントがあります。



図一 視溝と小胞


小脳テントは、腹膜と脳との同期を確立するため、非常に重要です。中脳下屈曲は、脊索の先端と関係しており、支点として機能します。後頭骨上部も頸部屈曲に関連しており、橋部屈曲は後頭骨底に関連しています。



図一 脳と心の出会い

神経管の上昇は、消化器系と心臓の発達、および他の発達空間に影響を与えます。形態形成中の**共局在と同期**は、支点を理解するのに役立ちます。**外胚葉**の上昇と**内胚葉**の下降は、脳の統合に不可欠です。

眼はこの発達段階に追随し、正中線に近づいて**鶏冠**を形成し、膜を結合させて**大脳鎌**を形成します。小脳テントも橋化現象の間に発達します。



図一 支持点

眼の配置における支点、または**終末支点**が不可欠であることに注意することが重要です。眼のバランスを再調整するには、口の中に指を置き、小さな**十字縫合**のレベルに置くことをお勧めします。これにより、この縫合が安定する時点で、両眼がそれぞれの空間を見つけることができます。

前頭縁、**頬骨縁**、および**上顎縁**は重要な支点です。構造の上昇と下降は、正中線の閉鎖に貢献し、これは口蓋の閉鎖にも関連しています。口蓋がその支点を見つけると、眼もその場所を見つけ、発達における**到達支点**を示します。