

21. リリクイスト膜

所要時間 : 07:37


学習シート

コース概要

このビデオでは、第三脳室の横隔膜として機能する重要な構造であるリリクイスト靱帯の解剖学とメカニズムを探求します。この靱帯が動眼神経や脳底動脈とどのように相互作用し、脳室系や下垂体に影響を与えるかを学びます。膜の緊張、頭蓋の運動軸、それらが顔面およびホルモン系に与える影響といった概念が議論され、頭蓋-胸骨-仙骨および下顎の運動の重要性が強調されます。緊張の分析は咬合レベルの機能不全の診断にも役立ち、身体の調和を取り戻すための治療の鍵を提供します。

リリクイスト靱帯：解剖学とメカニズム


リリクイスト靱帯は、小さな横隔膜として機能する解剖学的構造であり、一般にイリクイスト膜と呼ばれています。この靱帯は第三脳室のレベルに挿入され、蝶形骨まで下降します。この場所で、動眼神経および動脈の通過、特に脳底動脈（脳動脈の形成を担う）との関連で重要な役割を果たします。



図ー リリークイスト靱帯

靱帯が下降すると、**緊張軸**が形成され、**脳室系**に影響を与えます。第三脳室、第四脳室、および**側脳室**はすべて、このダイナミクスによって相互接続されています。緊張パターンが確立され、**下垂体**が存在する空間に大きな影響を与えます。

下垂体の上には**視交叉**があり、約30度の角度で配向しており、5度の姿勢運動を伴います。この運動は、第三脳室、蝶形骨、および周囲の**微小血管**間の**排出**に不可欠です。微小毛細血管に存在する**周皮細胞**は神経と相互作用し、深い支点として機能する**血液脳関門空間**を形成します。




図一 脳室系

前蝶形骨（後頭骨に対応）を調べると、イリクイスト膜上にバランスの空間が観察されます。この膜性緊張は神経と血管の両方に影響を与え、下垂体の近くに位置し、神経系が**視床下部-下垂体-甲状腺-副腎-性腺軸**を介してホルモン系と通信します。

頭蓋骨の動きも考慮することが重要です。頭蓋骨を観察すると、**頭頂骨**や他の構造のレベルで異なる動きに気づくことができます。これらの動きは特定の力の線に従います。たとえば、前頭部の**屈曲運動**は、**前頭縫合**と関連しており、眼の動きに影響を与える2つのバランスポイントを表します。

脳が**脳室系**と**顔面系**を、**軟骨頭蓋（軟骨）**と**膜性頭蓋（膜）**の両方の観点から条件付けていることを理解することが重要です。発生中、**後頭骨**が下降すると、**仙骨**も下降し、**側頭骨**がこのダイナミクスにおいて重要な役割を果たします。


胸骨はこれらの動きに応答して上昇し、前正中線に向かって収束します。これらすべては眼に刻み込まれており、眼の顔面系と被膜系に関する要素を追加することが不可欠です。これらは周囲に挿入され、眼窩の発生レベルでの逆回転によって全体を組織します。



図一 頭蓋運動

頭蓋-胸骨-仙骨および下顎の動きは相互接続されています。犬歯軸も重要です。なぜなら、それらは**咬合**に影響を与えるからです。上顎と下顎の犬歯の接触が正しくないと、これらの電場が結合する必要があるため、脳レベルでの情報損失が生じます。

したがって、**咬合**は**蝶形骨基底結合**に存在する緊張の反映です。歯を観察することで、垂直、側方、またはその他の**歪み**（緊張）の存在を判断することができます。これにより、制約を理解し、バランスを回復するために必要な治療を調整することができます。



図一 頭蓋骨、胸骨、仙骨の協調した動き