

10. 配子发生

时长：02:38

教学单

课程总结

本次课程探讨配子发生，详细阐述卵母细胞和精子在细胞和功能上的关键区别。学生将了解卵母细胞的产生、其在胎儿期的起源，以及滋养细胞和卵泡细胞在胚胎发育中的重要性。课程还讨论了温度对生育能力的影响，强调卵巢需要温暖而睾丸需要凉爽，以及这对女性生育问题的影响。最后，介绍了器官与动脉系统之间的解剖学联系，阐明了营养交流轴和骨疗法在生育管理中的作用。

配子发生

卵母细胞与精子比较

卵母细胞的**细胞体积**非常大，而精子的细胞体积则非常小。

可以说卵子处于**扩张**、**开放**、完全**伸展**和开放的状态。

而精子则处于**内旋**、**干瘪**和**木乃伊化**的状态。

精子的**DNA**浓度非常高。

卵母细胞**不具活动性**，而精子则**活跃**。

细胞生产

产生的卵母细胞数量约为**400个**。初级卵母细胞在**胎儿期**形成。

这意味着，当你在母亲子宫里时，你已经在制造自己的卵母细胞了。

滋养细胞和卵泡细胞

我们区分**滋养细胞**和**卵泡细胞**。

一种细胞属于**生殖系**，另一种属于**体细胞系**。一种通过发育传递，另一种由母亲提供。

这些细胞将形成**轴线**，代表着**遗传信息**、**表观遗传信息**和**跨代形成信息**的传递路径。

温度与生育能力

卵巢需要留在体内，因为它们需要**热量**。

相反，**睾丸**则下降到体外，因为它们需要更低的**温度**。

对女性生育能力的影响

当女性因**生育问题**就诊时，这是一个需要考虑的重要因素。

有时，在**骶骨**区域工作时，可能会感觉到**寒冷**，这可能表明存在问题。

解剖学和生理学联系

我们将讨论其与**十二指肠**、**动脉**以及十二指肠处的“褶皱”或**褶皱凹陷**的联系。

这些结构允许**营养**信息通过动脉系统传递，特别是**卵巢动脉**或**睾丸动脉**。

生育问题通常需要在更高层次上处理，即在**胰腺**的**面部五边形**框架上。