

11. 受精

时长：14:26

教学单

课程总结

本次课程深入探讨了受精过程，从排卵到卵母细胞接受精子。课程涵盖了卵巢活动度、受精的自然屏障以及通过ZP3进行的膜识别等概念，以理解生殖的复杂动态。课程还强调了体外受精技术的影响，突出了母婴之间重要的情感和能量联系，以及了解个人历史对于整体健康的重要性。

受精

排卵和卵巢活动度

排卵是一个关键过程，理解**卵巢活动度**至关重要。卵巢伞在这一机制中起着关键作用。

小骨盆、子宫和卵巢的解剖结构复杂。其中包含**阔韧带**、**圆韧带**和**腰卵巢韧带**等结构，它们都由相同的组织构成。

子宫的胚胎学和解剖学表明，它是**后壁腹膜**的一个褶皱。这个结构必须具有活动度才能捕获**卵母细胞**。为了捕获卵母细胞，需要一种与运动相关的半球形运动。

如果考虑消化系统，**托尔筋膜**附着在后壁腹膜上。例如，在**阑尾炎**的情况下，能量损失或筋膜紊乱可能会影响卵巢的活动度，从而阻止卵母细胞的捕获。

腹膜必须自由，才能使受精发生。如果卵母细胞未被捕获，它可能会留在盆腔区域，导致**宫外孕**，这是一种危险。阴道和腹腔之间存在直接联系，这强调了这种活动度的重要性。

受精的自然屏障

在男性中，由于**苗勒结节**和**沃尔夫管**的存在，生殖结构之间缺乏连接，使得受精过程复杂化。

在女性中，存在几个自然屏障。第一个是**阴道酸度**，它有助于消灭不需要的细菌。其次，子宫颈处的**粘液栓**起着关键作用。这个粘液栓每月打开一次，允许精子通过。如果未打开，通道就会被阻塞。

一旦进入子宫，精子必须穿过**纤毛**，纤毛帮助它们前进。它们被热量、糖和电信号吸引。然而，并非只有一个精子成功，而是一群精子设法到达卵母细胞。

膜识别：ZP3

当精子到达卵母细胞时，它必须到达最理想的区域，即**卵母细胞**准备好接受精子的地方。卵母细胞膜上存在称为**ZP3**的**糖蛋白**，它们充当识别的钥匙。

这种膜识别至关重要：如果失败，受精就无法发生。

体外受精及其影响

体外受精（IVF）是一种常见的方法，特别是**卵胞浆内单精子注射**（ICSI），其中精子直接注射到卵母细胞中。这种技术绕过了自然识别，这可能导致长期的生育问题。

通过IVF出生的儿童可能会出现并发症。在咨询时，重要的是要询问有关受孕的问题，特别是任何可能的流产。子宫可能充满与这些事件相关的残留能量，需要进行能量清理。

识别孩子至关重要，通过建立母亲和孩子之间的联系。母亲必须与孩子建立身体和情感上的联系，以促进这种连接。

了解自己的历史的重要性

了解自己的历史是基础。例如，一个通过精子捐赠出生的孩子可能内心带着谎言，不知道自己的出身。组织不会说谎，整骨师可以通过双手感受到这个真相。

卵母细胞极化的作用


卵母细胞是极化的。当精子到达时，它会导致卵母细胞轴的重组，形成背腹轴和顶尾轴。这个象征性的时刻是与原始心脏的连接。

卵母细胞膜的攻击

精子必须穿过几层才能到达**透明带**。一旦到达膜上，必须发生膜识别。成功结合的精子会释放顶体酸，使其进入卵母细胞。

第一个生命细胞

两个细胞的遗传物质的结合形成了第一个生命细胞。这个动态过程产生了前两个**卵裂球**，它们是最初的生殖母细胞。



图一 受精卵

这项关于极性和胚胎发育早期阶段的研究对于理解生命的基础至关重要。