

31. 膈肌练习 - 3 种技术

时长：16:09

教学单

课程总结

本视频介绍了两种膈肌松解技术，对于改善患者，尤其是儿童的呼吸功能和整体健康至关重要。第一种技术侧重于食管和膈肌连接处，利用螺旋运动和组织倾听来释放膈肌的压力。详细的实践方案包括颈部评估、松解和活动步骤，旨在恢复运动自由度。第二种技术针对网膜囊和食管附着点，强调肋骨和膈肌之间相互作用的重要性。这些植根于生物动力学实践的方法旨在促进患者的整体健康。

膈肌实践 - 3种技术

膈肌技术介绍

我们将探讨两种主要技术。第一种是**机械**方法，用于释放膈肌空间。第二种是膈肌的**整体**方法，特别适用于儿童和婴儿，以恢复**最佳扩张**。这种技术属于**生物动力学**实践。

技术1：食管与膈肌连接处的松解

我们将专门处理食管和膈肌之间的**交界处**。这个区域富含**神经网络**，特别是**迷走神经干**。目标是温和地释放这个区域，这将有助于缓解周围迷走神经区域的压力。

关键解剖学

- 我们将观察膈肌的左右部分。
- **胸膜**也存在于此。
- 存在一个解剖学遗迹，以前是一条静脉，称为**Treitz和Lehmer静脉**。
- 一小块肌肉附着在膈肌和腹膜上，形成**食管周围**空间。这个空间具有适应性和相对于膈肌连接处重新平衡的功能。
- 这个结构延伸至**Treitz肌**，即十二指肠悬韧带。

身体的螺旋运动

身体通常以**螺旋**形式组织，这是一种强大的运动，无处不在。胚胎本身就是根据螺旋运动发育的。我们在能量学中利用螺旋来瞄准精确的点。在这里，我们将应用这种螺旋运动原理。

实践方案

1. **定位：** 将自己置于连接处，即胃最高处可及的位置。

2. **颈部初步测试：**

- 将头转向左侧，感受一下。
- 回到中心，然后将头转向右侧。
- 回到中心，然后再次将头转向左侧。注意旋转是否受限。通常，这个膈肌区域会阻碍颈部的良好旋转。

3. **定位和放松：**

- 定位好自己，让患者向后靠向你。
- 要求患者完全放松。扶住患者。
- 用拇指保持一个支点。

4. **下沉和组织聆听：**

- 开始轻轻地、深入地向下。寻找组织。
- 聆听组织。观察患者的呼吸。在呼气时，向下并遇到轻微的阻力，一种密度。

5. **稳定和渐进式活动：**

- 轻轻地定位自己，保持良好的后方支撑，身体挺直，以保持稳定。
- 检查患者是否感到疼痛。
- 进一步向下，由于衣物留出一点余地。
- 要求患者非常缓慢地坐直。你可能会感觉到“砰”的一声，然后随着你一起向上。
- 重复动作：缓慢向上，然后放松。争取更多空间。
- 有时，会感觉到“阻碍”，然后稍微向前寻找，向上再向下。

6. **后方抓握和感觉：**

- 然后用双手抓住后部。
- 要求患者完全放松。检查没有过度疼痛。
- 可能会感觉到一种感觉，然后“在胆囊处打开”。

7. **技术后检查：**

- 寻找后方支撑并返回。
- 要求患者再次将头转向左侧，以检查活动度。

技术2：网膜囊后腔和胃的松解

这项技术侧重于网膜囊后腔和食管插入点。不要忘记**肋骨**与膈肌相关的重要性，那里有重要的集中。

实践方案

1. **定位：** 将自己置于“洞”形成的位置。
2. **手部定位：** 将手平放在连接处，位于第7、8、9肋骨处。
3. **滑动和放松：** 将手滑到下方并平放。然后，用另一只手。
4. **杠杆臂：** 放松并创建一个小的杠杆臂。这个区域是重要的张力交汇点。
5. **效果：**
 - 这将放松整个胃-贲门连接处。
 - 这将放松Treitz肌区域和相关结构。
 - 这作用于这种重要的关系。

整体感觉和胃后囊

- 专注于更整体的感觉。触摸整个身体。
- **胃后囊**的活动非常重要。溃疡通常是后方的，这个囊需要活动性才能实现良好的蠕动和功能。它必须是自由的。
- 如果它不够自由，它就没有相对于膈肌得到释放。

基本解剖学联系

- 食管和胃是与颅底相关的第一个器官。
- 它们与**后中肠系膜**、角和左主支气管有关系。你可以感觉到热量上升，然后下降。

生物动力学方法和胚胎发育

我现在探索另一个层面：**胚胎发育**的力量、支撑、能量。我观察呼吸，并感知到一种筋膜工作，旨在在膈肌和后肺区之间提供更多空间。

腹膜平面

- 在腹膜平面上，**左结肠角**是腹膜整体发育的第一个固定点。它是第一个支撑点。
- 专注于这个支撑点，然后是活动点。
- 最活动的点是**盲肠**，它是最后形成的。评估它的状况。
- 在你的两手之间，你拥有结肠框架的整个旋转轴。膈肌作用于这些结构。
- 在这个空间中，你拥有所有的韧带，例如**镰状韧带**。

治疗选择

治疗师可以选择治疗什么，但通常患者的身体会引导这个选择。

- 例如，镰状韧带或其小叶上的张力。
- 有时，会表现出一种“温和的愤怒”，就好像缺乏后方支撑，或者需要在这里释放。
- 这项工作与小脑幕、大脑镰、**鸡冠**处的同步进行。我们将处理窦。

生物动力学中愤怒的表达

愤怒可以表现为在某个时刻无法表达。这可能由来已久，与未能说出口的事情有关。在生物动力学中，我通过将自己置于整体中来掌握方案。我离开胸式呼吸，进入空间，让它保持开放。身体然后引导我找到支撑点。“闪光”可能会出现，表明存在张力。

生物动力学方法（入门）的关键

- 潜入水中（比喻）。
- 聆听运动。
- 感受运动。
- 寻找**平衡**（平衡点）。
- 一旦找到平衡点，聆听其后的寂静。

当细胞“响应”并开放接收时，这是一种**细胞“点燃”**。

注意事项和手部定位

在处理膈肌时，目标是为膈肌提供空间。

避免的错误

- **按压头部**：双手之间必须有均衡的感觉。一个主要错误是按压患者的头部，这长时间会非常不舒服。
- **姿势不当**：肘部要有良好的支撑。

定位建议

想象你正在吃大蒜，并且占据了正确的空间。找到正确的空间至关重要。

冥想引导和治疗师的状态

在这种实践中，我将引导您进入一种**冥想**状态。

- 将自己置于恰到好处的位置。
- 作为接受者，尝试定义您对该位置的感觉。

触觉

触感非常轻柔，带有许多温暖。它是整体的，感觉它延伸到脚部。同时，我感觉到我抓住了“**微晶场**”：所有这些细胞，这个带有其受体的小细胞网络。这是一个巨大的场。

糖萼场

糖萼场信息最集中的地方位于**十二指肠第二部分**——肠道中最具信息的部分。这个场遍布全身，就像一个包罗万象的整体场。这有助于建立深层接触。