

33. 女性生殖器

时长：06:15

教学单

课程总结

本视频深入探讨女性生殖系统的发育，从沃尔夫管和米勒管的形成及其对生殖结构的影响开始。重点关注男性和女性泌尿生殖关系的差异，阐明子宫和输卵管的形成。我们还深入探讨了阔韧带和卵巢韧带的作用，以及肾脏健康在荷尔蒙调节和生育能力方面的重要性。视频讨论了骨盆内的筋膜连续性，以及肌瘤等异常如何影响整体身体动力学，为骨科和胚胎发育领域的从业者提供了重要信息。

女性生殖器

1. 中肾管（沃夫管）和副中肾管（米勒管）

沃夫管，也称为**中肾管**，是胚胎中出现的第一个管道。

在男性中，此管道下降并整合到睾丸之间，形成**射精管**。相反，米勒管作为遗迹保留下来，并参与前列腺核心的形成。

在女性中，情况则相反：

- 沃夫管分化为**加德纳氏器官**，它们是遗迹。
- 米勒管通过融合形成**子宫和输卵管**。

泌尿生殖系统发育

泌尿生殖关系是基础。在男性中，附睾管、输精管和射精管都是从这种关系中形成的。

在女性中，这种发育方式不同。米勒管向中线汇合形成子宫。

加德纳氏器官代表女性沃夫管的遗迹。射精管朝向基部，越远离基部，越会形成子宫。越不远离基部，遗迹就越是**前列腺小囊**。

2. 阔韧带和卵巢韧带

在男性和女性中，**后壁腹膜**集中形成**阔韧带**，以及小的卵巢韧带和圆韧带。

这是相同的组织，但浓度不同。这种后壁腹膜将在女性中形成子宫。

在男性中，这种运动不存在，只剩下腹膜的集中。

3. 肾脏和肾上腺

肾脏位于**肾上腺**下方，由一层囊膜分隔。这意味着**肾下垂**不会导致肾上腺下垂。

它们由一层筋膜分隔，称为**格利森囊**。肾脏需要脂肪空间。


在非常瘦的女性中，肾脏下垂可能导致月经不调和生育能力下降。**重新激活肾脏**，也意味着重新激活其生育能力。

肾脏的胚胎发育

最初，在小胚胎中，肾脏和肝脏一样巨大。这让人想起大脑的发育，早期大脑相对于躯干非常发达。

这些比例在发育过程中会发生变化。肝脏在肾上腺的发育中起着重要作用。

这是第一次观察到男性和女性之间**结构分化**，这与形成**米勒结节**的腺体更重要的发育有关。




图一 卵巢分化

4. 米勒系统发育（第5周）

在第五周，侧面下方的系统开始发育，重新赋予肾脏全部力量。

大脑影响心脏的形成，心脏反过来影响**膈肌形成**、肝脏、肾上腺、性腺和嵴的形成。

米勒管在女性中发育得更强，形成一个纯粹的管道，汇合形成子宫。



图一 胚胎子宫形成

在男性中，发育不那么明显，米勒管下部保留的部分构成了前列腺的核心。


睾丸下降

睾丸下降是由于**引带**处差异化的生长速度，引带减慢并牵拉整个系统。

子宫与筋膜、皮肤和小骨盆所有部分的这种筋膜连续性至关重要。


5. 筋膜连续性与结构影响

我们可以清楚地看到子宫、韧带、卵巢和**腹腔**。




图一 女性生殖系统

用钳子提起子宫时，会发现所有东西都在移动。



图一 女性生殖系统

子宫肌瘤或囊肿的影响是显著的。与韧带的连续性至关重要。



图一 子宫和肌肉组织

当拉得更用力时，可以看到整个系统如何反应，包括圆韧带。

腹膜是一种非常智能的组织。例如，肌瘤的影响可以通过简单的牵拉改变下游的整个系统。

一个大的肌瘤可能导致整个系统的一系列后果。

ail de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe. L'organe de





Fig. 1. — Formation de la trompe et résidus wolffiens.

图一 女性生殖器官



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 6. Glandula suprarenalis | 12. Ren, Pelvis renalis |
| 7. Müllerian duct | 13. Ovarium |
| 8. Lig.teres uteri | 14. Urether |
| 9. Uterus | 15. Anus |
| 10. For.sacralia ant. | 16. Anlage Os coccygis |
| 11. Ramus communicans | |

图一 胎儿生殖系统




图 — 未分化生殖系统