

14. 眼睛的不同层面 2

时长：05:25

教学单

课程总结


本视频深入探讨了眼睛的不同层次，特别是Cloquet管、房水、玻璃体液，以及晶状体从外胚层发育的过程。关键概念包括内陷在晶状体形成中的重要性，以及眼睛前部和后部（包括晶状体囊和视网膜）之间的区别。通过揭示眼部结构之间的联系，视频阐明了复杂的胚胎学过程，这些过程丰富了治疗师的实践及其对眼部病理学的理解。

眼睛的不同层次

眼睛里有一个**细小的管道**，叫做**Cloquet管**。这个管道是玻璃体液中的一个遗迹。

房水和玻璃体液是眼睛中存在的两种液体。玻璃体液可以想象成一个漂浮在眼睛里的**凝胶状水球**，其中心有一条细小的管道直接连接到**晶状体**。这条管道也与**视神经或玻璃体管**相连。

晶状体来源于表面**外胚层**。在发育的第五周，一个**内陷**形成一个被**血管化间充质**包围的**晶状体囊泡**。基板内陷形成晶状体，这个过程类似于**神经管**的形成。这个运动在内部留下一个空间，成为晶状体。



Formation du cristallin

图一 外胚层内陷

晶状体经历了一个形成**原始线**的演变。理解它如何像神经管一样发育成为调节焦距的晶状体至关重要。

脉络膜裂呈现一条线，它与动脉一起形成Cloquet管。这条管道与位于中心的**玻璃体动脉**和**静脉**一起闭合。初级晶状体囊泡演变为带有基板的次级晶状体囊泡。

在外部，形成的层是**巩膜**，它构成了第一层“袜子”。**脉络膜**形成第二层“袜子”，连接晶状体。眼睛可以分为两部分：**前部**和**后部**。前部又分为**前房**和**后房**。

结膜和**角膜**是连续的，角膜是透明的并与巩膜连续。脉络膜，也称为**UV**（源自拉丁语 *uva*，意为葡萄），是一种富含血管的膜。它分为三部分：脉络膜、前部的角膜和后部的**虹膜**，虹膜是脉络膜的延续。

虹膜由**悬韧带**和**睫状肌**固定。

最后，**视网膜**是眼睛最内层。它来源于第一个囊泡，即**初级视泡**，它发育形成一个杯状结构。视网膜由内层和外层两层组成，**视网膜脱离**就发生在这里。