

17. 眼睛和皮层化运动

时长：08:22

教学单

课程总结

本视频探讨了眼睛与大脑皮层化运动之间的动态联系。视频审视了头屈和颈屈过程，以及脑组织与面部和内脏结构相关的重组。眼睛被呈现为这一运动的核心参与者，影响着大脑镰和小脑幕的形成，同时通过其与荷尔蒙系统的联系整合了心理和情感方面。视频引入了平衡隔膜和终末支点的概念，强调了稳定十字缝合线对于重新平衡眼睛和促进身体和谐的重要性。本课程为希望更好地理解胚胎发育及其治疗意义的从业者提供了实用的和理论的钥匙。

眼睛与皮层化运动

大脑最初被认为是一种扁平组织，但在其发育过程中经历了显著的转变。想象一个人躺在桌子上，手里拿着他的大脑。首先要记住的信息是**扩张和神经管的形成**。

这个过程始于**头端屈曲运动**，随后是**颈部屈曲**，然后是**脑桥发育和端脑化**过程。随着大脑的伸直，小结构也随之发育，表明方向发生了变化。


眼睛在其发育螺旋中，包含了**皮层化**的信息。在伸直过程中，所有组织都以旋转运动重新组织，靠近**中线**。下方，组织向心脏和消化系统牵拉；上方，组织伸直。这种运动是由**大脑的上升和心血管系统的下降**造成的。

眼睛在**皮层化**现象中起着关键作用，有助于**大脑镰和小脑幕**的发育，小脑幕插入到斜突上。附近是**视交叉**，这是一个需要考虑的重要元素。

另一个重要方面是**平衡隔膜和托农囊**，它们将眼睛与整个面部系统和身体的所有筋膜连接起来。这意味着眼睛是一个完整的**单元**，包含所有面部信息。它还接收通过荷尔蒙物质传递的情感和心理信息。因此，心理状态与荷尔蒙和情感状态内在相关。


因此，治疗眼睛就是处理**腹膜、外周和皮层**的发育。眼睛与身体的整体表达和发育相关。每个器官都有自己的视角，每个器官都是一个象征。

大约在**第26天**，出现一个**视沟**，与内部连接相关。这个视沟受到一个接触表面壁的囊泡的刺激。头端和颈部屈曲导致大脑与心脏相遇，眼睛落在心脏上。这形成了一个**后褶**，称为**脑桥弯曲**，其中包含骶骨和小脑幕。



图一 视沟和视囊


小脑幕至关重要，因为它与腹膜和大脑建立同步性。中脑下弯曲与脊索尖端相关，作为支点。枕骨上部也与颈部屈曲相关，而脑桥弯曲与枕骨基部相关。



图一 大脑和心脏的相遇

神经管的上升影响消化系统和心脏的发育，以及其他发育空间。形态发生过程中的**共定位**和**同步性**有助于理解支点。**外胚层**的上升和**内胚层**的下降对于大脑的整合至关重要。

眼睛遵循这个发育阶段，靠近中线形成**鸡冠**，鸡冠将膜汇集在一起形成大脑镰。小脑幕也在脑桥化现象中发育。



图一 支点

需要注意的是，眼睛定位的支点或**终末支点**至关重要。为了重新平衡眼睛，建议将手指放在口中，在小的**十字缝合处**。这使得两只眼睛在缝合稳定时找到自己的空间。

额缘、颧缘和上颌缘是重要的支点。结构的上升和下降有助于中线的闭合，这也与腭的闭合相关。当腭找到其支点时，眼睛也找到其位置，标志着发育中的**到达支点**。