

10. GAMETOGENESE

DAUER : 02:38

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung untersucht die Gametogenese, indem sie die entscheidenden Unterschiede zwischen der Eizelle und dem Spermium detailliert darstellt, sowohl auf zellulärer als auch auf funktioneller Ebene. Die Studierenden lernen die Produktion von Eizellen, ihren Ursprung während des fötalen Lebens sowie die Bedeutung von Nähr- und Follikelzellen in der Embryonalentwicklung kennen. Der Einfluss der Temperatur auf die Fruchtbarkeit wird ebenfalls behandelt, wobei die Notwendigkeit von Wärme für die Eierstöcke und Kühle für die Hoden hervorgehoben wird, sowie die Implikationen für Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen. Schließlich werden die anatomischen Verbindungen zwischen den Organen und dem arteriellen System dargestellt, wobei die Achsen der trophischen Kommunikation und die Rolle der Osteopathie bei der Behandlung von Fruchtbarkeitsproblemen beleuchtet werden.

GAMETOGENESE

VERGLEICH OOZYTE UND SPERMATOZOON

Das **Zellvolumen** der Oozyte ist sehr groß, im Gegensatz zu dem des Spermatozoons, das sehr klein ist.

Man kann sagen, dass die Eizelle in **Dilatation**, in **Öffnung**, vollständig in **Extension** und offen ist.

Während das Spermatozoon in **interner Rotation**, **ausgetrocknet** und **mumifiziert** ist.

Die **DNA**-Konzentration ist bei Spermien sehr hoch.

Die **Beweglichkeit** der Oozyte ist nicht vorhanden, während das Spermatozoon **aktiv** ist.

ZELLPRODUKTION

Die Anzahl der produzierten Oozyten beträgt etwa **400**. Die primären Oozyten werden während der **fetalen Periode** gebildet.

Das bedeutet, dass Sie, als Sie im Mutterleib waren, bereits Ihre eigenen Oozyten gebildet haben.

NÄHR- UND FOLLIKELZELLEN

Wir unterscheiden **Nährzellen** und **Follikelzellen**.

Eine Zelle gehört zur **Keimbahn**, die andere zur **somatischen Linie**. Die eine wird durch die Entwicklung übertragen, die andere wird von der Mutter gegeben.

Diese Zellen bilden **Achsen**, die einen Weg für die Übertragung von **genetischen**, **epigenetischen** und **transgenerationalen** Informationen darstellen.

TEMPERATUR UND FRUCHTBARKEIT

Die **Eierstöcke** müssen sich im Körper befinden, da sie **Wärme** benötigen.

Die **Hoden** hingegen sind nach außen verlagert, da sie eine kühlere **Temperatur** benötigen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE WEIBLICHE FRUCHTBARKEIT

Dies ist ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss, wenn Frauen wegen **Fruchtbarkeitsproblemen** konsultieren.

Manchmal kann bei der Arbeit am **Kreuzbein** eine **Kälte** gespürt werden, was auf ein Problem hinweisen kann.

ANATOMISCHE UND PHYSIOLOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE

Wir werden dies im Zusammenhang mit dem **Zwölffingerdarm**, den **Arterien** und den "Plicas" oder **Faltenvertiefungen** im Zwölffingerdarm besprechen.

Diese Strukturen ermöglichen den Durchgang von **trophischen** Informationen über das arterielle System, insbesondere die **Ovarial-** oder **Hodenarterien**.

Die Fruchtbarkeit muss oft höher behandelt werden, im Bereich des **Gesichtsfünfecks** der **Bauchspeicheldrüse**.