

13. FRAGEN TAG 1

DAUER : 08:33

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in die Embryonalentwicklung ein, wobei wir uns auf den Dottersack und seine unverzichtbare Rolle bei der Ernährung und der Bildung der Nabelschnur konzentrieren. Die Erweiterung auf die Dynamik des Verdauungs- und Drüsensystems bietet ein umfassenderes Verständnis der frühen Lebensstadien, und die Bedeutung von Hormonachsen wie der Hypothalamus-Hypophysen-Achse wird aufgezeigt. Praktische Methoden zur Lösung von Stauungen in verschiedenen Körpersystemen werden vorgestellt, wobei die Bedeutung von Bewegung und Flexion für das embryonale Wachstum hervorgehoben wird. Entdecken Sie die Verbindungen zwischen anatomischen Strukturen und der harmonischen Entwicklung, um Ihre osteopathische Praxis und Begleitung zu optimieren.

EMBRYONALE ENTWICKLUNG UND INTEGRIERTE SYSTEME

Die **Dottersackblase** spielt eine entscheidende Rolle als **Speicher für nutritive Informationen** zu Beginn der Embryonalentwicklung. Während der Embryo wächst, bildet sich diese Blase zurück und integriert sich mit dem **Embryonalstiel** zur **Nabelschnur**. Obwohl dieser Prozess komplex erscheinen mag, ist es wichtig zu verstehen, dass die Dottersackblase auch zur Entwicklung des **Darminhaltssystems** beiträgt.

Das embryonale Wachstum ist durch ein **signifikantes Wachstum** des Gehirns gekennzeichnet, während sich das **Verdauungssystem** später entwickelt. Es ist jedoch von grundlegender Bedeutung zu beachten, dass das Verdauungssystem in seiner Rolle frühzeitig ist, da es zunächst vom **mütterlichen Verdauungssystem** abhängt. Darüber hinaus geht das Auftreten des **Drüsensystems** dem des **Nervensystems** voraus, was die vitale Bedeutung der Drüsen- und Verdauungssysteme unterstreicht.

Die **hypothalamisch-hypophysär-thyreoidal-adrenale Achse** ist ein zentrales Element in der hormonellen Regulation, insbesondere bei Frauen, die von den **Mondzyklen** von etwa 28 Tagen beeinflusst werden. Die Behandlung hormoneller Ungleichgewichte beinhaltet oft die Freisetzung von **Stauungsphasen** in verschiedenen Systemen, wie dem zervikalen, thymischen oder hepatischen System. Das Verständnis des **Biofeedbacks** der Systeme ist wesentlich, um diese Wechselwirkungen zu erfassen.

Die embryonale Entwicklung manifestiert sich auch in spezifischen **anatomischen Strukturen**. Zum Beispiel stellt der **Winkel des Gehörs**, der durch das Zusammentreffen des **Manubrium sterni** und der Sternumleisten gebildet wird, eine Erinnerung an die embryonale **Flexion** dar. Diese Flexion ist entscheidend für das dynamische Gleichgewicht des **Mediastinums**, des Raums zwischen den Lungen.


Der sich später entwickelnde **Processus xiphoideus** ist mit der Integration des **Zäkums** in die rechte Fossa iliaca verbunden und markiert die Endphase der Bildung des Kolonrahmens. Die Darmentwicklung beinhaltet eine **gegen den Uhrzeigersinn gerichtete Rotationsbewegung** von 270 Grad, die das Zäkum in die rechte Fossa iliaca integriert.

Sternaldeformitäten können auf Ungleichgewichte oder genetische Einflüsse hinweisen, während die Darmentwicklung durch eine **mesenteriale Gefäßachse** orchestriert wird. Dieser Prozess ist auch mit der zerebralen Dynamik und der Entwicklung der **oberen Extremitäten** verbunden.


Die Bewegung der Flexion und Streckung ist für das embryonale Wachstum unerlässlich. Die **Chorda dorsalis** erzeugt eine **Welle**, die das für die Entwicklung essentielle **Neuralrohr** bildet. Dieses Neuralrohr wiederum fördert die Einrollung und Streckung des Embryos.

Die **roten Blutkörperchen** und die **Gonaden** sind Schlüsselemente, die aus dieser Wachstumsdynamik hervorgehen. Manchmal können Individuen auf **Blockaden** in ihrer Entwicklung stoßen, was einen Ansatz erfordert, um diese Knoten zu lösen und die **Wahrscheinlichkeit** ihrer Evolution wiederherzustellen.


Diese Entwicklungsdynamik ist eine **kinetische Biodynamik**, die das Gehirn und die Kraftlinien mit den Durmer-Achsen und den Kiemenbögen verbindet. All dies wirkt sich auf die **Symphysis sphenobasilaris** aus, einen entscheidenden Punkt in der Embryonalentwicklung. Das Verständnis dieser Prozesse ist wesentlich, um die Komplexität der menschlichen Entwicklung zu erfassen.



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

ABB. — Seeigel-Blastula





ABB. — Blastocoel und Zellen



9 days

Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Menschliche Implantation 9 Tage




ABB. — Querschnitt Niere




ABB. — Embryonale Zirkulation 4 Wochen