

## 15. DAS HERZ : TAI-CHI-RÜCKBLICK & PRAXIS

DAUER : 03:38

LEHRBLATT

### KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video lehrt, wie das Herz durch embryonale Bewegungen mit dem Gehirn und dem Kreislaufsystem interagiert, während die theoretischen Grundlagen des Herz-Hirn-Systems wiederholt werden. Sie lernen spezifische palpatorische Techniken zur Beurteilung des Herzens, der Leber und der Nieren sowie deren emotionalen Einfluss, insbesondere wie die Niere mit Angst verbunden ist. Durch die Integration dieser Konzepte mit der Pulsdiagnostik entwickeln Sie einen ganzheitlichen therapeutischen Ansatz, der den Körper auf seinem Heilungsweg unterstützen kann.

## DAS HERZ: TAI-CHI-RÜCKBLICK & PRAXIS

### EINFÜHRUNG IN DAS HERZ-HIRN-SYSTEM

Wir werden die intrinsische Verbindung zwischen dem **Gehirn**, dem **Herz** und dem **Kreislaufsystem** erforschen.

Das **mesenteriale System** führt als Rotationsachse der Peritonealentwicklung eine Abwärtsbewegung aus. Diese Bewegung des Gehirns ist synchronisiert mit den Bewegungen der **Nieren** und der **Leber**.

Wir werden die **Motilität** der Gehirnentwicklung erneut untersuchen und sie in unser Herz-Wissen integrieren, um zu verstehen, wie das Herz das Gehirn unterstützt.

Vergessen Sie nicht, dass das Herz in den frühen Stadien in der **Dottersackblase** positioniert sein kann.

### PALPATIONSBEURTEILUNG: ORIENTIERUNGSPUNKTE UND BEOBACHTUNGEN

Zunächst nehme ich einen präzisen Orientierungspunkt: den **Louis-Winkel**. Ich weiß, dass er sich auf Höhe meines **zweiten Interkostalraums** befindet.

Ich lege meinen Mittelfinger auf den Louis-Winkel, dann lege ich meine Hand ab und richte sie an der Achse des Herzens aus.

## HERZBEOBACHTUNG

Mir gegenüber befindet sich das Herz in **Pronation**, was der **Diastole** entspricht. Dies deutet darauf hin, dass es auf der Suche ist, forschend.

Im Engagement seines Lebens ist es eher in einer Verzichtshaltung, mehr zurückgezogen als in seiner Aktion.

## LEBERBEURTEILUNG

Anschließend lege ich meine Hand auf die Leberregion, mit sehr leichtem Druck, als ob eine **Ameise** darauf säße, die man nicht zerquetschen darf.

Ich beobachte die Leber. Wenn sie eher horizontal liegt, kann das bedeuten, dass sie leicht **geschwollen** ist.

Sie neigt dazu, sich hierher zu bewegen.

## NIERENBEURTEILUNG

Nun untersuchen wir die Nieren. Ich palpiere eine Niere und stelle fest, dass sie sich ebenfalls in Pronation befindet.

Dies deutet darauf hin, dass sie anfälliger für ihre Läsion ist, was bedeutet, dass es die Niere ist, die sie hier destabilisiert, während die Leber sie unterstützt.

Die Niere ist emotional mit der **Angst** verbunden. Der Patient sucht einen Ankerpunkt, aber seine Geschichte ist auf dieser Ebene blockiert.


Bei diesem Patienten werde ich daher die Nieren behandeln, um sein Herz zu unterstützen.

## EMBRYONALE BEWEGUNGEN UND THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG

---

Ich erinnere Sie daran, dass die **embryonale Bewegung** der Lungen unterschiedlich ist.

Während die des Herzens anders ist. Beobachten Sie den Unterschied in diesen Bewegungen.



**ABB.** — Rotation der Organe

## INDUKTION UND UNTERSTÜTZUNG

Nachdem ich eine Induktion in seine Pronation, d.h. in die Diastole, durchgeführt habe, unterstütze ich seine Nieren.

Beobachten Sie, was passiert. Spüren Sie den Unterschied? Der Körper versucht, sich selbst zu reorganisieren.

Später werden wir die Motilität der Leber- und Nierenentwicklung sowie deren Verbindung zum **Gefäßsystem** untersuchen.

## DAS HERZ UND DIE PULSOLOGIE

Es ist wichtig zu beachten, dass das Herz in seiner Form das Echo seiner Peripherie widerspiegelt.

Deshalb ist die **Pulsologie** ein so faszinierendes Gebiet. Sie ermöglicht es, zu unterscheiden:

- Einen **Puls** vom reinen arteriellen Typ.
- Einen venösen Puls, begleitet von **Stauungen**.

Für mich gibt es Stauungen, wahrscheinlich im Leberbereich lokalisiert.

Ein arterieller Puls ist, wenn man ihn nimmt, charakteristisch, während ein venöser Puls sich anders manifestiert.

Trotz dieses Gefühls an einer Arterie bleibt die Frage: Bin ich letztendlich mehr in der **Systole** oder in der **Diastole**?