

14. VERSCHIEDENE SCHICHTEN DES AUGES 2

DAUER : 05:25

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG


Dieses Video befasst sich eingehend mit den verschiedenen Schichten des Auges, insbesondere mit dem Cloquet-Kanal, dem Kammerwasser, dem Glaskörper und der Entwicklung der Linse aus dem Ektoderm. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Bedeutung der Invagination bei der Linsenbildung und die Unterscheidung zwischen dem vorderen und hinteren Teil des Auges, einschließlich der Linsenblase und der Netzhaut. Durch die Aufdeckung der Verbindungen zwischen den Augenstrukturen beleuchtet das Video komplexe embryologische Prozesse, die die Praxis der Therapeuten und ihr Verständnis von Augenpathologien bereichern.

DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES

Es verbleibt ein **feiner Kanal** im Auge, der sogenannte **Cloquet-Kanal**. Dieser Kanal ist ein Überbleibsel im Glaskörper.

Der **Kammerwasser** und der **Glaskörper** sind zwei Arten von Flüssigkeiten, die im Auge vorhanden sind. Der Glaskörper kann als ein **gelatinöser Wasserballon** vorgestellt werden, der im Auge schwimmt, mit einem feinen Kanal in seinem Zentrum, der direkt mit der **Linse** verbunden ist. Dieser Kanal ist auch mit dem **Sehnerv** oder dem **Hyaloidkanal** verbunden.

Die Linse stammt aus dem Oberflächen-**Ektoderm**. Während der fünften Entwicklungswoche bildet eine **Invagination** eine **Linsenblase**, die von **vaskularisiertem Mesenchym** umgeben ist. Die Plakode invaginiert, um die Linse zu bilden, ein Prozess, der dem der Bildung des **Neuralrohrs** ähnelt. Diese Bewegung hinterlässt einen Raum im Inneren, der zur Linse wird.



Formation du cristallin

ABB. — Invagination des Ektoderms

Die Linse durchläuft eine Entwicklung, die **primitive Linien** bildet. Es ist wesentlich zu verstehen, wie sie sich wie ein Neuralrohr entwickelt, um die Akkommodationslinse zu werden.

Die **Kolobomspalte** weist eine Linie auf, die zusammen mit den Arterien den Cloquet-Kanal bilden wird. Dieser Kanal schließt sich mit der **Hyaloidarterie** und **-vene**, die sich im Zentrum befinden. Die primäre Linsenblase entwickelt sich zu einer sekundären Linsenblase mit der Plakode.

Außen bildet sich die **Sklera**, die die erste Hülle darstellt. Die **Aderhaut** bildet die zweite Hülle und verbindet die Linse. Das Auge kann in zwei Teile unterteilt werden: **anterior** und **posterior**. Der vordere Teil teilt sich in **vordere Augenkammer** und **hintere Augenkammer**.

Die **Bindehaut** und die **Hornhaut** stehen in Kontinuität, wobei die Hornhaut transparent und in Kontinuität mit der Sklera ist. Die Aderhaut, auch **Uvea** genannt (vom lateinischen *uva*, was Traube bedeutet), ist eine gefäßreiche Haut. Sie teilt sich in drei Teile: die Aderhaut, die Hornhaut vorne und die **Iris** hinten, die eine Fortsetzung der Aderhaut ist.

Die **Iris** wird von einem **Aufhängeband** und **Ziliarmuskeln** gehalten.

Schließlich ist die **Netzhaut** die innerste Schicht des Auges. Sie stammt aus der ersten Blase, der **primären Augenblase**, die sich zu einer kelchförmigen Struktur entwickelt. Die Netzhaut besteht aus zwei Schichten, einer inneren und einer äußeren, und hier kommt es zu einer **Netzhautablösung**.

