

14. DIFERENTES CAPAS DEL OJO 2

DURACIÓN : 05:25

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO


Este video explora en profundidad las diferentes capas del ojo, incluyendo el canal de Cloquet, el humor acuoso, el humor vítreo y el desarrollo del cristalino a partir del ectodermo. Los conceptos clave incluyen la importancia de la invaginación en la formación del cristalino y la distinción entre las partes anterior y posterior del ojo, que comprenden la vesícula cristaliniiana y la retina. Al desvelar las conexiones entre las estructuras oculares, el video arroja luz sobre complejos procesos embriológicos que enriquecen la práctica de los terapeutas y su comprensión de las patologías oculares.

LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO

Queda un **canal fino** en el ojo, llamado el **canal de Cloquet**. Este canal es un vestigio en el humor vítreo.

El **humor acuoso** y el **humor vítreo** son dos tipos de humores presentes en el ojo. El humor vítreo puede imaginarse como un **globo de agua gelatinosa** que flota en el ojo, con un canal fino en su centro que se conecta directamente al **cristalino**. Este canal también está ligado al **nervio óptico** o al **canal hialoideo**.

El cristalino proviene del **ectodermo** de superficie. Durante la quinta semana de desarrollo, una **invaginación** forma una **vesícula cristaliniiana** rodeada de **mesénquima vascularizado**. La placoda se invagina para convertirse en el cristalino, un proceso similar al de la formación del **tubo neural**. Este movimiento deja un espacio en su interior, que se convierte en el cristalino.



Formation du cristallin

FIG. — *Invaginación del ectodermo*

El cristalino experimenta una evolución que forma **líneas primitivas**. Es esencial comprender cómo se desarrolla como un tubo neural para convertirse en la lente de la acomodación.

La **hendidura colobómica** presenta una línea que, con las arterias, dará lugar al canal de Cloquet. Este canal se cierra con la **arteria** y la **vena hialoidea** que se sitúan en el centro. La vesícula cristaliniana primaria evoluciona para convertirse en una vesícula cristaliniana secundaria con la placoda.

En el exterior, la capa formada es la **esclerótica**, que constituye la primera capa. La **coroides** forma la segunda capa, conectando el cristalino. El ojo puede dividirse en dos partes: **anterior** y **posterior**. La parte anterior se divide en **cámara anterior** y **cámara posterior**.

La **conjuntiva** y la **córnea** están en continuidad, siendo la córnea transparente y en continuidad con la esclerótica. La coroides, también llamada **UV** (del latín *uva*, que significa uva), es una piel rica en vasos sanguíneos. Se divide en tres partes: la coroides, la córnea en la parte anterior, y el **iris** en la parte posterior, que es una continuidad de la coroides.

El **iris** está sostenido por un **ligamento suspensorio** y **músculos ciliares**.

Finalmente, la **retina** es la capa más interna del ojo. Proviene de la primera vesícula, la **vesícula óptica primaria**, que se desarrolla formando una estructura en forma de cáliz. La retina está compuesta por dos capas, interna y externa, y es aquí donde se produce un **desprendimiento de retina**.

