

07. CRONOLOGIA, CRESCITA, SINCRONICITÀ

DURATA : 03:59

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo i concetti essenziali dell'Embriologia Biodinamica, insistendo sulla cronologia dello sviluppo embrionale, dalle prime fasi del concepimento alle trasformazioni maggiori del secondo mese. Facciamo la distinzione tra motilità, intrinseca al tessuto, e mobilità, legata alla respirazione, sottolineando l'importanza di trattare l'ambiente piuttosto che i soli organi. Vengono anche affrontate le nozioni di potenza nel tessuto e l'importanza del diaframma, offrendo ai terapeuti strumenti per lavorare efficacemente con il movimento e la crescita embrionale.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: CRONOLOGIA, CRESCITA, SINCRONICITÀ

DEFINIRE L'EMBRIONE: GIORNI, CARNEGIE E CRESCITA

Per comprendere l'**embrione**, possiamo definirlo in termini di **giorni** o secondo gli **stadi di Carnegie**. In questo corso, ci concentreremo sui giorni.

Quando si verificano fenomeni **sincronizzati**, come la chiusura dei **neuropori** o l'integrazione dei **celomi**, vi daremo punti precisi nel tempo, ad esempio al momento della presa di coscienza del **cuore**. Altrimenti, parleremo in giorni o settimane, e affronteremo anche nozioni di **dimensione**.

Ciò che è veramente importante per voi è la nozione di **crescita**. Bisogna capire che l'embrione è un **movimento di sviluppo**. È un movimento che si sviluppa dall'interno verso l'esterno, e non il contrario.

MOTILITÀ E MOBILITÀ: DUE MOVIMENTI DISTINTI

Questa è la differenza fondamentale tra ciò che chiamiamo **motilità** e **mobilità**:

- **La motilità** è una risposta embrionale. Segue il movimento dello sviluppo intrinseco del tessuto.
- **La mobilità** è un movimento puramente legato alla respirazione e alla motricità.

È cruciale fare bene questa distinzione. Quando muovo il braccio, è molto diverso dal movimento intrinseco a livello del mio **fegato**.

Se voglio rielaborare un tessuto, lo riporto nella sua motilità. È lì che risiede la sua **forza funzionale**, lì dove si riorganizzerà. Questo è il lavoro che facciamo: tornare in questo tessuto affinché possa riorganizzarsi e ritrovare la sua mobilità.

Si tratta sempre di seguire il movimento, ma per questo, sono necessari dei **punti di appoggio** e avere il movimento in mano.

TRATTARE L'AMBIENTE, NON SOLO L'ORGANO

Non tratto un **organo**, tratto un **ambiente**. Tuttavia, la mia azione può talvolta influenzare la mobilità e la motricità.

Nel contesto della mobilità, il maestro è il **diaframma**. Ecco perché impareremo come si costruisce questo diaframma.

LA POTENZA DEL TESSUTO: UNA RIVELAZIONE

Un giorno, il mio insegnante mi disse: "Marc, un giorno sentirai la **potenza** nel tessuto." Per me, questa potenza era molto intellettuale. Potevo capire che un embrione che si sviluppa rappresenta una potenza incredibile, un movimento che non si ferma mai.

Mi disse anche che a volte, nei **"stillness"** (i momenti di immobilità), in certi punti di appoggio, questa potenza è anch'essa presente. È incredibile, e in quel momento, qualcosa accade. Tuttavia, non si può creare questo continuamente. Bisogna cercare di mettersi in presenza, di avere una buona connessione, e a un certo punto, il sistema si aggiusta.

Mi diede un'immagine: "È come se fossi su una piccola barca in mare. Sei solo nell'acqua, e non la vedi, ma sotto di te, una **balena** sta arrivando. E tu senti, senti all'improvviso, è un po' quella sensazione lì."


DALL'OVULO AL SECONDO MESE: UNA TRASFORMAZIONE INCREDBILE

Guardate cosa siamo al primo giorno: un piccolo **disordine**. E guardate cosa succederà alla fine del **secondo mese**. In soli due mesi, avviene una trasformazione incredibile.

Già all'inizio del **ventesimo giorno**, una forma comincia già a delinearsi. Il potenziale di vita è lì.

All'inizio, è semplicemente un **ovulo** che ha ricevuto il patrimonio genetico del padre, lo **spermatozoo**. I due patrimoni si stanno incontrando. Questa è più o meno la prima immagine della vostra vita.

Osserviamo poi quella che viene chiamata la **zona pellucida** e delle **cellule nutrici**. Ci sono diversi strati di cellule importanti che si stanno formando.



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo uterino fetale

Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW




FIG. — Sviluppo embrionale umano




FIG. — Embrione neurulazione sagittale




FIG. — *Embrione, 6-7 settimane*