

13. DOMANDE GIORNO 1

DURATA : 08:33

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, ci immergiamo nello sviluppo embrionale, concentrandoci sulla vescicola vitellina e il suo ruolo indispensabile nella nutrizione e nella formazione del cordone ombelicale. L'ampliamento alla dinamica del sistema digestivo e ghiandolare offre una comprensione più vasta dei primi stadi della vita, e l'importanza degli assi ormonali come l'asse ipotalamo-ipofisario viene rivelata. Vengono presentati metodi pratici per liberare le congestioni in vari sistemi corporei, sottolineando l'importanza del movimento e della flessione nella crescita embrionale. Esplorate i legami tra le strutture anatomiche e lo sviluppo armonioso per ottimizzare la vostra pratica di osteopatia e accompagnamento.

SVILUPPO EMBRIONALE E SISTEMI INTEGRATI

La **vescicola vitellina** svolge un ruolo cruciale come **riserva di informazioni nutritive** all'inizio dello sviluppo embrionale. Man mano che l'embrione cresce, questa vescicola regredisce e si integra con il **peduncolo embrionale** per formare il **cordone ombelicale**. Sebbene questo processo possa sembrare complesso, è essenziale comprendere che la vescicola vitellina contribuisce anche allo sviluppo del **sistema intestinale**.

La crescita embrionale è caratterizzata da una **crescita significativa** a livello del cervello, mentre il **sistema digestivo** si sviluppa più tardi. Tuttavia, è fondamentale notare che il sistema digestivo è precoce nel suo ruolo, poiché dipende prima dal **sistema digestivo materno**. Inoltre, l'apparizione del **sistema ghiandolare** precede quella del **sistema nervoso**, sottolineando l'importanza vitale dei sistemi ghiandolari e digestivi.

L'**asse ipotalamo-ipofisi-tiroide-surrene** è un elemento centrale nella regolazione ormonale, particolarmente nelle donne, che sono influenzate dai **cicli lunari** di circa 28 giorni. Trattare gli squilibri ormonali spesso implica liberare le **fasi di congestione** in vari sistemi, come il sistema cervicale, timico o epatico. Comprendere il **biofeedback** dei sistemi è essenziale per afferrare queste interazioni.

Lo sviluppo embrionario si manifesta anche attraverso **strutture anatomiche** specifiche. Ad esempio, l'**angolo dell'udito**, formato dall'incontro del **manubrio dello sterno** e delle barre sternali, rappresenta una memoria della **flessione** embrionale. Questa flessione è cruciale per

l'equilibrio dinamico del **mediastino**, lo spazio tra i polmoni.


L'**appendice xifoidea**, che si sviluppa più tardi, è legata all'integrazione del **cieco** nella fossa iliaca destra, segnando la fase terminale della formazione del colon. Lo sviluppo intestinale implica un **movimento di rotazione antioraria** di 270 gradi, integrando il cieco nella fossa iliaca destra.

Le **deformazioni sternali** possono indicare squilibri o influenze genetiche, mentre lo sviluppo intestinale è orchestrato da un **asse vascolare mesenterico**. Questo processo è anche legato alla dinamica cerebrale e allo sviluppo degli **arti superiori**.

Il movimento di flessione e allungamento è essenziale per la crescita embrionale. La **notocorda** genera un'**onda** che crea il **tubo neurale**, essenziale per lo sviluppo. Questo tubo neurale, a sua volta, favorisce l'avvolgimento e l'allungamento dell'embrione.

I **globuli rossi** e le **gonadi** sono elementi chiave che emergono da questa dinamica di crescita. A volte, gli individui possono incontrare **blocchi** nel loro sviluppo, il che richiede un approccio per liberare questi nodi e ripristinare la **probabilità** della loro evoluzione.

Questa dinamica di sviluppo è una **biodinamica cinetica**, che collega il cervello e le linee di forza agli assi duramerici e agli archi branchiali. Tutto ciò si ripercuote sulla **sinfisi sfeno-basilare**, un punto cruciale nello sviluppo embrionario. La comprensione di questi processi è essenziale per afferrare la complessità dello sviluppo umano.



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo embrionale precoce





FIG. — *Embrione 14-15 giorni*



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — Blastula riccio di mare





FIG. — Blastocoele e cellule



9 days

Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Impianto umano 9 giorni




FIG. — Sezione trasversale rene




FIG. — Circolazione embrionale 4 settimane