

01. 新しいビジョン

所要時間 : 16:19

学習シート

コース概要

この魅力的なビデオでは、地球との関係についての新しいビジョンと、それがセラピストとしての私たちの実践にどのように影響すべきかについて議論されています。知覚の錯覚や相互接続性といった概念に基づいて、講演者は、患者の苦しみを和らげるだけでなく、彼らの精神的な目覚めにも貢献する意識の刷新を提案しています。統合すべき3つの不可欠な要素は、動員、創造、精神的な作業であり、それぞれが新しい視点をもたらし、よりシンプルで意識的な生活を促すのに役立ちます。このアプローチからは、感覚的な快楽を放棄して本物の喜びを追求するという誘いが永続的に現れ、治療に新たな次元をもたらします。

新しいビジョン

私たちが抱く現実の認識は、しばしば**巨大な幻想**であることがあります。例えば、あなたは私がここに目の前に存在していると感じるかもしれませんが、実際には私は**蜃気楼**です。ヨナ・メッシは、**地球**を私たち自身の延長として、**尊敬**と愛の精神で捉えるよう促す本を書きました。

私たちは結局、**集合体**の総和であり、**一時的**で**無常**で**相互依存的**な構成要素です。これらの集合体には、私たちの形や地球との関係、そして**知覚**の大きな遊びが含まれます。私たちの知覚は、よく観察すれば、単なる蜃気楼に過ぎません。それらはしばしば**曖昧**であり、私たちは物事を固定しようとする傾向がありますが、実際にはかなり不確かなままです。

この**解釈**の概念は極めて重要です。私たちは周囲のものをどのように認識しているのでしょうか？私たちの周りに構築されるゲームもまた、現象の解釈です。私たちは**現象学**であり、おそらく私たちの認識様式を変え、私たちの惑星と同じくらい広大な、より大きな蜃気楼を目指す時が来ているのかもしれません。私たちが地球とつながっていることに気づけば、もっと地球を大切にすることができるでしょう。





図 — この画像は一般的な概念であり、この段落は地球とのつながりへの意識を扱っており、「新しいビジョン」の導入とその必要性を
予見している。

私たちは**成長**に焦点を当てた社会に生きており、それはしばしば無限であると認識されていますが、私たちの世界は実際には**有限**です。この差し迫った変化を認識することが不可欠です。私はあなたに**新しいビジョン**を提案します。この転換点を作るか、さもなければ避けられない**崩壊**に向かうかのどちらかです。


創発の理論は、すべてが創発し、その後崩壊すると教えています。現在の社会は転換点にあり、**セラピスト**として、私たちには果たすべき役割があります。私たちは患者の苦しみを和らげると同時に、新しい視点に開かれるのを助けることができます。



図一 おそらく「**創発の理論**」の一側面、または**移行と治療家の役割**に関連する視覚的な概念。前の文がこの一般的な考えを締めくくっている。

アンドレアス・メッシは、この転換を行うための3つの不可欠な要素を特定しました。

1. **動員**：機能しないものに対して、自分自身だけでなく他者のためにも、関与し「ノー」と言うことが重要です。
2. **創造**：新しいアイデアや形を開発することが重要であり、これは私たちを**創造者**や**思想家**へと駆り立てます。



図一 この画像は、イオナ・メッシーが前の段落で言及した「スピリチュアルな仕事」と「変化」に関連する側面を、善意の意識などのより具体的な概念に進む前に、視覚的に要約または導入する可能性がある。

3. **精神的な仕事**：イオナ・メッシーによれば、この仕事なしには、私たちはこの変化を遂行することはできません。

この仕事は、慈悲深い**意識**と**善良な心**を育むことです。私たちは、自分自身の苦しみだけでなく、他者の苦しみをどのように減らすかについて自問する必要があります。あまりにも頻繁に、私たちは感覚の快楽に夢中になっています。

私はあなたに、自分自身を観察し、自分の行動を検証することを学ぶよう勧めます。私たちは、単なる感覚的な満足を超えた快楽の形を他者に教える義務があります。これには、**シンプルさ**、**真の存在感**、あるいは物事を所有するのではなく、物事との関係性から生まれる快楽が含まれるかもしれません。

満足は、ある種の**中立性**から生まれることがあります。放棄の喜びは、仏教の経典に見られる概念です。ブッダ自身も、最初は放棄することに怒りを感じたものの、最終的にはこの**手放すこと**に計り知れない喜びを見出したと述べています。

私はあなたに、あなた自身の人生と他者の人生における苦しみを減らすために、何を放棄できるかを考えるよう促します。セラピストとして、私たちはこの意識を開き、ある種の**シンプルさ**に向かう責任があります。これは、私たちの**特権**の一部を放棄することに喜びを見出すことさえ意味するかもしれません。

02. 眼の紹介

所要時間 : 06:56

学習シート


コース概要

このビデオは、眼の解剖学と生理学を魅力的に掘り下げ、視覚だけでなく、バランスと感情認識におけるその重要な役割を明らかにしています。主要な概念には、眼と心臓の密接な関係、眼の緊張が肝臓に与える影響、そして発生学、解剖学、精神的側面を組み合わせた学際的アプローチの必要性が含まれます。全体的な文脈で眼に対処する方法を学ぶことで、セラピストは感情が認識に与える影響をよりよく理解し、ひいては、身体構造と私たちの視覚に影響を与える環境情報との間のつながりを考慮に入れることで、彼らの実践を改善することができます。

目の紹介

目は、私たちの世界認識において極めて重要な役割を果たす魅力的な構造です。私たちの**脳**の一部である網膜は、最小の光の粒子である**光子**を検出することができます。目は実際には私たちの脳の**延長**であり、活発な脳活動を伴います。

目の重要性は視覚に限定されません。それは私たちの**重心**に直接影響を与え、重心もまた目に影響を与えます。この意味で、目は体のすべての**筋膜の灯台**として機能します。診察で観察される眼の緊張は、しばしば**肝臓**に関連しています。例えば、赤目や黄疸は肝臓の問題の現れである可能性があります。



図一 テキストに記載されているように、「筋膜の灯台」としての目の概念と、重心への影響。

また、発生学の初期段階から、目は**心臓**と関連して発達することも興味深い点です。喉や手と同様に、目もリズムカルな情報を受け取ります。これらの体の異なる部分は**電気的**および**電磁的**な電荷を伝達します。例えば、私たちは声や視線によって誰かに影響を与えることができます。

目は心臓だけでなく、私たちの環境からも情報を受け取ります。特にアルファ波などの**脳波**は、私たちの知覚の安定化に役割を果たします。仏教徒は、心臓と目を結ぶ**見えない糸**について語り、このつながりの重要性を強調しています。

心で見ることを学ぶことが不可欠です。このアプローチは私たちの知覚を変え、私たちの視覚に微妙な変化をもたらすことができます。単純な言葉、ジェスチャー、または視線は、人をブロックすることも解放することもでき、人に深い影響を与える可能性があります。

視力を鍛えるためには、**注意**が重要なツールです。恐れや怒りのような感情は、現実の認識を歪める可能性があります。例えば、怒りは一時的な明晰さをもたらすかもしれませんが、私たちの視覚を歪めることもあります。

目の治療には、**発生学**、**解剖学**、そしてより**精神的**な側面を含む学際的なアプローチが必要です。私たちは、知覚、感覚、意識の世界を理解するために不可欠なさまざまな**スカンダ**を探求します。私たちの偏見が私たちの視覚に影響を与える可能性があるため、幻想と現実を区別することが重要です。

目は、周囲の影響を受ける**適合器**です。骨が形成される前から存在し、位置、可動性、情報統合の法則に従います。また、目の**神経感覚**レベルと**神経運動的**関与を理解する必要があります。

光が目にあたると、**変換**が起こり、光が電気に変換されます。この情報はその後、**脳**、特に外側膝状体へと伝達され、私たちの知覚に影響を与えます。私たちの知覚は私たちの経験や感情に強く影響されるため、私たちは現実の約**80%**を見方の中で失っていることに注意することが重要です。

オステオパシー医として、これらの環境情報と顔面情報を受け取ることが重要です。目を治療することは、体全体を治療することを意味します。なぜなら、目は身体構造と現れる可能性のある問題との間の**バランス**として機能するからです。

03. 眼の起源

所要時間 : 07:12

学習シート

コース概要

このビデオでは、発生8日目から間脳から発達する眼の起源を深く掘り下げています。羊膜腔と脳脊髄液（CSF）の重要性、そしてこれらの要素が眼の形成とその環境との動的平衡にどのように影響するかに焦点が当てられています。羊膜腔、脳室系、眼の関係が強調され、個人の健康に影響を与え、眼を通して現れる可能性のある臨床的および遺伝的影響も強調されています。この理解は、セラピストが患者のバランスを評価し、回復させるのに役立つため、オステオパシーと生体力学的発生学を実践する人々にとって不可欠な教育となります。

眼の起源

眼は、胚発生8日目に現れる**羊膜腔**と呼ばれる小さな空洞の形成と驚くほど**類似**しています。この空洞は眼の発達にとって極めて重要であり、眼は**脳**、より正確には第三脳室の拡張である**間脳**に由来します。



図 — 第三脳室に関連した、間脳からの眼の起源に関する図。


この発達の過程で、神経系は**原始羊水**を受け取り、それが**脳脊髄液（LCR）**を形成します。羊水に由来するこの最初のLCRは、神経管内に閉じ込められます。その後、この管は前方に開口し、**原始小胞**を形成します。



図一 概要でこの文の直後に触れられている羊膜腔の出現に関する図。

この羊膜腔の痕跡は、**骨のポケット**または**ゾーンB**と呼ばれる、脳脊髄液が存在する場所に残っています。胚の内側と外側の液体が同じであることは興味深い点です。眼は膜として、常にこのゾーンBのバランスを取ろうとします。

ゾーンAは身体の物理的な中心軸を表し、羊膜腔は8日目に形成され始め、**粘膜**への侵入を示します。この段階で、中心の液体が失われることで小さな空洞が作られ、この段階では**上胚葉**と呼ばれる**外胚葉**が形成され始めます。これはすでに、眼と脳を形成する微細な構造を構成しています。



🖼 — Vestige de la cavité amniotique (zone B)

9ヶ月間胚を取り囲む羊膜腔は、その後蒸気状の空間になります。この空間は内部の液体と平衡を保つ必要があります。特に事故の場合、不均衡が生じ、眼の位置に影響を与える可能性があります。したがって、眼は神経系の液体（LCR）の深さと周囲の空間との間の平衡を表しています。

眼の位置を観察することで、その人の平衡に関する情報が明らかになることがあります。各個人はわずかに異なる眼を持っており、それはしばしば脳の構造と関連しています。**垂直性**に対する**水平性**の探求は、消化器系と腹膜系の平衡と同様に不可欠です。



図 — 着床プロセス：腔の形成

治療後に眼を観察することは非常に重要です。眼の位置が安定していない場合、それは平衡がまだ回復していないことを示しています。羊膜腔は、もはや液体の形ではありませんが、蒸気状など他の状態で存在し続けています。

羊膜腔、眼、脳室系とのこの関係は極めて重要です。眼は第三脳室の拡張として、**前神経孔**が閉じる前に発達し始めます。さらに、肝脾臓系、心臓系、甲状腺系などの影響を受ける領域における情報の共局在化など、興味深い遺伝的意味合いがあります。



図 — 羊膜腔

糖尿病、心臓病、甲状腺疾患などの病状は眼を通して現れることがあり、これにより正中軸と側方性の組織化における**神経堤**の重要性が明らかになります。

04. 眼の配置

所要時間 : 08:39

学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学とオステオパシーの観点から眼の形成について探求します。内胚葉と中胚葉の相互作用、そして脊索と神経管の主要な役割が、眼のような必須構造の形成にどのように関与しているかを学びます。浸透と注入の動き、そして極性の概念は、胚発生の根底にある重要な概念です。さらに、感情的または身体的なむち打ち損傷に対応する再調整技術が、眼の最適な発達に必要な動きをどのように回復させ、最初の心拍などの出来事と結びつけることができるかについても議論します。

眼の形成

内胚葉は上皮であり、一方、**中胚葉**は結合組織です。これら2つの主要な組織タイプ、つまり内部組織と外部組織の間のバランスを理解することが不可欠です。例えば、消化器上皮は内部にありますが、境界組織として機能します。

神経溝と**神経板**の前駆体は**脊索**です。この縦軸に沿った外反のプロセスは、体の原始軸を構成する**原始線条**と関連しています。この軸は、細胞をその空間、時間、および運命に従って組織化するため、非常に重要です。

18日目には神経板が発達し、3番目の腔である**外体腔**が出現します。この極性の変化と軸の再編成は、尾部領域からの吸引場によって原始線条を作り出し、情報が「吸引」されます。この現象には、**透過**と**注入**と呼ばれる動きが伴います。

透過運動は、胚の周囲で起こる大きな代謝運動であり、**羊膜腔**を前進させます。このように、羊膜腔、卵黄嚢、そして将来の神経系を形成する**上胚葉**と呼ばれる組織が区別され、その下の組織は将来の消化器系を形成します。

この運動により、脊索の形状がS字型に変化します。この分化成長は極性に関連しています。原始軸は上皮組織を組織化し、上皮組織は脊索との関連で誘導と抑制の現象によって反応します。




図一 分化成長


神経板は進化して**神経溝**となり、脳脊髄液、あるいはむしろ原始羊水を含みます。この溝の閉鎖により**神経管**が形成されます。第4の胚組織と見なされる**神経堤**は、眼の発達において重要な役割を果たします。



图一 原始羊水



図一 神経溝の形成



図一 神経板の神経溝への変換

脊索は眼の形成に不可欠です。バランスの取れた脊索がなければ、安定した眼を持つことは不可能です。同様に、脳の安定性を保証するためには自由な仙骨が必要です。したがって、良好な垂直性を確保するために仙骨を再調整することが不可欠です。




図 — 閉鎖による神経管形成と神経堤の形成

胚は羊膜腔、卵黄嚢、および二層胚盤を持ち、これらは脊索軸と神経管の周りに組織化されます。この神経管の形成には、羊膜腔と卵黄嚢の閉鎖が伴います。

胚の縦軸が発達するにつれて、脳の前基が形成され、胚の中心で閉鎖し、上部に痕跡を残します。この空間で**水晶体プラコード**が発達し、眼を形成します。

神経管が閉鎖する前に、皮質の発達の基礎となる脊索を形成するための誘導現象が起こります。この発達から、脳脊髄液で満たされた脳室系の拡張である眼が出現します。眼は液体の球体、光子に対する微妙なフィルター、そして周囲空間の平衡化と見なすことができます。

むち打ち症によってしばしば影響を受ける特定の領域を治療することで、眼のバランスを再調整することが可能です。これらのむち打ち症は感情的または身体的な起源である可能性があります。むち打ち症を治療するには、胚発生に不可欠な**頭部化**、**心臓化**、**横隔膜化**、および**肝臓化**の動きを回復させることが含まれます。

眼の出現は、22日目頃の最初の心拍から始まります。最初の上胚葉細胞の変換は、これらの原始的な心拍と同期して起こり、眼の発達と心臓活動との間に重要な対応関係を確立します。

05. 脊索の影響

所要時間 : 03:50

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における脊索の重要な役割、特にソネティックシステムS-hatch、40Aや40Tといった重要な要素を介した神経管への影響を探ります。学生は、脊索が電磁信号をどのように発し、それが臓器形成のGPSとして機能し、ベータカロテンやレチノイン酸などの栄養素を利用するかを学びます。細胞のダイナミクスと左右差の観察を通じて、このビデオは、脊索を単なる構造としてではなく、胚の組織化に不可欠な機能として認識することの重要性を強調し、脳と目の形成において重要な役割を果たしていることを明らかにします。

脊索の胚発生への影響

脊索は胚発生において極めて重要な役割を果たし、特に**神経管**に影響を与えます。この脊索が、**S-hatchソネティックシステム**と呼ばれる信号を発していることを理解することが不可欠です。これには**40A**や**40T**といった要素が含まれます。これらの誘導現象は、特に**ベータカロテン**や**ビタミンA**が40Tと統合され、**眼**の発生に不可欠であるという点で重要です。**レチノイン酸**もこの段階で重要であり、大きな遺伝子が関与しています。

神経管が発達する中心軸を想像してみてください。この脊索軸は、周囲の細胞にとっての**GPS**のように機能する**電磁場**によって位置情報を提供し、様々な**タンパク質**の反応を引き起こします。例えば、眼は特定の場所で発達し、足のような他の部分は別の場所で形成されます。正中線に対して受け取られる情報は、空間と時間によって異なります。

この脊索軸から発せられる電場は、左右および前後へと広がります。**結節流**に入ると、雪が降るように動く細胞が観察され、繊毛が脊索の軸を中心に回転しています。このダイナミクスにより、左側へ微細な情報が伝達され、胚の**左右非対称性**に寄与します。

対称性は存在せず、むしろ脊索に対する遺伝情報の構造化には**調和**があることに注意することが重要です。細胞を**分子**と見なすならば、**タンパク質**が生成され放出されます。これらの情報は**ゲノム**から来ており、**ソネティックエッジ**や**PAX時空間**の文脈を含め、時空間に応じて様々な遺伝子を活性化します。

脊索が単なる構造ではなく、**機能**であると理解することが極めて重要です。この区別は根本的です。脊索を機能として捉えることで、その力と反応を把握することができ、これは**脳**と**眼**の組織化にとって不可欠です。

06. 抑制と共局在

所要時間 : 05:42

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における抑制と共局在の複雑なメカニズムを探り、左側性の重要性和神経管閉鎖の決定的な役割に焦点を当てています。取り上げられる主要な概念には、視神経細胞の形成、神経堤と肝膵臓系や心臓などの様々な器官系との相互作用、そしてこれらの相互作用が眼の進化にどのように影響するかが含まれます。電磁気理論の原理を統合することで、このビデオはこれらのプロセスが胚の形態とゲノム発現に与える影響を示しています。

発生における抑制と共局在

側性、ソネティック、ハッチの情報は、胚発生、特に左右のダイナミクスにおいて不可欠です。**左側性**が確立され始めますが、抑制現象がソネティックとハッチの前方への発現を妨げ、側方への発現を促進します。

この抑制は、**神経管の閉鎖不全**に関連しています。この抑制がなければ、単眼症が発生する可能性があります。なぜなら、2つの小さな側方小胞の形成を可能にするのは中心の抑制だからです。神経管が閉鎖されていない場合、眼は22日頃に現れ、前神経孔の閉鎖は24日または25日頃に起こります。

この段階で、「**負の**」情報と呼ばれるものが神経堤から発生し、**肝膵臓系**および**心臓**からの情報と共局在を示します。心臓は、喉と同様に、神経堤から重要な情報を受け取ります。これらの共局在は眼のレベルで発現し、異なる空間でコードされる遺伝子を巻き込み、遺伝情報の共局在システムを示しています。

自己体はゲノム機能を表現し、体の参照として機能します。極性から生じるこの電場は基本的です。**マクスウェルの法則**によれば、すべての電場は電磁場を生成します。したがって、各個人は特定の情報を受け取ります。

アノトコルテでは、前方の細胞はソネティックHHと呼ばれる情報を受け取ります。この成長が遅くなると、加速が起こり、上皮の拡大につながり、遺伝的プロセスに関連します。しかし、神経管が閉鎖されるまでは、小さな空間が残ります。

抑制がなければ、眼は中央に発達し、単眼症の形成につながります。神経管の閉鎖は、神経堤が側方に発現するために不可欠です。閉鎖が完了すると、負の抑制は、**甲状腺**、**心臓**、**肝膵臓**の共局在現象に関連して眼に影響を与えます。これらの主要な臓器は眼に直接的な影響を与え、眼は血管性間葉組織である**脈絡膜**と強く関連しています。

眼が空間でどのように相互作用するかを考慮することが重要です。胚の大きな屈曲は、成長とこの屈曲のために形成される**視覚小胞**の出現に関連しています。この屈曲は、血管系が巻き付く**原始大動脈血管軸**によって誘発されます。

07. 眼プラコードの形成

所要時間 : 04:28

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における重要なイベントである眼プラコードの形成について深く掘り下げます。外胚葉と神経管から最初の眼の原基が出現し、オートクリン、パラクリン、ジャクスタクリンなど、さまざまな形態の細胞間コミュニケーションと、ソニックヘッジホッグ（HH）などの遺伝的現象との相互作用の重要性が明らかになります。私たちは、眼胞の形成と上胚葉から原始眼プラコードへの変換を探求し、脊索やコロボーマ裂などの周囲構造が眼の形態形成に与える影響を強調します。この内容は、眼の胚発生の理解を深めたい学生やセラピストにとって不可欠です。

眼板の形成

このセクションでは、表面外胚葉と神経管からの**眼板の形成**について探求します。



図 — 神経管と形成される視蕾

まず、内部に**神経管**があり、**神経孔**とまだ閉じていない**脳溝**が見られます。この段階で、最初の**眼の原基**が現れます。この出現は、外側への支持点による**拡張**によるものです。

細胞間コミュニケーションの種類

さまざまな種類の**細胞間コミュニケーション**を理解することが不可欠です。

1. **自己分泌 (Autocrine)**：細胞が直接自分自身に情報を伝える。
2. **傍分泌 (Paracrine)**：細胞が直接接触によって隣接する細胞に情報を伝える。
3. **遠隔分泌 (Telocrine)**：**内分泌**ホルモンの場合のように、遠隔でのコミュニケーション。
4. **神経分泌 (Neurocrine)**：神経伝達物質によるコミュニケーション。
5. **接着分泌 (Justacrine)**：隣接する細胞間のコミュニケーション。

眼板の場合、外胚葉からの情報は遺伝的現象、特に**ソニックヘッジホッグ (HH)**に関連しており、これは前脊索板の先端で阻害されます。これにより、さまざまな遺伝的現象によって**側方拡張**が引き起こされます。

眼胞の形成


一次眼胞が形成され始めているのが観察されます。2つの側方小胞が現れ、表面の上皮芽の部分に押し付けられます。**接着分泌的な代謝反応**が起こり、膨張して**原始眼板**を形成します。

当初、**7日目から8日目**の間に上皮組織が現れます。この組織は**神経板**へと進化し、**脊索**の影響下で形を変えて**溝**になります。この溝は閉じて**神経管**を形成します。上部は消失し、**神経堤**と表面の上皮組織が残ります。

羊水と脳脊髄液

眼板の上にある液体は、内部にある液体と同じ、つまり**羊水**であり、これは後に**脳脊髄液（LCR）**になります。

小さな側方小胞は膨らみ、**接着分泌的な分子接触**のおかげで、上皮組織が変化して**眼板**を形成します。この眼板は**支点**となり、図では沈み込んでいるように見えます。これは、外部からの成長によって支持点が作られるためです。



図一 肥厚し支点として機能する視板

コロンボーマ裂

コロンボーマ裂が存在し、その中を**硝子体動脈**として知られる動脈が通っていることに注意することが重要です。この裂は、眼板とその周囲の構造の発達において重要な役割を果たします。

08. 網膜と水晶体の起源

所要時間：04:24


学習シート

コース概要

眼の発生学、網膜の進化から水晶体までを考察する。傍分泌コミュニケーションと、上皮芽、脳脊髄液、羊水間の相互作用を強調する。一次および二次視神経胞の研究、硝子体血管の網膜ネットワークへの変換（化学勾配によって調節される脳の拡張）。水晶体の器官形成は、表面上皮と眼房の区画化に関連している。

網膜と水晶体の起源

眼の進化は、異なる構造間の**空間**の観察から始まります。**上皮芽**が付着して形を変える一方で、内部には**脳脊髄液（LCR）**と**羊水**があり、これらは共通の起源を持っています。




図一 眼の発生の初期段階

juxtacrineコミュニケーションが確立され、分子レベルでの結合が可能になります。また、血管の経路も観察され、これは眼の血管組織である**脈絡膜**の最初の波を表しています。この侵入は、**小胞**の存在や**化学勾配**など、さまざまな要素を含む動脈の形成に不可欠です。

コロボーマ裂は**硝子体血管**の通過を可能にし、これらは後に**網膜血管**に変化します。上皮芽とこの領域とのコミュニケーションにより、**一次視胞**が形成され、これは**二次視胞**へと進化します。この組織は網膜の**内層**と**外層**に分かれ、**網膜空間**を形成します。


解剖学者や発生学者は、網膜は**脳**の延長であり、脳脊髄液と細胞間平面に滲み出た情報の影響を受けていると考えています。**水晶体胞**は、後に**水晶体**となるもので、これも表面上皮芽に由来します。この出会いは、juxtacrineコミュニケーションによって行われます。



図一 視小胞の形成と網膜の分化

水晶体は内部に形成され、表面上皮は**神経管**の形成と同様のパターンでその場にとどまります。表面の皮膚は異なる層に分かれます。水晶体組織は眼の最初の層を構成します。

結膜は眼を覆う最初の膜であり、将来のまぶたも覆います。水晶体の内部では、空間が**前房**と**後房**の2つの部屋に分かれます。網膜は、タバコの紙のように非常に薄いです。



図一 水晶体の発生と陥入

09. 眼の様々な層 1

所要時間 : 05:01

学習シート

コース概要


眼球組織学（強膜、脈絡膜、毛様体突起、網膜）とその機能的特異性の分析。組織診断アプローチとしての虹彩学の原則の紹介。光受容体と色素層の活動の詳細な説明、視覚伝達の生化学的メカニズムの図解。

目の様々な層

目は、何枚もの靴下を重ねたように、いくつかの層で構成されています。

1. 強膜

最初の層は**強膜**と呼ばれ、前方の**角膜**と連続しています。角膜は**透明な**構造で、光が目に入るのを可能にします。**角膜縁**と、**強膜**として知られる目の白い部分が、この最初の靴下を構成しています。



図一 眼の一般図

2. 脈絡膜

強膜を取り除くと、非常に**血管が豊富な層**である**脈絡膜**が現れます。脈絡膜は前方の**虹彩**へと続いています。**虹彩学**は、虹彩を通して健康に関する情報を読み取る実践であり、虹彩は**硫黄**のような様々な要素を蓄えることができます。

3. 毛様体突起

毛様体突起と**虹彩の懸垂靱帯**は、目の**生理機能**において重要な役割を果たします。これらの構造は**調節システム**に不可欠であり、**水晶体**が形を変えることで、画像が**網膜**に適切に投影されるようにします。

4. 網膜

3番目の靴下は**網膜**で、最も深い神経組織であり、**脳**の延長です。網膜は内層と外層の2つの層で構成されています。**網膜剥離**は、これら2つの層の間に空間が生じたときに起こります。



図一 眼の被膜、毛様体突起、網膜

5. 色素層と光受容体

網膜には**色素層**と**光受容体**も含まれており、これらは**錐体**と**桿体**に分かれます。これらの細胞は**光変換**に不可欠であり、光子が電気エネルギーに変換されるプロセスであり、それによって視覚認識が可能になります。

結論

目のこれらの異なる層は、それぞれがこの複雑な器官の機能において特定の重要な役割を果たし、協力して視覚を可能にしています。

10. 発生運動の想起

所要時間 : 06:13

学習シート

コース概要

このビデオは、発達運動に関する重要な洞察を提供し、頭蓋骨の統合と脳の発達、およびそれらが眼機能に与える影響に焦点を当てています。頭部化、心臓化の概念、および口蓋の重要性が、構造と機能の相乗効果を説明するために検討されています。自己調節メカニズムと胚性力の役割を強調することにより、このトレーニングは発達マッピングと解剖学的軸の深い理解を可能にします。これにより、体内の電磁場における電氣的相互作用と動的運動を考慮して、腱炎などの病状の治療に新たな視点をもたらします。神経生理学と治療への影響も議論され、実践者に新たな道を開きます。

発達運動の再確認

頭蓋と脳の発達の統合は、発達運動を理解するために不可欠です。最初は非常に外側に発達する眼は、徐々に前方に移動します。このプロセスは、**頭部形成（セファリゼーション）**、**心臓形成（カーディアリゼーション）**、**脳の上昇（アセンサス）**、**内臓下降**といったメカニズムを含む、身体の全体的な発達の一部です。

この発達は、**口蓋**にも影響され、口蓋は頭蓋平面上で眼の支持点となります。頭蓋の各骨は、眼の適切な機能において重要な役割を果たします。この発達運動を理解することで、**機能的な力**と**治療的な力**を把握できます。**構造**、**機能**、**形態**の関係は根本的です。形態は構造と機能の表現です。良い構造は良い形態につながります。

身体には、**アロスタシス**と**ホメオスタシス**のプロセスを通じてバランスを保つための**自己調節メカニズム**があります。アロスタシスは、バランスを維持するのに役立つ内部プロセスです。胚の力、または治癒力は、胚が形態を発達させるのと同じエネルギーを使用します。したがって、胚発生と身体の再生は共通のエネルギーを共有しています。

発達プロセスを知ることは、特定の組織に従うこの発達の**マッピング**を理解することです。例えば、四肢はまず特定の方法で開き、その後より複雑な動きをします。この発達は、身体の他の動きと同時に起こります。

脳の重要性は極めて高く、**解剖学的軸**と**構造的軸**を再検討する必要があります。最終的に、これらすべては**電場**として現れます。腱炎の治療では、電氣的な観点から考えることが適切です。なぜなら、これらの脳軸への介入は、単純な構造ではなく、電場に関わるからです。

眼は純粋なエネルギーの球体に根ざしており、電気軸を探しています。この**極性**の概念は、栄養細胞や卵細胞、および特定の代謝濃度とともに、最初から生物に組み込まれています。これらの電気分子レベルが動的な動きを生み出します。

眼に働きかける際には、これらの電氣的側面を考慮することが重要です。眼の軸は根ざしており、根の動きは電磁場がどのように機能するかを示しています。これらの動きは線形ではなく、分子やイオンの動きです。光子から電場への**変換（トランスダクション）**は、膜透過性の変化を伴い、これは**神経生理学**の枠組み、特に**ロドプシン**や**メタロドプシン**といった要素とともに探求されます。これらの統合の変化は、エネルギー情報が膜の形態をどのように変化させるかを示しています。

11. 実践：V4とゾーンBの圧迫

所要時間：07:04

学習シート

コース概要

このビデオでは、マンガリ孔と脳内および脳外環境のバランスに関連して、第4脳室圧迫（CV4）の実践について探求します。参加者は、脳脊髄液の循環と身体の調和を促進するために、このテクニックを効果的に使用する方法を学びます。これには、中立的な態度や広範な注意の重要性といった主要な概念が組み込まれます。臨床例と正確な指示を通じて、このセッションはセラピストを圧迫の技術へと導き、治癒プロセスにおける忍耐と心身のつながりの重要性を強調します。

実践：V4圧迫とゾーンB

このセッションでは、**第4脳室の心室圧迫（CV4）**について説明します。このテクニックは、**脳外空間**の探索を表す重要な概念である**マンガリ**と関連しています。

第4脳室レベルでの接続は不可欠です。なぜなら、それは**脳脊髄液**を生成する**脈絡叢**と関連しているからです。後方には、**脳内液**コンパートメントへの開口部があり、第4脳室を第3脳室、眼、側脳室に接続しています。この通路は**マンガリ孔**として知られています。

この実践の目的は、脳内環境と脳外環境の間の**バランス**を追求することです。眼はこのバランスにおいて重要な役割を果たしており、CV4を通してこの調和の状態を達成するために取り組みます。

圧迫は少なくとも**7分間**持続させ、体が**表現**し、解放されることを可能にする必要があります。この段階では、**EV4**、つまり第4脳室の**ゾーンB**への拡張を行い、周囲の空間を満たすために注意深く耳を傾けることが重要です。

この実践中は**中立性**の態度をとることが不可欠です。「うまくやろう」とすることは、内的な競争を引き起こす可能性があるため避けてください。空間が自然に形成されるようにしてください。なぜなら、**2つの中立**が出会うことで治癒が起こるからです。

例として、ベッカーを治療した**ジャルーズ**医師の例があります。数分間の治療後、ベッカーは焦りを感じましたが、ジャルーズは、真の治療はしばしば操作の終了後に始まると説明しました。プロセスが定着し、部屋が落ち着く時間を許すことが重要です。

CV4を視覚化するには、**イニオン**のすぐ下、**小脳**の後ろに位置します。**頸動脈**を圧迫しないように注意してください。もし青くなったら、圧迫を中止する必要があります。親指はわずかに緩め、良い**支点**を見つけることが重要です。

CV4には、手だけでなく体全体が関与します。前方、後方、左、右のバランスを見つけ、自身の**重心**に集中してください。圧迫は意識的な行為であり、体と心が手の奉仕にあるべきです。

視線で圧迫しないことが重要です。集中しすぎると意識を失う可能性があります。**広々とした注意**を維持し、ゾーンBと内部の液体をバランスさせるように努めてください。

反応を感じた場合、それは**EV4**を示します。これは、**マルジャンディ**と関連して、脳外コンパートメントと脳内コンパートメントの間の再平衡化を表す開口部です。

12. 無常

所要時間 : 09:08

学習シート

コース概要

このビデオは、無常とその認識や感情への影響について深く探求しています。教えは、瞑想のような実践を通して私たち自身のパターンを認識することの重要性を強調し、思考を観察し、中立の状態に戻ることを教えています。さらに、視覚システムの機能と、私たちの偏見が現実の認識にどのように影響するかについても触れています。経験の相互依存性を理解し、重心に取り組むことで、生命エネルギーを調整し、病気ではなく健康に焦点を当てたアプローチを促進することができます。より意識的な治療の道のために、あなたの認識に疑問を呈し、誤った解釈から解放されることを学びましょう。

無常

私たちの認識を広げることを少しずつ学ぶことは不可欠です。これは、もう少し目を開いて生き、自分自身の**パターン**を見つけることを学ぶことを意味します。パターンを観察してください。観察できれば、それを**浄化**できます。私たちはしばしば、自分の窓を拭くための雑巾として他人を利用します。

私たちは、**満足**のパターンを、それが対象であれ物体であれ、自分の外側に投影していることに気づいたことがありますか？そしてある日、私たちは失望します。重要なのは、ある時点で、私たちは相手を恨むということです。さらに進んで、外側に投影しすぎた後、全世界を恨む人もいます。

自分自身のパターンを観察し、見つけることが重要です。それを達成する方法の1つは、**瞑想すること**です。自分の心を発見したいなら、瞑想してください。数秒後には思考が湧き上がり、そのうちの1つにしばしば囚われてしまいます。瞑想とは、これらの思考を観察し、**中立**の状態に戻ることです。これは、中立ではない自分自身のパターンを徐々に発見することを教えてくれます。

あなたが見るとき、何を感じますか？それは即座で受動的で、目を開けると、世界がそこにあります。私たちはしばしば、**見ることは信じる**ことだと考えます。私たちは見たから信じるのです。しかし、私たちが見るものは普遍的な真実ではありません。それは客観的な現実ではありません。なぜなら、私たちの認識に影響を与える**偏見**があるからです。自然はこれらの偏見を考慮せず、治療プロセスも同様です。

私たちは、唯一無二だと考える**仮想現実**を作り出しています。興味深いことに、あなたの視覚野は脳の**30%**を使用しており、触覚の**8%**、聴覚の**2-3%**と比較してはるかに多いです。毎秒、あなたの目は約**20億の情報**を視覚野に送りますが、体の残りの部分は10億しか送りません。これは、視覚が脳の容積の3分の1を占め、リソースの3分の2を使用していることを意味します。したがって、視覚がこれほど重要な錯覚であることは驚くことではありません。

上丘や扁桃核を含む**パベツツ回路**は、あなたが見るものすべてがあなたの**感情**に影響を与え、その逆もまた然りであることを示しています。これは、視覚が**精神的な構成物**になることを意味します。例えば、恐怖は現実を歪めることがあります。私は、映画を見た後、恐怖と危険を結びつけてしまったトラウマを抱えた子供を診たことがあります。これら2つの経験を切り離すことで、私は彼の現実認識を再調整することができました。

何ものもそれ自体で存在しません。このことを理解すると、私たちの見方は変わります。**エゴ**でさえ自律的に存在するのではなく、集合体となります。すべては**相互依存的**であり、**無常**です。無常とは、エネルギーと動きを与えるものであり、私たちの**生命エネルギー**、つまり**気**を表します。

無常と向き合うためには、あらゆる瞬間、あらゆる思考、あらゆる細部に注意を払う必要があります。これは、私たちの投影や恐怖を超えて見ることを学ぶことを意味します。少しずつ、私たちは**誤った解釈**から解放されなければなりません。これは常に容易ではありません。時には、私たちは自分のイデオロギーに固執したいと思うことがあります。

現実の中にいるとっていると、誤った感情を抱く危険があります。私は、あなたの**内なる力**を活用し、幸運と成功に関するあなたの考えを再調整することを提案します。良い意図を持つことが最も重要です。

私たちはあなたの**重心**と向き合います。生命エネルギーは腹部にあり、それは**ARA**、重要な中心の1つです。この無常がこの生命エネルギーを支えています。あなた自身の中心と調和できれば、それははるかに強力になるでしょう。

私たちは、**誘発された動き**、**許容された動き**、**現在の動き**という3つの主要な種類のエネルギーと動きを探求します。自分の強さと弱さを受け入れることは、多くの可能性に心を開くことと同様に不可欠です。

急性疾患を抱えて来院する患者さんには、よく「治ったら何ができるようになりますか？」と尋ねます。これは新しい方向性を作り出します。なぜなら、病気と戦うのではなく、**健康**と向き合うことが重要だからです。私たちの注意を健康に向けることが不可欠です。

13. 原始頭蓋仙骨軸

所要時間 : 03:34


学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生第2週目に脊索の形成とともに現れる、原始的な頭蓋仙骨軸を深く掘り下げて探求します。この教育は、頭蓋骨と仙骨にとってこの構造がいかに重要であることを強調し、特に、仙骨が自由であることが脊椎の機能と頭蓋底の屈曲伸展を確保するために不可欠であると指摘しています。さらに、このビデオでは、これらの胚発生のダイナミクスが泌尿生殖器の病状に与える影響、およびS状結腸と膀胱の間の特定の感情的またはエネルギー的な閉塞を解放することが、全体的なバランスの改善にどのように貢献できるかについて論じています。学生は、これらの概念を操作して、オステオパシーと生体力学的胚学の実践を向上させる方法を学びます。

原始頭蓋仙骨軸

胚発生第2週において、上胚葉の**S字型**が**脊索**を形成し始めます。**エンセン結節**、または原始陥凹は、固定された支点となり、徐々に後方へ移動します。



図一 上胚葉のプロセスの始まり

この構造は、**下垂体**、**蝶形骨の大翼**、**錐体システム**、**後頭骨システム**、**篩骨**などの要素を統合する**頭蓋骨**の基盤を形成するため、不可欠です。下方では、原始線の痕跡であるS2のプロセスを伴う**仙骨**の発生が始まります。このプロセスは重要な支点となり、機能的単位を可能にする**自由な仙骨**の重要性を強調します。

この発生段階では、胚は脊索と原始線を持つラケットのような形をとります。この成長プロセスは、特に心臓前野の**中胚葉**を形成するための吸引場を生成します。胚の前方成長はこの領域に物質を吸引し、**ボトル細胞**の形をした細胞を中央に引き込みます。これらの細胞は、間葉レベルで不可欠な**ヒアルロン酸**を放出します。

脊索軸は、仙骨の動きの自由度に影響を与えるため、基本的です。仙骨がブロックされると、脊椎が適切に機能せず、頭蓋底に影響を与えます。自由でない頭蓋底は、良好な**屈曲-伸展**を妨げ、**神経頭蓋**と**内臓頭蓋**の間の不均衡を引き起こします。

このダイナミクスは、眼が定着する頭蓋骨の上昇力と、**中胚葉組織**の形成に関連しています。外胚葉の成長は上方に引っ張り、原始結節は仙骨に向かって下降します。これにより、母親に関連するタンパク質情報の重要な領域が作成されます。

多くのブロックされた**祖先のイメージ**は、S状結腸と膀胱の間に位置しており、これらの情報をクリアすることが重要です。泌尿生殖器の問題はこれらの情報によって伝達される可能性があり、仙骨の下降移動力がこのプロセスにおいて重要な役割を果たします。

14. 眼の様々な層 2

所要時間 : 05:25

学習シート

コース概要

このビデオでは、クロケ管、房水、硝子体液、外胚葉からの水晶体発生など、眼のさまざまな層を深く掘り下げています。主要な概念には、水晶体形成における陥入の重要性、および水晶体小胞と網膜を含む眼の前後部の区別が含まれます。眼の構造間のつながりを明らかにすることで、このビデオは、セラピストの実践と眼疾患の理解を豊かにする複雑な胚発生プロセスに光を当てています。

眼の様々な層

眼には、**クロケ管**と呼ばれる**細い管**が残っています。この管は硝子体液の中の痕跡です。

房水と**硝子体液**は、眼に存在する2種類の体液です。硝子体液は、眼の中に浮かぶ**ゼラチン状の水の風船**と考えることができ、その中心には**水晶体**に直接つながる細い管があります。この管は**視神経**または**硝子体動脈管**にも関連しています。

水晶体は表面の**外胚葉**に由来します。発生の第5週には、**陥入**によって**血管新生した間葉**に囲まれた**水晶体小胞**が形成されます。プラコードは陥入して水晶体となり、これは**神経管**の形成と同様のプロセスです。この動きにより内部に空間が残り、それが水晶体となります。




図 — 外胚葉の陥入

水晶体は、**原始線**を形成する進化を遂げます。それが神経管のように発達して調節のレンズになる仕組みを理解することが不可欠です。

コロボーマ裂には、動脈とともにクロケ管を形成する線があります。この管は、中央にある**硝子体動脈**と**硝子体静脈**とともに閉鎖します。一次水晶体小胞は、プラコードとともに二次水晶体小胞へと進化します。

外側には、**強膜**と呼ばれる層が形成され、これが最初の靴下を構成します。**脈絡膜**は2番目の靴下を形成し、水晶体と連結しています。眼は**前部**と**後部**の2つの部分に分けられます。前部は**前房**と**後房**に分かれます。

結膜と**角膜**は連続しており、角膜は透明で強膜と連続しています。**UV**（ラテン語のuva、ブドウの意）とも呼ばれる脈絡膜は、血管が豊富な皮膚です。それは3つの部分に分かれます。脈絡膜、前方の角膜、そして脈絡膜の連続である後方の**虹彩**です。

虹彩は**チン小帯**と**毛様体筋**によって保持されています。

最後に、**網膜**は眼の最も内側の層です。それは最初の小胞である**一次視神経小胞**に由来し、杯状の構造を形成して発達します。網膜は内層と外層の2つの層で構成されており、**網膜剥離**が起こるのはここです。

15. 神経堤

所要時間：03:29

学習シート

コース概要

このビデオは、神経堤の動きに焦点を当てています。これは、神経管形成後に多様な身体構造を生み出す発生学における重要なプロセスです。前脳、中脳、菱脳の動きのタイプを探求し、神経堤が胚発生における遺伝的および代謝的相互作用の理解にどのように疑問を投げかけるかを説明します。特に顔の構造における身体構造の兆候を特定する方法を学ぶことで、セラピストは患者の内部状態をよりよく解釈できます。このビデオはまた、組織形成における細胞移動と環境の影響の重要性を強調し、微小血管と微小神経の役割を強調することで、生体力学的発生学の統合された視点を提供します。

神経堤の動き

神経堤の動きは、さまざまな種類の**分化**と**誘導因子**が関与する複雑なプロセスです。これらの因子は**代謝的**または**受動的**な性質を持ち、**神経管形成**後に作用します。



図一 神経堤の移動

血管はシステムを導く上で重要な役割を果たし、**遺伝的**要素も細胞の適切な領域への方向付けに影響を与えます。

動きの種類

大きく分けて3種類の動きがあります。

- 前脳
- 中脳
- 菱脳

神経管の閉鎖時に、神経堤を形成する細胞が出現します。これらの細胞は体内でさまざまなプロセスを引き起こし、後ろから前へと広がる**流れ**を作り出し、**顔面**全体を覆います。これは、顔面、骨、皮膚、**広頸筋**のレベルまでが神経堤に由来することを意味します。

この組織は高度に**情報化**されており、**情報源**でもあります。例えば、お腹の中にあるものもすべて神経堤に由来します。**神経節**やその他の構造は、体の内部の状態を反映しており、しわ、目の下のクマ、肌の色を通して**顔を読む**ことを学ぶことができます。

移動と発達

前脳は**終脳**と**間脳**に発達し、間脳は大きく移動します。間脳は、**間脳**と前**中脳**とともに神経堤に移動します。この流れのプロセスは発達に不可欠です。

神経管の閉鎖前に、**肝膵系**、**甲状腺**、**心臓**に関連するような負の影響が神経堤に情報を提供します。神経堤は**外胚葉間葉**とも見なされます。後者は**中胚葉**と神経堤の混合物です。

神経堤の重要性

神経堤は**移動**と**定着**において基本的な役割を果たし、特定の特性に貢献します。また、**微小血管**や**微小神経**、特に**周皮細胞**の構築にも影響を与えます。

このプロセスにより、支持点と出現点が生み出され、成長する微小神経を再構築する**胚性周囲力**が提供されます。これらの相互作用は**電氣的な**レベルで起こることに注意することが重要です。

目のレベルでは、緑色の領域が前方の組織（**外胚葉**）を包み込み、形作ります。これは、特に**強膜**の周りで、この中胚葉の流れと関連しています。

16. 眼と記憶

所要時間 : 05:02

学習シート

コース概要

このビデオでは、神経および組織の記憶の概念を深く掘り下げ、私たちの体がどのように経験を記録し、これらの記憶が統合されないままである場合に身体にどのような影響を与えるかを詳しく説明します。子供の感情的な影響などの具体的な例を通して、このプロセスにおける副腎や甲状腺などの腺の重要な役割を探ります。眼球運動による脱感作と再処理（EMDR）や心拍変動バイオフィードバックなどの治療法は、これらの埋もれた記憶を治療し、私たちの存在の認知的に不調和な側面間のバランスを回復するためのツールとして提示されます。

目と記憶

神経記憶と**組織記憶**は、私たちの体がどのように経験を記録するかを理解する上で不可欠な概念です。**記憶**は、目の影響を受けて体のさまざまな部分に保存される可能性があります。これらの記憶が統合されない場合、**身体化**する可能性があります。言い換えれば、統合されていないものは物理的に現れます。

問題が未解決のまま残るたびに、体はそれを象徴的に記憶します。これは、鉱物、植物、動物、人間といったさまざまな**空間**に基づいています。この記憶は、**タイミング**、**協調**、**同期**のプロセスにも依存します。たとえば、3歳の子供が家に一人で残された場合、パニックを感じ、慢性副鼻腔炎などの身体症状を発症する可能性があります。この現象は、感情的な問題がどのように身体症状として現れるかを示しています。

副腎は、このダイナミクスにおいて重要な役割を果たします。副腎はストレスに反応し、ブロックされると健康上の問題を引き起こす可能性があります。症状を治療するには、副腎を解放することが重要です。同様に、**甲状腺**は、特に子供が自己主張を始める7歳頃の音声表現とコミュニケーションに関連しています。

12歳になると、**下垂体**現象が現れ、思春期の始まりと**性腺**の成熟を示します。このホルモンプロセスは、**同期**の空間にも関連しています。

幼少期の経験を追体験し、時間に取り残される人もいます。これらの記憶は、視覚的または聴覚的な刺激によって再活性化される可能性があります。これらの記憶を治療するために、**眼球運動脱感作療法（MDR）**などの技術が使用されます。この方法はトラウマを削除するのではなく、記憶の解離と再編成を可能にします。

眼球運動は、**合理的**と**非合理的**、そして**直感的**と**合理的**の間のバランスを回復するのに役立ちます。これらの領域の不均衡は、下垂体の問題を引き起こす可能性があります。下垂体は、特に眼球運動中に、脳の異なる領域間の情報伝達において重要な役割を果たします。

したがって、夢と眼球運動は、経験の**合理化**と再編成に不可欠です。**心拍変動バイオフィードバック**などの実践も、このバランスに貢献できます。

17. 眼と皮質化の動き

所要時間 : 08:22

学習シート

コース概要

このビデオでは、眼と脳の発達における皮質化運動との間の動的なつながりを探ります。頭部と頸部の屈曲プロセス、および顔面および内臓構造に関連する脳組織の再編成が検討されます。眼は、脳鎌と小脳テントの形成に影響を与え、ホルモン系との関連を通じて心理的および感情的な側面を統合する、この運動の中心的な役割を果たすものとして提示されます。平衡横隔膜と終末支点の概念が導入され、眼の再平衡化と身体の調和を促進するための十字縫合の安定化の重要性が強調されています。このレッスンは、胚発生とその治療的意味をよりよく理解したい開業医に、実践的および理論的な鍵を提供します。

眼と皮質化の動き

脳は、当初は平坦な組織として認識されていましたが、その発達の過程で著しい変化を遂げます。テーブルに横たわった個人が、手に脳を持っていると想像してみてください。最初に覚えておくべき情報は、**拡張と神経管の形成**です。

このプロセスは、**頭部屈曲運動**から始まり、続いて**頸部屈曲**、そして**橋部**の発達と**終脳化**のプロセスへと進みます。脳が直立するにつれて、小さな構造もこの発達運動に追随し、方向の変化を示します。


眼は、その発達の螺旋の中で、**皮質化**の情報を含んでいます。この直立の際に、組織全体が回転運動で再編成され、**正中線**に近づきます。下部では組織が心臓と消化器系に向かって引っ張られ、上部では直立します。この動きは、**脳の上昇**と**心臓・内臓の下降**によって生み出されます。

眼は、この**皮質化**現象において重要な役割を果たし、**大脳鎌**と**小脳テント**の発達に貢献します。これらはクリノイド突起に挿入されます。その近くには、考慮すべき不可欠な要素である**視交叉**があります。

もう一つの重要な側面は、**平衡の横隔膜**と**トノンの被膜**であり、これらは眼を顔面全体システムと体中のすべての筋膜に接続します。これは、眼が統合された**単位**であり、顔面全体の情報を含んでいることを意味します。また、ホルモン物質によって伝達される感情的および精神的な情報も受け取ります。したがって、精神状態はホルモン状態および感情状態と本質的に関連しています。

したがって、眼を治療することは、**腹膜**、**末梢**、および**皮質**の発達の両方に取り組むことです。眼は、その表現と発達において身体全体と関係しています。各臓器には独自の視点があり、各臓器は象徴です。

26日目頃に、内部接続に関連する**視溝**が現れます。この溝は、表面の壁に触れる小胞によって刺激されます。頭部と頸部の屈曲は、脳と心臓の間の出会いをもたらし、眼が心臓の上に置かれます。これにより、**橋部彎曲**として知られる**後部ひだ**が形成され、そこには仙骨と小脳テントがあります。



図一 視溝と小胞

小脳テントは、腹膜と脳との同期を確立するため、非常に重要です。**中脳下屈曲**は、**脊索**の先端と関係しており、支点として機能します。**後頭骨上部**も頸部屈曲に関連しており、橋部屈曲は後頭骨底に関連しています。



図一 脳と心の出会い

神経管の上昇は、消化器系と心臓の発達、および他の発達空間に影響を与えます。形態形成中の**共局在と同期**は、支点を理解するのに役立ちます。**外胚葉**の上昇と**内胚葉**の下降は、脳の統合に不可欠です。

眼はこの発達段階に追随し、正中線に近づいて**鶏冠**を形成し、膜を結合させて大脳鎌を形成します。小脳テントも橋化現象の間に発達します。



図一 支持点

眼の配置における支点、または**終末支点**が不可欠であることに注意することが重要です。眼のバランスを再調整するには、口の中に指を置き、小さな**十字縫合**のレベルに置くことをお勧めします。これにより、この縫合が安定する時点で、両眼がそれぞれの空間を見つけることができます。

前頭縁、**頬骨縁**、および**上顎縁**は重要な支点です。構造の上昇と下降は、正中線の閉鎖に貢献し、これは口蓋の閉鎖にも関連しています。口蓋がその支点を見つけると、眼もその場所を見つけ、発達における**到達支点**を示します。

18. 注：むち打ち

所要時間：01:12

学習シート

コース概要

このビデオでは、眼の緊張が頭蓋と感情の発達に与える影響を探ります。眼に関連する緊張のバランスを取り戻す方法としての「アセンサス」の概念に焦点を当て、眼球の状態、感情、精神的健康との関連性を明らかにします。これらの緊張が神経系の不均衡をどのように反映し、ねじれや解離などの身体的症状とどのように関連しているかを学びます。これらの側面を研究することで、このビデオは脳と頭蓋の発達への理解を深める道を開き、オステオパシーおよび生体力学的胚学のセラピストや学生にとって貴重なアプローチを提供します。

眼の緊張と頭蓋の発達への影響

脳は、眼に現れるさまざまな種類の**緊張**によって影響を受ける可能性があります。これらの緊張は、**アセンサス**のプロセスによって再調整することができます。これは複雑に思えるかもしれませんが、私たちの記憶と感情が体、特に**ゾーンB**を通して表現されることを理解することが重要です。

アセンサスと**ディセンサス**について話すとき、一部の個人は非常に陥没した**眼球**を示し、これは抑うつ状態や脳の左右半球間の接続不良に関連している可能性があることに注意することが不可欠です。これらの症状は、重大な**ねじれ**や**解離**にも関連している可能性があります。

眼は、私たちの感情的および身体的状態を表現する上で並外れた役割を果たします。それらは私たちの**神経系**の位置と状態を反映しています。さらに、**頭蓋**の発達と眼の発達の間には重要な関係があります。

したがって、眼を研究することで、脳の発達、ひいては頭蓋の発達をよりよく理解することができます。

19. 力線と電気

所要時間：03:44

学習シート

コース概要

このビデオでは、骨の構造と動きに対する力線と電荷の影響について探求します。講師は、適合器としての目が骨の形成にどのように重要な役割を果たすかを説明し、電磁荷に対する反運動と頭部形成を強調します。犬歯鼻前頭梁複合体や上顎前頭線を含む梁複合体は、関連する解剖学的詳細とともに提示されます。さらに、体の左右の周波数とバランスの変化を感じることの重要性が強調され、微小損傷を治療し、身体のダイナミクスを改善するための効果的な調整への道が開かれます。施術者は、治療介入を最適化するために、眼軸が体の全体的なバランスに与える影響を評価する方法も学びます。

力線と電気

力線は、凸側が正に帯電した**電子**によって形成され、骨に電荷を生成します。これは、骨構造において極めて重要な役割を果たす、深部の**梁**と呼ばれる力線へと波及します。




図一 骨への電荷



図一 骨に電荷を発生させる

眼は**コンフォーマー**として機能し、その周囲に形成される骨の形成に影響を与えます。この下降運動において、骨は**対向運動**を行います。後者は**頭部化**に関連しており、骨は**逆回転**の動きを示します。特に興味深い梁は、対側性に発達する**犬歯鼻前頭梁**です。



 — Lignes de force (poutres)

頭蓋底レベルにも力線が存在し、この領域の主要な軸を表しています。顔面では、犬歯から**前頭隆起**および**冠状縫合**まで力線が伸びています。冠状縫合レベルで小さな**微小病変**が形成され、顕著な変化を引き起こすことがあります。例えば、歯の傾斜が変化したり、調整によって著しい**電氣的变化**が生じたりすることがあります。



図一 犬歯-鼻 前頭梁

これらの力線の**周波数**に取り組むことが不可欠であり、左右の変動を感じ取り、バランスを回復しようと試みます。**シンクロシティ**の理解もまた極めて重要です。なぜなら、あるレベルで作用したことが、別のレベルに影響を及ぼす可能性があるからです。

もう一つの興味深い力線は、イングスレベルを通る**上顎前頭線**です。さらに、同じ側を前頭レベルで、反対側を冠状縫合レベルで結ぶ**頬骨線**も注目に値します。

最後に、眼と眼窩のレベルでは、眼の軸を追加してそのバランスを評価することが重要です。変化が生じる可能性があり、これらの構造に特別な注意を払う必要があります。

20. 眼と頭蓋骨の発達

所要時間：04:35

学習シート

コース概要

このビデオでは、眼の発達と頭蓋骨の形成との間の複雑な関連性を詳細に探求します。原始的な頭部屈曲などの胚発生プロセスと、骨構造への影響、特に眼の安定性における蝶形骨の中心的な役割に焦点が当てられています。頭蓋の成長と眼窩の痙攣の概念が議論され、眼、鼻、口蓋の形成の間の調和を維持することの重要性が強調されています。さらに、このビデオは、頭蓋構造に影響を与える発達の螺旋と、それが視覚機能に与える影響を示しており、オステオパシーと生体力学的胚発生学の理解を深めたい学生やセラピストに実践的なツールを提供します。

眼と頭蓋の発達

眼の発達は頭蓋の形成と密接に関連しています。原始頭部屈曲の際、中脳下間葉が脳胞の前部と後部の間で圧迫されます。このプロセスにより、水分が失われ、間葉が軟骨組織に変化し、頭蓋の基部が形成されます。

最上部には篩骨があり、次に蝶形骨体、そして後頭骨の基底部が続きます。蝶形骨の翼は眼の支点として重要な役割を果たします。眼は蝶形骨によって支えられ、その安定性が確保されます。頭蓋が成長するにつれて、眼の骨組織は脳の成長に応じて発達し、眼の周りに刻み込まれ、特定の力線で閉じられます。

眼と頭蓋が相互に連結していることを理解することが不可欠です。わずかな衝撃でも眼窩が不安定になり、視覚の反射に影響を与える可能性があります。したがって、脳と頭蓋の両方を介して眼の安定性を回復することが重要です。

鼻が発達するにつれて、眼が側面に現れます。同時に、口蓋が形成されます。口蓋の閉鎖は、眼が垂直軸と水平軸に沿って整列することと一致し、骨の発達における重要な終点を示します。

頭部の成長は最も重要です。この時期に眼は正中線に近づきます。鼻骨のレベルで支点が形成されます。皮質の発達が進むにつれて、眼は最終的な位置に配向されます。

眼の螺旋と骨の逆螺旋の2つの螺旋が観察され、これらは頭蓋の縫合の形に見られます。これらの縫合の向きは、複雑な形状を持つ前上顎骨の三次元性を研究する上で不可欠であり、眼窩および眼の構造に貢献しています。



図一 説明図

21. リリクイスト膜

所要時間 : 07:37


学習シート

コース概要

このビデオでは、第三脳室の横隔膜として機能する重要な構造であるリリクイスト靱帯の解剖学とメカニズムを探求します。この靱帯が動眼神経や脳底動脈とどのように相互作用し、脳室系や下垂体に影響を与えるかを学びます。膜の緊張、頭蓋の運動軸、それらが顔面およびホルモン系に与える影響といった概念が議論され、頭蓋-胸骨-仙骨および下顎の運動の重要性が強調されます。緊張の分析は咬合レベルの機能不全の診断にも役立ち、身体の調和を取り戻すための治療の鍵を提供します。

リリクイスト靱帯：解剖学とメカニズム


リリクイスト靱帯は、小さな横隔膜として機能する解剖学的構造であり、一般にイリクイスト膜と呼ばれています。この靱帯は第三脳室のレベルに挿入され、蝶形骨まで下降します。この場所で、動眼神経および動脈の通過、特に脳底動脈（脳動脈の形成を担う）との関連で重要な役割を果たします。



図一 リリークイスト靱帯

靱帯が下降すると、**緊張軸**が形成され、**脳室系**に影響を与えます。第三脳室、第四脳室、および**側脳室**はすべて、このダイナミクスによって相互接続されています。緊張パターンが確立され、**下垂体**が存在する空間に大きな影響を与えます。

下垂体の上には**視交叉**があり、約30度の角度で配向しており、5度の姿勢運動を伴います。この運動は、第三脳室、蝶形骨、および周囲の**微小血管**間の**排出**に不可欠です。微小毛細血管に存在する**周皮細胞**は神経と相互作用し、深い支点として機能する**血液脳関門空間**を形成します。




図一 脳室系

前蝶形骨（後頭骨に対応）を調べると、イリクイスト膜上にバランスの空間が観察されます。この膜性緊張は神経と血管の両方に影響を与え、下垂体の近くに位置し、神経系が**視床下部-下垂体-甲状腺-副腎-性腺軸**を介してホルモン系と通信します。

頭蓋骨の動きも考慮することが重要です。頭蓋骨を観察すると、**頭頂骨**や他の構造のレベルで異なる動きに気づくことができます。これらの動きは特定の力の線に従います。たとえば、前頭部の**屈曲運動**は、**前頭縫合**と関連しており、眼の動きに影響を与える2つのバランスポイントを表します。

脳が**脳室系**と**顔面系**を、**軟骨頭蓋**（軟骨）と**膜性頭蓋**（膜）の両方の観点から条件付けていることを理解することが重要です。発生中、**後頭骨**が下降すると、**仙骨**も下降し、**側頭骨**がこのダイナミクスにおいて重要な役割を果たします。

胸骨はこれらの動きに応答して上昇し、前正中線に向かって収束します。これらすべては眼に刻み込まれており、眼の顔面系と被膜系に関する要素を追加することが不可欠です。これらは周囲に挿入され、眼窩の発生レベルでの逆回転によって全体を組織します。



図一 頭蓋運動

頭蓋-胸骨-仙骨および下顎の動きは相互接続されています。犬歯軸も重要です。なぜなら、それらは**咬合**に影響を与えるからです。上顎と下顎の犬歯の接触が正しくないと、これらの電場が結合する必要があるため、脳レベルでの情報損失が生じます。

したがって、**咬合**は**蝶形骨基底結合**に存在する緊張の反映です。歯を観察することで、垂直、側方、またはその他の**歪み**（緊張）の存在を判断することができます。これにより、制約を理解し、バランスを回復するために必要な治療を調整することができます。



図一 頭蓋骨、胸骨、仙骨の協調した動き

22. 実践：力の線

所要時間：08:41

学習シート

コース概要

このビデオでは、冠状硬膜鞘、シンフィシス、上顎骨を通る力の線の研究に深く入り込み、腱と腱炎を効果的に治療するための電气的アプローチを採用しています。神経頭蓋と内臓頭蓋の間のつながりが探求され、冠状縫合の重要性と身体の活力におけるその役割が強調されています。参加者は、エネルギーの損失を触診して検出し、心臓および内皮系に働きかけ、誘導技術を使用してバランスを回復する方法を学びます。このセッションでは、エネルギー循環を改善し、患者の健康を促進するために、さまざまな構造を調和させる方法を教えます。

実践：力の線

このセッションでは、**冠状硬膜鞘**、**縫合**、**上顎骨**に関連する**力の線**を探求します。これらの場がどのように相互作用するかを理解するためには、**電气的レベル**に立つことが不可欠です。このアプローチは、**腱**や**腱炎**の治療にも適用できます。

神経頭蓋と内臓頭蓋の接続

神経頭蓋と**内臓頭蓋**を含む頭蓋底の配置は非常に重要です。内臓系全体が頭蓋底に支えられ、脳はその上にあると想像できます。緊張の**硬膜膜**がこの基部に付着し、複雑なネットワークを形成しています。

まず、**冠状縫合**と**上顎骨**の部分から始めます。**上顎頬骨**レベルに立つことで、力の線がどのように交差するかを観察できます。これらの接続は、整列した**リング**のように調和している必要があります。

活力とエネルギーの重要性

冠状縫合は比較的低い位置にあり、この領域、特に**ブレグマ**の位置で作業することが不可欠であることに注意することが重要です。活力は熱交換に関連しており、感じられる熱は良好なエネルギー循環を示します。

この領域を触診することで、**エネルギー損失**のポイントを検出できます。これらの領域に接続することで、活力の違いを観察でき、これは**副腎**レベルでの疲労や闘争を示す可能性があります。したがって、患者の全体的な状態を改善するために、これらの領域を**再充電**することが重要です。

エネルギーアプローチと関連システム

診察中、**心臓**および**内皮系**に取り組むことが可能です。考慮すべき4つの入り口があります：**内頸動脈**と**椎骨動脈**、および**脳底系**です。これらの領域を適切に触れることで、緊張を解放し、心臓への循環を改善できます。

私たちは、**重力**や**引力**などの異なるエネルギーを使用して、適切な接触を再確立します。一部の患者は重すぎたり軽すぎたりすることがあり、それが彼らのエネルギーバランスに影響を与えます。

触診と誘導のテクニック

冠状縫合を触診することで、熱と振動の変化を感じることができ、これは良好なバランスを示します。**前頭隆起**と**頬骨-前頭隆起線**に取り組むことで、不均衡の領域を特定できます。

これらの操作中に患者の呼吸を観察することが不可欠です。**誘導**または**促進された動き**のテクニックを使用することで、身体の自然な動きをサポートできます。**呼気活動**の観察は、**酸化還元**プロセスを示す極性の変化も明らかにすることができます。

結論

これらのテクニックは、エネルギーバランスを再確立し、治癒を促進するのに役立ちます。力の線に取り組み、異なる構造間の接続を確立することで、患者の活力と幸福を改善できます。

23. 解剖学

所要時間：21:58

学習シート

コース概要

このビデオでは、眼と神経頭蓋の解剖学を深く掘り下げ、神経頭蓋、内臓頭蓋などの異なる構造間の関係と、それらの統合された機能について説明します。強膜、ぶどう膜、網膜を含む眼の被膜の主要な特徴、および眼球運動筋とその神経支配の重要性について学びます。また、眼の健康維持に不可欠な眼の複雑な血管新生についても議論します。この知識は、特に視覚の解剖学的基礎とそれが全身の健康に与える影響をよりよく理解しようとする医療専門家、特にオステオパスにとって不可欠です。

眼と神経頭蓋の解剖学

眼と神経頭蓋の解剖学は、構造とその機能の深い理解を伴う魅力的な主題です。

神経頭蓋と内臓頭蓋


神経頭蓋は代謝的な牽引の場であり、一方、**内臓頭蓋**は胚発生に由来するものです。**頬骨**の三次元的な形状は特に興味深く、その小さな面と溝、特に上にある**大きな溝**は**蝶形骨裂**と呼ばれ、**動眼神経**（第III脳神経）と三叉神経の枝が通っています。**視神経管**は、視神経と眼動脈を収容するため、非常に重要です。



図一 蝶形骨裂

口蓋骨は、小さな突起であるにもかかわらず、口蓋形成時の胚の屈曲運動のバランスにおいて重要な役割を果たします。それは**頬骨**および**上顎骨**と関連しており、これらも三次元的な骨です。涙窩、涙骨、**篩骨**、**鼻骨**、**前頭骨**、**蝶形骨**は、骨の情報が集中している部分を形成しています。

眼の被膜



図一 神経頭蓋と内臓頭蓋、特に言及されている口蓋と頬骨の重要性

眼は3つの大きな被膜で構成されています。

1. **強膜**：強膜は外層であり、前方では透明な強膜である**角膜**に続いています。眼の白い部分は透明ではない強膜です。
2. **UV（ぶどう膜）**：血管が豊富な**脈絡膜**、前方の**虹彩**、そしてその間にある**毛様体**など、いくつかの部分で構成されています。毛様体には、水晶体を保持する**靭帯**と**筋肉**、すなわち**チン小帯**が含まれています。





図 — 眼の被膜の概要

3. **網膜**：網膜には**クローケ管**または**硝子体管**、および**鋸状縁**が含まれています。網膜は、**錐体**（昼間の視覚）と**桿体**（夜間の視覚）を含む光受容体が豊富です。




図一 この画像は、角膜の構造とその周波数を図示している可能性がある。



図一 眼の断面

角膜と強膜の解剖学



図一 この画像は、脈絡膜に関連する血管分布と、眼における情報の統合を図示している可能性がある。

角膜縁は角膜と強膜の接合部であり、**角膜強膜縁**とも呼ばれます。**シュレム管**は前房液の再吸収に不可欠です。眼の**前房**と**後房**は瞳孔によって隔てられています。

栄養液である**房水**は、毛様体突起によって分泌され、線維柱帯によって濾過され、強膜の静脈洞とシュレム管によって再吸収されます。それはバランスを維持し、角膜と虹彩に栄養を与えます。

眼筋




図 — 瞳孔とその光調節機能

上直筋、**下直筋**、**斜筋**などの眼球運動筋は、眼の動きに不可欠です。**眼瞼挙筋**も重要であり、眼瞼下垂は健康上の問題を示す可能性があります。




図一 この画像は、シュレム管と房水の調節のより詳細なビューを示している可能性がある。

ツイン腱は眼球運動筋の付着点であり、これらの筋肉は首の筋肉と関連しています。視神経と眼動脈は、眼の血管供給と神経支配において重要な役割を果たします。

血管供給と神経支配



図一 結膜の結合部



図一 涙腺とその排泄系

図二 分泌腺と、眼瞼板とミュラー筋との連続性

図三 分泌腺と、眼瞼板とミュラー筋との連続性



🗒 — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)



図一 眼瞼の解剖

眼の血管供給は頸動脈から来ており、眼動脈と網膜の血管供給のための枝があります。**周皮細胞**またはルーゲ細胞は、特に網膜の毛細血管レベルで情報を調節します。



図一 テノン嚢と体幹筋膜との関係



図一 外眼筋



图 — 外眼筋




图 — 外眼筋



图 — 外眼筋




图 — 外眼筋



図一 眼の筋肉組織とジン靱帯の付着点

眼の神経支配には、感覚路、運動路、および自律神経路が含まれ、視神経が視覚情報を捉えます。これらのシステムが網膜レベルで出会うことで視神経が形成され、感覚情報が伝達されます。



図一 頸動脈と視神経の関係



図 — この画像は、静脈洞または血管分布の一側面を図示している可能性がある。

結論

眼と神経頭蓋の解剖学は複雑で相互に関連しており、視覚と神経機能において不可欠な役割を果たす多様な構造を含んでいます。これらの要素の理解は、医療やオステオパシーの専門家にとって不可欠です。






図 — 頸動脈から始まる眼の血管分布



図一 周皮細胞と情報変調における役割



図一 視神経管における神経支配と情報の統合



図 — この画像は、視神経を介した神経支配と情報伝達の図を補足する可能性がある。

24. 意図の世界

所要時間 : 08:26

学習シート

コース概要

このビデオでは、講師は固着に起因する苦しみの概念と、存在の自由の重要性について論じています。五蘊、すなわち色、受、想、行、識が深く掘り下げられ、それぞれの蘊が私たちの存在と主観的経験の次元を表しています。これらの要素を意識することで、学生は執着が苦しみにつながることを避け、手放すこと、そして感覚や感情をより良く管理することを学びます。無常、相互依存、個人的責任といった重要な概念も探求され、より調和のとれた存在を創造するために自分の意図を熟考することの重要性が強調されています。

意図の世界

苦しみは、物事を固定しようとする私たちの傾向と結びついており、生命の自然な**動き**を妨げます。**自由**が表現される必要性を認識することが不可欠です。

五蘊

1. 色

最初の蘊は**色**であり、**現象学**を包含します。それは私たちの存在の物理的な現れです。

2. 受

二番目の蘊は**受**に関係します。体がそこにあると、感じるように招かれます。ブッダは、体は**無常**であり、**相互依存的**であると教えました。私たちは自分の存在を、地球と同じくらい広大な壮大なゲームとして想像することができ、それはある種の**責任**を伴います。

感覚は快いことも不快なこともあります。時には、快い感覚が時間とともに不快になることもあれば、その逆もあります。ブッダはこれを**シャボン玉**のイメージで説明しています。シャボン玉は現れては消えます。私たちはこれらの感覚に執着する傾向があり、それによってもはや存在しないものへの**執着**を生み出します。

人々が過去の不快な出来事を再活性化することはよくあります。まるで**ドーム**を開けて嫌な匂いを再び嗅ぐかのように。この執着や拒絶のプロセスは、固定の一形態です。**手放すこと**は放棄と混同されるべきではありません。それは感覚が続かないことを受け入れることです。

3. 想

三番目の蘊は**想**です。これらは**蜃気楼**に例えることができ、私たちは自分自身の満足のパターンを他者に投影します。例えば、瞑想中に一部の参加者が遅れて到着すると、不満の反応を引き起こすことがあります。これらの知覚に気づくことで、私たちはそれらを**ノイズ**と見なすことを選択できます。

4. 行

四番目の蘊は**行**、または**精神的要因**に関係します。私たちの**意図**に気づくことが重要です。なぜなら、それらが私たちのカルマの世界を形作るからです。行動したり話したりする前に、私たちの意図について考えることが不可欠です。ブッダは、自分の意図を2つの束に分けて説明しました。有益なものと、そうでないものです。

5. 識

最後の蘊は**識**です。この意識は**魔術師**として認識されることがあり、大いなる幻想を表しています。それはしばしばエゴの究極の避難所となります。

結論

蘊、すなわち泡、シャボン玉、知覚、バナナの木、そして意識は、相互に連結し、常に重なり合っています。これらの各蘊について、1週間または1ヶ月の瞑想合宿を捧げるなどして、時間をかけて考察することは有益です。これにより、私たち自身と私たちの経験に対する理解を深めることができます。

25. 改訂

所要時間 : 01:05

学習シート

コース概要

このビデオでは、網膜の解剖学について深く掘り下げ、ぶどう膜、脈絡膜、虹彩、毛様体を含むその被膜について説明します。外網膜と内網膜で構成される網膜が、原始的な眼杯と、それが上皮芽と傍分泌的に相互作用することからどのように発生するかを学びます。議論される重要な点の1つは、理論的にも臨床的文脈においても理解することが不可欠な現象である網膜剥離です。さらに、網膜が脳由来の組織であるということが強調されており、この概念は発生学的理解を深め、眼疾患に関する展望を開きます。

網膜の解剖学的復習

眼の被膜は、脈絡膜、虹彩、毛様体からなる**ぶどう膜**を含みます。この被膜を取り除くと、**網膜**にアクセスできます。網膜は、主に2つの大きな層、すなわち**外網膜**と**内網膜**で構成されています。

剥離は網膜で発生する重要な現象であり、知っておくべきです。この段階で、**原始視蓋**が形成され、表面の**上皮芽**と**傍分泌**的な接続を確立します。この相互作用により、上皮芽が肥厚し、**外側視覚プラコード**が形成されます。これは、周囲の構造が発達する間、所定の位置に保持されます。

このダイナミクスにより、**原始的な陥凹**が生じます。網膜は、発達するにつれて、**外網膜**と**内網膜**と呼ばれるものを包み込み、形成します。網膜剥離はここで発生し、多くの人が経験したことのある問題です。

網膜は、実際には**脳**、より正確には**脳室組織**に由来する組織であることに注意することが不可欠です。

26. 眼の神経生理学：導入

所要時間：04:43

学習シート

コース概要

この眼の神経生理学入門では、苦痛、知覚、眼の解剖学的特異性の間の相互関連を探ります。眼球運動と虹彩の幾何学的形状が感情状態をどのように示すか、また視覚、透視、多視の違いについて学びます。次に、ビデオでは結膜から網膜までの眼のさまざまな構造を詳しく説明し、光が電気信号に変換される仕組みを説明します。眼の向きの重要性や光子の変換などの概念を統合することで、このプレゼンテーションはオステオパシーと生体力学に対する理論的および実践的なアプローチを豊かにします。

眼の神経生理学：序論

人が**身体的、感情的**、またはその他の性質の**苦痛**を経験するとき、それはその人の目に反映されることがあります。目は特定の動きをすることができ、虹彩にはさまざまな形で現れる**幾何学模様**が存在します。

目はまた、**クリスタガリア**に関連する開始点でもあります。当初、この構造は平坦ですが、**終脳形成**のプロセスによって進化する。この集中点はしばしば**透視の目**と呼ばれます。

知覚にはいくつかのレベルがあります：

- **透視**：他者の感情を利用すること。
- **千里眼**：他者のアカシック世界を認識する能力であり、その機能の理解を可能にする。
- **多視**：あらゆるものに存在する神性を視ること。

目は光子という形で**光情報**を受け取ります。最初に通過する層は**結膜**であり、次に強膜の透明な部分である**角膜**が続きます。その後、光は**瞳孔**を通過します。




図 — 眼の層

房水を含む前房に続き、同様にこの液体を含む後房があります。前方の**毛様体**が液体を生成し、後方の**シュレム管**がこの液体を再吸収します。このプロセスにより、目を栄養する液体の継続的な循環が可能になります。

光は次に**水晶体**と**硝子体**を通過し、複数の層からなる**網膜**に到達します。目は、たとえ単一の光子であっても少量の光を捉えることができ、中心視と周辺視の両方を持っています。

これら2種類の視覚を使いこなすことが不可欠です。周波数、波、光スペクトルは変化し、目の向きはしばしば**23度**であり、これは心臓、地球、内耳の向きと共鳴する値です。

この特定の向きは**網膜**に影響を与え、そこで**変換**現象が起こります。光子は電気信号に変換され、神経流として左右に送られます。各眼はこれらの情報を**外側膝状体（CGL）**に伝え、そこで**カグノ細胞**と**マグノ細胞**を介して解釈されます。

統合されたこれらの情報は、**視放線**を通過して、目の上と下、**鳥距溝**の近くにある**視覚皮質**に到達します。この目の経路と視覚信号の解釈は、視覚の神経生理学を理解するために不可欠です。

27. 伝達のメカニズム

所要時間 : 08:39

学習シート


コース概要

このビデオでは、視覚変換のメカニズムを深く掘り下げ、光が網膜のさまざまな層を通過する経路を、光受容体から視神経まで詳細に説明します。網膜の様々な細胞、特に錐体、桿体、双極細胞、神経節細胞が、視覚情報の処理における役割を理解するために検討されます。光吸収時のロドプシンとヨドプシンの化学的変化、およびビタミンAの重要性についても触れ、欠乏が視覚に与える影響を明らかにします。

伝達のメカニズム


光線はまず網膜のすべての層を通過し、**光受容体**に到達します。これらの光受容体は、最初の層である**色素層**と呼ばれる領域に位置しているため活動的です。光受容体は**錐体**と**桿体**の2種類に分けられます。

この最初の層を通過した後、光は**双極細胞**に到達し、次に**神経節細胞**に到達します。後者は軸索を束ねて**視神経**を形成し、そこで伝達が行われます。



図一 光が視神経に到達する経路

さらに詳しく見ると、**水平細胞**も存在し、情報を捕捉して双極細胞に再分配しています。その下には**アマクリン細胞**があり、情報を集めてから神経節細胞に送ります。この複雑なシステムにより、大量の視覚情報を処理することができます。



図一 水平細胞とアマクリン細胞の役割

錐体光受容体を例にとってみましょう。これは**外節**、**内節**、**核**、および**シナプス終末**で構成されています。外節には**細胞膜**と、**オプシン**と呼ばれるタンパク質を含む小さな円盤が積み重なっています。桿体の場合、このオプシンは**ロドプシン**と呼ばれ、錐体の場合、それは**ヨドプシン**と呼ばれます。

桿体では、**レチナール**と呼ばれる小さな分子がロドプシンに結合しています。光がこれらの円盤に当たると、レチナールが形を変え、ロドプシンが**メタロドプシン**に変化します。この変化は細胞膜で一連の化学カスケードを引き起こし、ナトリウムの流入を妨げ、イオン変化を生じさせます。

この膜の透過性の変化は**膜電位**を引き起こし、**神経インパルス**を生成します。このように、光は層を通過することで、ビタミンAに含まれるベータカロテンという色素を活性化させます。これはロドプシンとヨドプシンを活性化するために不可欠です。

桿体は主に網膜周辺部に位置し、詳細な視力は低いものの光に非常に敏感で、色の知覚はありません。一方、錐体は詳細で色のある中心視を提供し、青、赤、緑に対応する特定のタイプがあり、異なる波長に対応します。

桿体は、外節、内節、シナプス終末の3つの部分で構成されています。外節には小さなオプシン円盤が含まれており、桿体の場合、それはロドプシンです。

光がこれらの円盤に当たると、ロドプシンはメタロドプシンに変化し、化学カスケードを引き起こして膜の極性を変化させ、ナトリウムに対して不透過性にします。この変化は電流を生成し、視覚情報の伝達に不可欠です。

光エネルギーの**伝達**は、光受容体で起こります。これは、オプシンが光を吸収し、受け取った光に応じて形を変えることによって行われます。このプロセスは視覚にとって極めて重要であり、ビタミンAはレチナールの合成に基本的な役割を果たします。ビタミンAの欠乏は、特に夜間の視力喪失を引き起こす可能性があります。

28. 横向きに膝を立てた体勢

所要時間：17:52

学習シート

コース概要

視覚情報の処理における外側膝状体（LGN）の役割を、その小細胞層と大細胞層（色と動きの処理）を紹介して研究する。視神経を介した皮質領域へのシナプス伝達と、プルビナーとの相互作用を分析する。このプレゼンテーションは、多感覚統合とパペッツ回路との関連性を説明し、視覚認識が記憶パターンによってどのように変調されるかを示す。

外側膝状体：視覚情報の統合と処理

外側膝状体は、視覚情報の処理において重要な役割を果たします。網膜からの神経インパルスを受け取り、これらの情報を視覚野に送信する前に選別します。



図 — Corps Genouillé Latéral (CGL)

構造と機能

外側膝状体は複数の層で構成されており、それぞれが特定の情報の処理に特化しています。主に3種類の細胞が区別されます。

- 小細胞性細胞：色と形に関する情報を処理します。
- 大細胞性細胞：動きと方向の検出を担当します。
- コニオ細胞：空間周波数に焦点を当てます。

外側膝状体の各層は、これらの異なる情報を統合することで画像の形成に貢献します。

情報伝達



図一 小細胞性および大細胞性細胞

視覚情報は視神経を介して伝達され、外側膝状体に到達します。そこで選別された後、視床と視覚野に送られます。外側膝状体で処理される情報の約**80%**は直接視覚野に送られ、残りの**20%**は別の視床構造であるプルビナーを介して、より微妙な処理のために送られます。

プルビナーはまた、聴覚情報と視覚情報を統合するために不可欠な**上丘**や**オリブ核**などの他の核からも情報を受け取ります。



図 — LGNから視床枕への情報の分布

多感覚統合



図一 視床枕の接続




図 — LGNへの視覚情報の経路

外側膝状体は視覚情報だけでなく、聴覚系や前庭系とも関連しています。これにより、目、耳、空間における身体の位置からの情報を統合することができます。このプロセスは、眼の**サッカード**や頭の向きなどの動作に不可欠です。

ペイペッツ回路と記憶



図 — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

外側膝状体は、記憶に役割を果たす**ペイペッツ回路**とも関連しています。この回路には、**乳頭体**、**前視床**、**帯状皮質**などの構造が含まれます。記憶の保存と検索に関与し、視覚情報を過去の経験と結びつけます。




図 — サッカーと頭部の向きにおける役割

現実の解釈

情報を知覚する際、私たちは現実のごく一部しか受け取っていないことに注意することが重要です。実際、知覚される情報のわずか**20%**が現実であり、残りは私たちの経験、感情、過去の経験に基づいた再解釈です。この解釈プロセスは、視覚野と外側膝状体間の接続によって影響を受けます。



図一 パペッツ回路と記憶

結論



図一 パペッツ回路：記憶の固定

外側膝状体は、視覚情報処理における重要な構造であり、さまざまな感覚源からのデータを統合し、現実の認識において重要な役割を果たします。情報を選別し解釈する能力は、周囲の世界との相互作用に不可欠です。



図一 認識された情報の再解釈



図一 現実の解釈



図一 知覚におけるLGNの重要性

29. 記憶の解離

所要時間：03:20

学習シート

コース概要

このビデオでは、個人的な印象的な経験の証言を通して、感情的な記憶の解離を探索しています。講演者は、家族に関連するストレスの多い出来事が、彼の認識と身体的健康にどのように影響したかを共有しています。精神科医の介入により、彼は感情と出来事を切り離すことを学び、彼の恐怖と身体の痛みに対する新しい視点を提供しました。この教えは、感情的な関連付けを解放し、自己理解を促進し、セラピストとして行動するために経験を再調整することの重要性に焦点を当てています。この再評価のプロセスは、真の感情的解放を達成するために不可欠です。

記憶の解離

印象的な経験の中で、私は父が入院するという状況を経験しました。誰もが心配していましたが、末っ子だった私はほとんど無関心に感じていました。両親はちょうど別れたばかりで、母が飛行機に乗って来ると知らされたにもかかわらず、私は彼らの口論に対してある種の**満足感**を覚えていました。

翌日、妹は危篤状態にあり、兄と私は山を下っていました。病院に向かう途中、窓の外を見ることはできませんでしたが、飛行機が通り過ぎるのが見えました。その時、私は飛行機に乗らなければならず、1週間前にはそれが私に与える感情的な影響を認識していませんでした。私は腹痛、胸の**圧迫感**を感じ始め、飛行機に乗るのを避けるための言い訳を探していました。

著名な精神科医が同席しており、私に立ち止まって自分が経験していることについて考えるように求めました。彼女は私の恐怖、特に飛行機に対する恐怖について尋ねました。私はそれを以前見た事故のせいにしていました。彼女はそれらの出来事が私の責任ではないことを理解させてくれました。彼女は出来事を解離させました。妹の**虫垂炎**、両親間の問題、そして飛行機事故です。私はこれらの状況とは何の関係もないことに気づきました。

この気づきは解放的でした。私はこれらすべての感情を体のさまざまな部分に蓄積していました。お腹、睾丸、膝、足、肘、肩です。すべてが整理されると、私は安堵感を覚えました。

この経験は、私たちの**恐怖**が抑圧された願望とどのように関連しているかを示しています。例えば、親に自転車に乗っていいか尋ねることは、転ぶことへの恐怖を伴うかもしれません。すべての恐怖は欲求を隠しています。これは複雑な記憶のプロセスです。

これらの感情的な関連性から解放され、私たちの経験を再評価することが不可欠です。これは**解放**と自己理解への道です。

30. 目のペア

所要時間：04:11

学習シート

コース概要

このビデオは、魂だけでなく、生理学から精神性まで、私たちの存在のさまざまな側面への窓としての目の魅力的なテーマを探ります。アジアにおける脳下垂体の活性化のような文化的要素が、透視能力や知覚の概念とどのように結びついているかを探ります。目、内臓、さらには肘や膝のような関節の間のつながりが解読され、人体とその記憶に対する新しい視点を提供します。肉体とエネルギー体の調和の概念は、私たちの個人的な旅と、私たちの歴史が世界の認識にどのように影響するかを理解するために不可欠です。

目のペア：感覚と意識の探求

ポリヴォヤンスは、あらゆるものの中に**神**を見る能力と表現され、**下垂体**は**透視能力**の座です。アジアでは、物事の隠された側面にアクセスできる**第三の目**がよく言及されます。この腺は、体に不可欠なホルモンを分泌することで重要な役割を果たします。

インドや**ネパール**のような文化では、色の**周波数**と**振動**によってこの腺を活性化するために、額に色が塗られます。目はしばしば**魂の窓**と見なされますが、**精神体**の目も表しています。

ヘブライ語の**アイン**は、目だけでなく**光源**も意味します。これは、目が光の受容体であるだけでなく、光の**送信者**でもあることを強調しています。深い視線は、女性と男性の両方に**ホルモン刺激**を引き起こす可能性があります。

また、**顎の角度**は、無意識を探求するための目と見なされていることも興味深い点です。この領域には**光センサー**も存在します。**耳下腺**は、**睪丸**と同様にこの領域に関連しています。

薬指は、しばしば誓いの指、内なる視覚の指と呼ばれます。**心臓**は**愛の視覚**の座と見なされ、精神の窓として機能します。目は**卵巣**や**膝**と直接つながっており、複雑なネットワークを形成しています。

D3椎骨は、視覚を変化させる可能性があるため重要です。**卵巣**と**睪丸**は、**エネルギー体**の目と見なされています。排卵周期は女性の進化に関連しており、**更年期**は肉体的および精神的な成熟の始まりを示します。

肘は、エネルギー体の後ろを見るための目と見なされています。「肘を使う」という表現は、人生を前進させるという考えを呼び起こします。**膝**は肉体の目を表し、女性は他者との関係や自分自身との関係を評価します。

かかともまた目であり、肉体の後ろを見ることができます。それは地球の最初の目、平和の象徴と見なされています。それぞれの目は他の目とつながっており、肉体、エーテル体、アストラル体、精神体に**記憶**を宿しています。

これらの記憶は、私たちの解釈や経験に影響を与える情報を伝達します。したがって、私たちの**遺伝的、カルマ的**、現在の歴史、そして**純粋な記憶**によって影響を受ける、私たち自身のこれらのイメージをどう扱うかを考えることが不可欠です。

31. 実践：松果体と下垂体

所要時間：10:39

学習シート

コース概要

このビデオでは、ホルモン調節と記憶における松果体と下垂体の基本的な役割について深く掘り下げています。胚発生の旅からインスピレーションを得たエネルギー再調整テクニック、特に下垂体の運動性に関して紹介しています。学生は、神聖な光と現在の光の間の相互作用を特定し、呼吸や眼球運動などの臨床観察を使用して、これら2つの重要な腺の間のバランスを回復する方法を学びます。このコースでは、呼吸、消化、睡眠などの生命機能の調節における松果体の重要性も強調しています。

実践：松果体と下垂体

松果体と下垂体は、**ホルモン調節**と**記憶**において重要な役割を果たします。松果体は、しばしば松果腺と呼ばれ、**ニューロンとホルモン系の間のつながり**です。光の影響を受け、**セロトニン**を**メラトニン**に変換する微生物を含んでいます。光の強度が低下すると、メラトニンの生成が始まります。

下垂体と松果体のバランスを再調整するために、**胚発生の旅**を再訪するエネルギー再調整技術が使用されます。これには、**ナジオン**と**ブレグマ**のレベルにある入り口を介して下垂体の運動性を探ることが含まれます。


頭蓋底が形成されるとき、**ラトケ嚢**と呼ばれる空間が形成されます。この外胚葉の上皮のひだは下垂体を生じさせ、下垂体は下降および上昇の両方の情報を受け取ります。下垂体は前葉と後葉に分かれ、その発達は**前脳**の形成に関連しており、前脳は**終脳**と**間脳**に分かれます。

松果腺は、神聖な光と下垂体の影響を受けて、前方から後方へ移動します。この神聖な光と現在の光の相互作用は、下垂体の機能にとって不可欠です。




図一 頭蓋底の形成

下垂体は表面上皮から発達し、屈曲運動は中心への吸引を引き起こし、前葉下垂体を形成します。同時に、脳内の吸引運動は漏斗を生じさせ、これが下垂体の後部を構成します。



図一 下垂体の発生

実際には、下垂体と松果体の間のエネルギー軸に作用するために内部技術を使用することが可能です。これには、患者の呼吸と眼球運動を観察することが含まれます。これらの要素はエネルギー状態を示すからです。



図一 漏斗部の発生

視床下部と視床を含む**神経系**は、このダイナミクスにおいて重要な役割を果たします。胚発生の運動性を再開することで、前葉下垂体と後葉下垂体のバランスを再調整することが可能です。眼球運動は、ハラへの回帰を示し、安定性を促進する可能性があります。

松果体は、**呼吸、消化、睡眠**の調節に不可欠です。メラトニンを生成し、これは脳波に影響を与え、入眠、深い睡眠、夢を促進するホルモンです。下垂体はほとんどすべての腺を制御しますが、松果体はマスター腺と見なされ、体のホルモンとエネルギーのバランスにおいて中心的な役割を果たします。

31. BIS. 眼球への影響

所要時間：24:37

学習シート

コース概要

神経感覚プログラムにおける眼の役割と、テノン囊／視床下部-脳室系との関連性の検討。姿勢の化学、身体フィードバック、エネルギーメカニズムを統合し、視覚入力が緊張と精神状態にどのように影響するかを示す。身体記憶の媒体としての筋膜組織の分析と、電磁氣的バランスに対する心血管系の影響。

眼への影響

テノン囊は全身と連結しており、**神経感覚プログラム**において極めて重要な役割を担っています。これは、**姿勢の緊張**に関する情報を統合することを意味し、これは**姿勢の化学**と見なすことができます。**視床下部**では、**視床**や**視床枕**、および脳室周囲の他の核を介して、多くの情報が統合されます。

これらの情報は、**栄養性 (trophotrophes)** と **活動性 (ergotrophes)** の2種類に分類でき、それぞれ交感神経系と副交感神経系に対応します。したがって、視床下部が受け取る情報（眼からの情報を含む）は、**酸化還元**や**グアノシン**、**アデノシン**などの**ヌクレオチド**といった要素を統合し、細胞レベルで姿勢の化学に影響を与えます。視床下部はこのデータを使用して、身体の緊張を調整します。

例えば、螺旋運動は右向きまたは左向きに方向付けられ、**うつ病**や**過剰な圧力**など、さまざまなエネルギー状態と関連付けられることがあります。このように、姿勢の化学は、皮質系および視覚系への多様な求心性入力によって影響を受ける緊張に統合され、継続的な**フィードバック**（正または負）を生み出します。

眼は情報源として、これらのメッセージの統合において不可欠な役割を果たします。眼は特定の姿勢の結果に貢献し、特定の時点での可能な限り最良の適応を表します。悪い姿勢というものは存在せず、最も適切な機能的応答があるだけです。見ているものを信頼することが重要ですが、プログラムがループに陥ることがあることも認識しておく必要があります。これには、適切なタイミングと空間で行われる視線、解放のジェスチャーが必要です。

瞑想もまた、現実の認識を歪める可能性のあるこれらの習慣のパターンから抜け出すのに役立ちます。顔面および眼の微小損傷は、眼の向きを変え、精神的なプログラムに影響を与える可能性があります。眼は、**視蓋脊髄路**および**筋膜組織**に蓄積された記憶と関連して、神経感覚情報の統合において極めて重要です。

筋膜は、情報と記憶を蓄積できるインテリジェントな組織です。適切な場所とタイミングで、適切な精神的マッピングを持って耳を傾けることで、解放を達成することができます。この精神的表現は影響を受けやすく、視覚的なメッセージをサポートすることさえできます。

眼と髄膜系の間のつながりは根本的です。眼は灯台のように機能し、このレベルですべての情報を統合します。眼は純粹であるため、欺くことはできないことを理解することが不可欠です。光は、光子として、私たちの知覚に影響を与えるエネルギー源です。周波数と波長の関係は重要です。周波数が高いほど波長は短くなり、エネルギーが増加します。

網膜によって捕捉された光情報は、流体の動員を引き起こす可能性があります。網膜の**錐体**と**桿体**は、情報のセンサーであるだけでなく、エネルギーのセンサーでもあります。肉体的な疲労は、しばしば交感神経系の損傷と関連しており、**散瞳**と桿体の興奮を引き起こし、交感神経系を疲弊させる可能性があります。

エネルギーストレスなどの要因は、私たちの状態を悪化させる可能性があります。適切な光情報は、私たちの健康を維持するために不可欠です。オーラは、光の場として、人生における私たちの位置に影響されます。ポジティブなエネルギーを発するためには、内なる平和と知恵を育む必要があります。

眼は、エネルギーと解釈のプログラムを受け、事前プログラムの形で情報を統合します。このプロセスは、私たちを電気的および電磁気的な平面へと導き、そこでは心臓が中心的な役割を果たします。心臓は強力な電磁場を発し、眼は可動性の支点として、異なる電流の影響も受けます。

左眼と右眼の間には血管に大きな違いがあり、その機能に影響を与えます。例えば、右眼は肝臓の静脈うっ滞と関連しており、左眼は動脈性高血圧と関連しています。これらの解剖学的な違いは、視覚皮質に特定の干渉を引き起こす可能性があります。



図一 螺旋状の目

眼の反射、例えば前頭眼窩反射や耳介心臓反射は、眼への軽い圧力が心臓の問題を再調整できることを示しています。各眼には姿勢の役割と優位眼があり、これらは常に同じではありません。

眼の動きは再調整に不可欠です。視軸と傾斜角は、神経感覚的な光の統合において役割を果たします。眼は、約23度の光の統合の自由度を持っており、この数字は地球の傾きなど、さまざまな文脈で見られます。




図一 中心線での交差

最後に、錐体軸などの情報軸は、眼の不安定化がバランスにどのように影響するかを示しています。骨に統合された記憶や電気的なパターンも、私たちの知覚とバランスに影響を与える可能性があります。




図一 視覚統合の軸と角度



図一 眼球運動



図一 視覚の23の自由度



図一 眼窩軸と錐体軸



図一 骨の中の記憶