

19. 質問 J1：軸性プロセスにおける波の向き

所要時間：02:00

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生フェーズ1における羊膜腔と卵黄嚢の間の波動運動を探求します。羊膜腔が前方に、卵黄嚢が後方に向かうこの動きは、S字型のダイナミクスを生み出し、胚細胞にとって不可欠な情報の注入と浸透のプロセスの始まりを示します。この動きの意味合いは、特に着床時において重要です。着床時には、胚盤胞の細胞が栄養と栄養情報を受け取り、急速に成長し、新しい極性を発達させます。このセッションでは、運動、栄養、胚発生間の複雑な相互作用に光を当て、存在論的プロセスをよりよく理解するための鍵を提供します。

軸方向プロセスにおける波動の向き

羊膜腔と卵黄嚢腔の間で、**波動**の動きが生じます。羊膜腔の動きは前方に、卵黄嚢腔の動きは後方に向かいます。この動きは**胚莖**との関係で考慮されるべきです。

問題は、この動きが国の方向性の中に位置づけられるかということです。ある時点で、それは**衝動**となります。

前方に移動する羊膜腔の動きと、その時点でそれほど速く前進しない卵黄嚢が組み合わさることで、後方への動きの印象を与えます。この現象は波動を生み出し、**S字型**の形成の始まりを示します。これが**フェーズ1**を構成します。

この動きは、情報の拡散方法である**透過**、**注入**に関連しています。これは**栄養**供給であり、到着する**代謝基質**です。

この段階では、私は膜に沿って留まり、透過しています。細胞間に栄養素を送っています。時々、自分の器官を栄養補給します。

この**栄養**は動きを伴います。しかし、当初、力は主に器官に向けられます。これは、その元の位置が前方であるためです。

着床の際、私が粘膜に入るとき、**胚盤**の細胞が最初に栄養情報を受け取ると言えます。それらはすでに、より速く発達するように素因付けられています。これらの細胞はより中心にあり、より小さいため、より多くの情報を引き付けることができます。これは新しい**極性**を表します。

