

20. 質問 J1：中胚葉の配置

所要時間：02:33

学習シート

コース概要

このセッションでは、胚における中胚葉形成の重要な段階を学びます。これは波のような動きによって調整されるプロセスです。原線とヘンゼン結節のダイナミクスに重点が置かれており、これらは細胞の発達にとって不可欠です。原線の退縮と同期して脊索がどのように形成されるか、また上胚葉の細胞がどのようにして中間組織である中胚葉（後に中胚葉となる）の出現に寄与するかを発見します。この理解は、胚発生を理解するための貴重なツールを提供し、胚学とオステオパシーにおける実践を豊かにするでしょう。

中胚葉の形成

中胚葉は、胚の中で描かれる**波**の動きを通して形成されます。この動きは、胚発生における重要な要素である原始線に**吸引場**を作り出します。

原始線が退行するにつれて、それは**ヘンゼン結節**とともに下降し、完全に消失します。このダイナミクスは上から見た図で表されており、上には**羊膜腔**が見られます。

脊索はこの動きに反応して形成されます。この段階で、**胚柄**のレベルで牽引が起こり、それが原始線の出現につながります。脊索と原始線の形成は**同時**に起こりますが、このプロセスには微妙な時間的順序があることに注意することが重要です。

図示された描画は、上胚葉の**上皮細胞**の動きを強調する断面を示しています。これらの細胞は中心に向かって引き寄せられ、上胚葉と下胚葉の間に形成される空間を満たします。






図 — 原腸形成

波の形成時に開くこの空間は、将来の**中胚葉**となる**中胚葉**として知られる**中間組織**の出現に不可欠です。



図一 鳥類の原腸形成



図ー ヒトの原腸形成 16日目