

23. 食道の発生

所要時間：07:43


学習シート

コース概要

このビデオでは、食道の発生を深く掘り下げ、精神と心臓をつなぐ関節としての食道の重要な役割を強調しています。ここでは、胚の屈曲が体幹に与える影響について議論されており、それが消化器系を形成し、肺と食道の形成を可能にします。食道の適応構造、横隔膜との関連、および機能不全、特に逆流や耳鼻咽喉科の問題の結果に焦点が当てられています。食道、気管、大動脈の間の動的な相互作用は、私たちの全体的な健康にとって不可欠なリズムカルな複雑さを示しています。迷走神経叢や腹膜血管系などの主要な概念を通して、このレッスンはオステオパシーの実践における胚システムの重要性を浮き彫りにします。


食道の発生

食道の発生は、**精神**と**心臓**の間の連結です。**大動脈**はこのシステムにおいて中心的な役割を果たし、**羊膜腔**は外部からの圧力をかけます。これら2つの要素の間で、**脳**が発生を方向付け、**心臓**が支点となります。




図一 原腸形成、神経管形成、内陥

私たちは以前、胚の屈曲運動の頭部における適用性の影響を研究しました。今回は、この適用性が**体幹**に与える影響を検討します。この屈曲運動は、様々な消化器現象を引き起こします。



図一 胎児循環

研究すべき最初の消化器現象の1つは、**肺**の発生です。肺は腺と見なすことができます。この屈曲運動には、**羊膜腔**、**卵黄囊**、そして**心臓**が関与しています。私たちは、憩室を伴う**前腸**の出現を観察します。徐々に、肺領域と消化器領域が形成されます。



図一 胎児循環

食道は、**呼吸器憩室**と**胃**の拡張部の間にある**原始腸管**のセグメントから発生します。食道は**内胚葉性**（内部組織）部分と**間葉**（結合組織、筋肉組織、線維組織）から構成されています。上皮が内部を形成し、その周囲にはその構造に寄与する組織があります。

食道は、その環境に対してある程度の適応性を示します。しかし、食道接合部の多くの問題は、**横隔膜**との関係に関連しています。これらの機能不全は、中耳炎、鼻炎、さらには胃食道逆流などの**耳鼻咽喉科**の問題を引き起こす可能性があります。**ペプシン**や**塩酸**などの要素が一部の子供の中耳から発見されており、逆流と耳鼻咽喉科の問題との関連性を示唆しています。





FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

図一 食道切片

逆流が常に灼熱感を伴うわけではないことに注意することが重要です。実際、一部の逆流はガス性であり、ガス分子がシステム内に逆流します。これはしばしば、食道と胃の間の接合部、横隔膜レベルでの機能不全が原因です。


Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.




図一 食道裂孔

横隔膜接合部は非常に重要です。なぜなら、それは**ジュバラ線維**と適応性のある**食道周囲空間**と関係しているからです。このレベルでの機能不全は、横隔膜の質と開口部を妨げる可能性があります。スティールは言いました。「横隔膜が自由でなければ、あなたの人生の扉は自由ではない。」



図一 横隔膜の前面図

迷走神経叢も非常に重要です。食道、気管、大動脈は相互に連結されており、律動的な領域を形成しています。この領域は、**共通の筋膜と後方腸間膜**によって維持されており、これらはD3-D4周辺の中央背側領域に付着しています。



図一 腹部食道

食道は嚥下に関与し、**気管**は呼吸に関与し、**大動脈**は心臓の動きに関与しています。これらの相互作用は1日に何千回も起こり、複雑な律動的ダイナミクスを生み出しています。





Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).


図一 胚の大動脈弓

また、大動脈系との直接的な連続性があり、**十二指腸の第4部**に向かって伸びる靭帯もあり、**腹腔動脈幹**の重要な領域を開いています。腹腔動脈幹は、横隔膜下腹膜部分の血管供給、**肝臓**と**胃**の灌流に不可欠です。



図一 大動脈、弓、肋間

最後に、食道の様々な層と、消化器系全体の発生におけるそれらの重要性を検討しながら、**肺**の研究に取り組みます。



図一 胸部と腹部の神経支配