

33. 練習：復習と胃の連鎖作業

所要時間：07:43

学習シート

コース概要

このビデオは、消化管と感情のつながりに焦点を当て、胃に対するオステオパシー的アプローチを深く掘り下げています。主要な概念には、頭蓋底から胃までの穏やかな操作、および胚発生上の支点と支点の考慮が含まれます。怒りのような緊張や抑圧された感情を認識し、治療する方法を学びながら、臓器の機能を改善します。このビデオでは、胃、発話、患者の呼吸の関係も探求し、修正を身体の記憶に定着させるための変容と大脳辺縁系への接続のテクニックを統合しています。

実践：胃の連鎖におけるリコールと作業

消化管は口から肛門直腸膜まで伸びています。私たちはすでに食道、肺、そして今度は胃を、その不可欠な包装、すなわち後胃嚢と腹膜を考慮に入れて探求してきました。後者は、私たちのアプローチにおいて知的な要素として考慮されるべきです。

私たちは頭蓋底から胃の食道-噴門-大彎結合部まで作業します。また、食道の支点およびその胚学的支点に関連して、舌骨レベルでの支持領域を考慮することも重要です。後者は、毎回元に戻るVinsoの裂孔によって表されます。

システムがその機能において効率的に組織化されるためには、支持点を探ることが重要です。私たちは胃のいくつかの機能、すなわちホルモン機能、機械的機能、流体機能を特定しました。さらに、胃は言葉と関連しています。その機能は口の中で始まり、舌、唾液、歯、嚥下を伴います。これは、言葉を飲み込まないことの重要性を強調しています。

怒りは表現され、抑圧され、あるいは私たちが啓発することができます。表現されれば問題になる可能性があります。抑圧されれば非常に悪いことです。しかし、明確に利用すれば、私たちが啓発することができます。怒りがこみ上げてくる瞬間には、心の明晰さに戻るために活用できるビジョンがあります。すべての感情には知恵があり、覚醒に変えることができます。

虹彩の周りに小さな胃輪が見られます。唇を調べると、わずかな変色が見られ、舌は青白く震えています。胃の治療を開始するには、頭蓋底から始め、硬膜鞘を再開しながら、輪を探し、自由を可能にするために穏やかな圧力を加えます。

まず組織レベルに取り組み、次に細胞レベル、必要であれば分子レベル、酵素レベル、またはエネルギーレベルに取り組みます。作業は蝶形骨底結合に対して穏やかに行われます。首のロツジのわずかな腫れは、副腎に関連する古いストレスを示している可能性があります。腎臓と横隔膜を介して解放し、横隔膜の脚に柔

軟性を取り戻します。

舌骨もその**胚学的支点**に関連して治療することができます。舌下神経のレベルで緊張が感じられることがあり、これは表現を容易にするために解放できる**言われなかったこと**を示しています。胃の結合部を考慮に入れることで、緊張を解放するために**蝶形骨**も治療することができます。

胃は全体として、**大網**の後腔に接続されています。胃の後部に手を置くことで、表現を可能にする**滑り**の表面を作成します。患者の呼吸を観察し、その呼吸とつながります。作業は**空虚**の中で行われ、そこから組織の情報を得ることができます。

穏やかな**変容**が起こり、組織から匂いが放出されるのを感じることができ、変化を示しています。**仙骨**のレベルで作業することで、小骨盤を探求することができ、体の再調整に役立つ可能性があります。強い熱が感じられることがあり、祖先の整列を象徴しています。

これらの修正を患者の脳に記録し、**辺縁系**にアクセスして、この瞬間を**永遠**として記憶させます。





図 — 胃の動脈供給



図一 門脈-大静脈吻合