

03. 眼の起源

所要時間 : 07:12


学習シート

コース概要

このビデオでは、発生8日目から間脳から発達する眼の起源を深く掘り下げています。羊膜腔と脳脊髄液（CSF）の重要性、そしてこれらの要素が眼の形成とその環境との動的平衡にどのように影響するかに焦点が当てられています。羊膜腔、脳室系、眼の関係が強調され、個人の健康に影響を与え、眼を通して現れる可能性のある臨床的および遺伝的影響も強調されています。この理解は、セラピストが患者のバランスを評価し、回復させるのに役立つため、オステオパシーと生体力学的発生学を実践する人々にとって不可欠な教育となります。


眼の起源

眼は、胚発生8日目に現れる**羊膜腔**と呼ばれる小さな空洞の形成と驚くほど**類似**しています。この空洞は眼の発達にとって極めて重要であり、眼は**脳**、より正確には第三脳室の拡張である**間脳**に由来します。



図一 第三脳室に関連した、間脳からの眼の起源に関する図。

この発達の過程で、神経系は**原始羊水**を受け取り、それが**脳脊髄液（LCR）**を形成します。羊水に由来するこの最初のLCRは、神経管内に閉じ込められます。その後、この管は前方に開口し、**原始小胞**を形成します。



図一 概要でこの文の直後に触れられている羊膜腔の出現に関する図。

この羊膜腔の痕跡は、**骨のポケット**または**ゾーンB**と呼ばれる、脳脊髄液が存在する場所に残っています。胚の内側と外側の液体が同じであることは興味深い点です。眼は膜として、常にこのゾーンBのバランスを取ろうとします。

ゾーンAは身体の物理的な中心軸を表し、羊膜腔は8日目に形成され始め、**粘膜**への侵入を示します。この段階で、中心の液体が失われることで小さな空洞が作られ、この段階では**上胚葉**と呼ばれる**外胚葉**が形成され始めます。これはすでに、眼と脳を形成する微細な構造を構成しています。




図 — Vestige de la cavité amniotique (zone B)

9ヶ月間胚を取り囲む羊膜腔は、その後蒸気状の空間になります。この空間は内部の液体と平衡を保つ必要があります。特に事故の場合、不均衡が生じ、眼の位置に影響を与える可能性があります。したがって、眼は神経系の液体（LCR）の深さと周囲の空間との間の平衡を表しています。

眼の位置を観察することで、その人の平衡に関する情報が明らかになることがあります。各個人はわずかに異なる眼を持っており、それはしばしば脳の構造と関連しています。**垂直性**に対する**水平性**の探求は、消化器系と腹膜系の平衡と同様に不可欠です。




図 — 着床プロセス：腔の形成

治療後に眼を観察することは非常に重要です。眼の位置が安定していない場合、それは平衡がまだ回復していないことを示しています。羊膜腔は、もはや液体の形ではありませんが、蒸気状など他の状態で存在し続けています。

羊膜腔、眼、脳室系とのこの関係は極めて重要です。眼は第三脳室の拡張として、**前神経孔**が閉じる前に発達し始めます。さらに、肝脾臓系、心臓系、甲状腺系などの影響を受ける領域における情報の共局在化など、興味深い遺伝的意味合いがあります。




図 — 羊膜腔

糖尿病、**心臓病**、**甲状腺疾患**などの病状は眼を通して現れることがあり、これにより正中軸と側方性の組織化における**神経堤**の重要性が明らかになります。