

13. 原始頭蓋仙骨軸

所要時間 : 03:34


学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生第2週目に脊索の形成とともに現れる、原始的な頭蓋仙骨軸を深く掘り下げて探求します。この教育は、頭蓋骨と仙骨にとってこの構造がいかに重要であることを強調し、特に、仙骨が自由であることが脊椎の機能と頭蓋底の屈曲伸展を確保するために不可欠であると指摘しています。さらに、このビデオでは、これらの胚発生のダイナミクスが泌尿生殖器の病状に与える影響、およびS状結腸と膀胱の間の特定の感情的またはエネルギー的な閉塞を解放することが、全体的なバランスの改善にどのように貢献できるかについて論じています。学生は、これらの概念を操作して、オステオパシーと生体力学的胚学の実践を向上させる方法を学びます。

原始頭蓋仙骨軸

胚発生第2週において、上胚葉の**S字型**が**脊索**を形成し始めます。**エンセン結節**、または原始陥凹は、固定された支点となり、徐々に後方へ移動します。



図一 上胚葉のプロセスの始まり

この構造は、**下垂体**、**蝶形骨の大翼**、**錐体システム**、**後頭骨システム**、**篩骨**などの要素を統合する**頭蓋骨**の基盤を形成するため、不可欠です。下方では、原始線の痕跡であるS2のプロセスを伴う**仙骨**の発生が始まります。このプロセスは重要な支点となり、機能的単位を可能にする**自由な仙骨**の重要性を強調します。

この発生段階では、胚は脊索と原始線を持つラケットのような形をとります。この成長プロセスは、特に心臓前野の**中胚葉**を形成するための吸引場を生成します。胚の前方成長はこの領域に物質を吸引し、**ボトル細胞**の形をした細胞を中央に引き込みます。これらの細胞は、間葉レベルで不可欠な**ヒアルロン酸**を放出します。

脊索軸は、仙骨の動きの自由度に影響を与えるため、基本的です。仙骨がブロックされると、脊椎が適切に機能せず、頭蓋底に影響を与えます。自由でない頭蓋底は、良好な**屈曲-伸展**を妨げ、**神経頭蓋**と**内臓頭蓋**の間の不均衡を引き起こします。

このダイナミクスは、眼が定着する頭蓋骨の上昇力と、**中胚葉組織**の形成に関連しています。外胚葉の成長は上方に引っ張り、原始結節は仙骨に向かって下降します。これにより、母親に関連するタンパク質情報の重要な領域が作成されます。

多くのブロックされた**祖先のイメージ**は、S状結腸と膀胱の間に位置しており、これらの情報をクリアすることが重要です。泌尿生殖器の問題はこれらの情報によって伝達される可能性があり、仙骨の下降移動力がこのプロセスにおいて重要な役割を果たします。

