

25. 改訂

所要時間 : 01:05

学習シート

コース概要

このビデオでは、網膜の解剖学について深く掘り下げ、ぶどう膜、脈絡膜、虹彩、毛様体を含むその被膜について説明します。外網膜と内網膜で構成される網膜が、原始的な眼杯と、それが上皮芽と傍分泌的に相互作用することからどのように発生するかを学びます。議論される重要な点の1つは、理論的にも臨床的文脈においても理解することが不可欠な現象である網膜剥離です。さらに、網膜が脳由来の組織であるということが強調されており、この概念は発生学的理解を深め、眼疾患に関する展望を開きます。

網膜の解剖学的復習

眼の被膜は、脈絡膜、虹彩、毛様体からなる**ぶどう膜**を含みます。この被膜を取り除くと、**網膜**にアクセスできます。網膜は、主に2つの大きな層、すなわち**外網膜**と**内網膜**で構成されています。

剥離は網膜で発生する重要な現象であり、知っておくべきです。この段階で、**原始視蓋**が形成され、表面の**上皮芽**と**傍分泌**的な接続を確立します。この相互作用により、上皮芽が肥厚し、**外側視覚プラコード**が形成されます。これは、周囲の構造が発達する間、所定の位置に保持されます。

このダイナミクスにより、**原始的な陥凹**が生じます。網膜は、発達するにつれて、**外網膜**と**内網膜**と呼ばれるものを包み込み、形成します。網膜剥離はここで発生し、多くの人が経験したことのある問題です。

網膜は、実際には**脳**、より正確には**脳室組織**に由来する組織であることに注意することが不可欠です。