

中医实用效方

保定市卫生工作者协会 編

河北人民出版社

中医实用效方

保定市卫生工作者协会 編

河北人民出版社

新方集

中医实用效方

保定市卫生工作者协会 编

★

河北人民出版社出版（保定市裕华东路）

河北省书刊营业许可证第三号

北京新华印刷厂印刷

新华书店河北分店发行

★

1958年11月第一版 1958年11月第一次印刷

787×1092 耗 $1\frac{1}{32}$ ·4 $\frac{3}{4}$ 印张·97,000字

印数：1—20,000册 定价：(8) 0.46元

统一书号：T 14086·44

35105

前 言

“驗方”是祖国医学重要組成部分，是我国劳动人民长期和疾病作斗争而积累起来的宝贵經驗。历代以来，它对我国人民的保健事业，起了决定性的作用。但是由于年代深远，以及旧会制度的影响和摧残，致使这些宝贵的經驗，很少被人重視，或掌握在少数人的手中，不肯外传，以致有些已經失传。

我市自大力貫徹和执行党的中医策政以后，大大鼓舞了卫协会会员的热情，因而都紛紛将自己多年秘藏的秘方、驗方、单方和土方貢獻出来。特别是当党責成本会把我市的驗方整理成册以留传百代以后，广大会员群众的献方热情，更加高漲。仅在本年六月上半月，即献出四百余方。这些驗方多系献方人通过临床实践，积累下来的宝贵經驗，和民間流传很久的有效驗方。为了使这本小册子出版后，能够进一步发挥作用，我們本着廉、簡、效的原則进行选方外，并和献方人作了多次的接触，以求在葯物、剂量、配制、用法、禁忌等方面可靠无誤。

另外，在这本小册子的編排上，采取了一般中医書籍的編排貫例：将发有定处的疾病，自上而下地編排于前，将发无法处的疾病，編排于后。除此，并根据所选出的 252 个驗方，分为內、外、妇、兒四科，科下設类，类下設条，以期門类清楚，容易查找。

为了便于中西医师和讀者的研究参考，我們还尽量的向献方人征集了一些治驗，同时还根据我們的認識，加了一些按

語。但是，由于我們的學識所限，經驗不足，時間緊迫，所以在這本小冊子的內容上或形式上，都難免存在着一些缺點和錯誤。希望醫界同仁，以及關心祖國醫學的讀者們，隨時予以批評和指正。更希望使用本書驗方的同志們，將治療結果，隨時函知本會，以便及時總結經驗，交流推廣。

保定市衛生工作者協會

1958年9月

目 录

内 科

一、头晕疼方类(共七方)

(一)眩暈內服方.....	1
(二)眩暈內服方.....	1
(三)头疼內服方.....	2
(四)头疼外用方.....	3
(五)头疼內服方.....	3
(六)头疼內服方.....	4
(七)治白头发方.....	4

二、瘟瘡方类(共二方)

(一)瘟瘡內服方.....	5
(二)清热解毒內服方.....	5

三、眼病方类(共七方)

(一)洗眼方.....	7
(二)內服方.....	8
(三)治瞳孔散大內服方.....	8
(四)眼科內服方.....	9
(五)远視眼內服方.....	10
(六)近視眼內服方.....	10
(七)云朦眼方.....	11

四、鼻衄方类(共三方)

(一)鼻衄不止外用方.....	11
(二)鼻衄外用方.....	12
(三)鼻衄血內服方.....	12

五、牙疼方类(共六方)

- (一)风火牙疼外用方.....13
- (二)火牙疼内服方.....13
- (三)风火牙疼内服方.....14
- (四)虫蛀牙疼外用方.....14
- (五)风火牙疼内服方.....14
- (六)牙齿外敷方.....15

六、咽喉方类(共四方)

- (一)咽喉吹药方.....15
- (二)咽部吹药方.....16
- (三)咽喉吹药方.....16
- (四)喉症内服方.....17

七、骨哽方类(共二方)

- (一)骨哽外用方.....18
- (二)骨哽外用方.....18

八、咳喘方类(共三方)

- (一)咳喘内服方.....19
- (二)咳喘内服方.....19
- (三)痰喘内服方.....20

九、咳血方类(共四方)

- (一)痰中带血内服方.....21
- (二)痰中带血内服方.....21
- (三)肺痛咳吐血内服方.....21
- (四)痰中带血内服方.....22

十、吐血方类(共二方)

- (一)吐血内服方.....22
- (二)吐血内服方.....23

十一、噎食方类(共二方)

- (一)噎食内服方.....23

(二)噎食內服方24

十二、胃疼方类(共五方)

(一)胃疼內服方25

(二)胃疼內服方25

(三)胃疼內服方26

(四)胃疼內服方26

(五)呃逆內服方27

十三、腹疼方类(共二方)

(一)腹疼內服方27

(二)腹疼外用方28

十四、吐泻方类(共三方)

(一)吐泻內服方28

(二)霍乱內服方29

(三)治黎明五更泄方30

十五、腸痛方类(共一方)

(一)腸痛內服方31

十六、阴寒方类(共一方)

(一)阴寒外用方31

十七、臌症方类(共七方)

(一)全身水肿內服方32

(二)全身水肿內服方33

(三)臌症內服方33

(四)臌症內服方34

(五)臌症內服方34

(六)臌症內服方35

(七)腎囊腫內服方36

十八、痢疾方类(共六方)

(一)痢疾內服方36

(二)痢疾內服方37

(三)痢疾內服方	37
(四)痢疾內服方	37
(五)痢疾內服方	38
(六)痢疾內服方	38

十九、脫肛方类(共二方)

(一)脫肛外敷方	39
(二)脫肛內服方	39

二十、大便下血方类(共六方)

(一)大便下血內服方	40
(二)大便下血內服方	40
(三)大便下血內服方	40
(四)大便下血內服方	41
(五)腸風症內服方	41
(六)大便下血內服方	42

二十一、遺精白濁方类(共二方)

(一)淋症白濁外用方	42
(二)遺精內服方	43

二十二、二便不利方类(共三方)

(一)利尿外用方	43
(二)利尿內服方	44
(三)大小便不利內服方	44

二十三、遺尿方类(共二方)

(一)遺尿內服方	44
(二)遺尿外用方	45

二十四、風寒疹方类(共六方)

(一)風寒疹內服方	45
(二)風寒疹內服方	46
(三)風寒疹外敷方	46
(四)風寒疹內服方	47

(五)风寒疹内服方	47
(六)风寒疹外用方	48
二十五、羊癫风方类(共五方)	
(一)羊癫风内服方	49
(二)羊癫风外用方	49
(三)羊癫风内服方	50
(四)羊癫风内服方	51
(五)羊癫风内服方	51
二十六、破伤风方类(共二方)	
(一)破伤风内服方	52
(二)破伤风外用方	53
二十七、驱虫方类(共三方)	
(一)驱虫外用方	53
(二)驱虫内服方	54
(三)驱虫内服方	54
二十八、解服毒方类(共二方)	
(一)解服毒内服方	54
(二)解服毒内服方	55

外 科

一、秃疮方类(共三方)

(一)秃疮外敷方	56
(二)黄水疮外敷方	56
(三)秃疮外敷方	57

二、脑后疮方类(共二方)

(一)脑后疮外敷方	58
(二)脑后疮外敷方	58

三、鼻部方类(共二方)

(一)赤红鼻外用方	59
-----------------	----

(二)酒齕鼻症方	59
----------------	----

四、耳疮方类(共五方)

(一)耳底疮外用方	60
(二)耳底疮外用方	60
(三)耳下腺炎外用方	61
(四)耳底疮外用方	61
(五)耳底疮内服方	62

五、瘰疬方类(共九方)

(一)瘰疬内服方	63
(二)瘰疬外敷方	63
(三)瘰疬外敷方	64
(四)瘰疬外敷方	64
(五)瘰疬内服方	65
(六)瘰疬外敷方	65
(七)瘰疬阳症内服方	66
(八)瘰疬外敷方	66
(九)瘰疬内服方	67

六、疔疽方类(共九方)

(一)疔疽外用方	67
(二)疔疽外用方	68
(三)疔疽外用方	69
(四)无名肿毒外用方	69
(五)各种疔疮外用方	69
(六)疮疡溃后外用方	70
(七)疔疮肿毒内服方	70
(八)疔疽发背内服方	71
(九)疔毒内服方	72

七、搭背方类(共三方)

(一)搭背外敷方	72
----------------	----

(二)搭背外敷方.....73

(三)搭背外敷方.....73

八、腰膝方类(共三方)

(一)腰膝内服方.....74

(二)腰膝外用方.....75

(三)腰膝内服方.....75

九、前阴方类(共二方)

(一)绣球风洗方.....76

(二)女阴部瘙痒外用方.....76

十、痔漏方类(共五方)

(一)痔漏外用方.....77

(二)外痔疮洗方.....77

(三)痔漏熏洗方.....78

(四)痔漏熏洗方.....78

(五)痔漏熏洗方.....78

十一、臁疮方类(共六方)

(一)臁疮外敷方.....79

(二)臁疮外敷方.....79

(三)臁疮外敷方.....80

(四)臁疮外敷方.....80

(五)臁疮外敷方.....80

(六)臁疮外敷方.....81

十二、脚气方类(共三方)

(一)脚气外敷方.....81

(二)脚气外敷方.....82

(三)脱指疽内服方.....82

十三、鹅掌风类(共一方)

(一)鹅掌风内服方.....83

十四、黄水疮方类(共九方)

(一)黃水疮外用方	84
(二)黃水疮外用方	84
(三)黃水疮外用方	84
(四)黃水疮外用方	85
(五)黃水疮外用方	85
(六)黃水疮外用方	85
(七)黃水疮外用方	86
(八)黃水疮臃疮阴疮外用方	86
(九)白点风方	87

十五、燙伤方类(共七方)

(一)燙伤外用方	87
(二)火燙伤外用方	87
(三)燙火伤外用方	88
(四)水火燙伤外用方	88
(五)水火燙伤外用方	89
(六)燙火伤外用方	89
(七)燙伤外用方	90

十六、疥癬方类(共三方)

(一)疥癬外用方	90
(二)疥癬外用方	91
(三)疥癬外用方	91

十七、痒疹方类(共四方)

(一)蕁麻疹外用方	92
(二)蕁麻疹內服方	92
(三)痒疹內服方	93
(四)磺胺过敏性反应而引起的一切症状內服方	93

十八、跌打損伤方类(共七方)

(一)骨断筋伤外用方	94
(二)外伤外用方	94

(三)跌打骨折內服方	95
(四)跌打損傷內服方	95
(五)骨折肿痛外用方	96
(六)接骨外用方	96
(七)接骨內服方	97
十九、瘤子方类(共二方)	
(一)瘤子外貼方	98
(二)瘤子潰爛外敷方	98
二十、解毒方类(共五方)	
(一)解毒外敷方	99
(二)解毒外敷方	100
(三)解毒內服方	100
(四)移毒內服方	100
(五)解毒外用方	101

妇 科

一、調經方类(共二方)	
(一)調經內服方	102
(二)調經內服方	102
二、帶下方类(共七方)	
(一)帶症內服方	103
(二)帶症內服方	104
(三)帶症內服方	104
(四)帶症內服方	105
(五)帶症內服方	105
(六)帶症內服方	106
(七)帶症內服方	106
三、崩漏下血方类(共五方)	
(一)崩漏下血內服方	107

(二)崩漏下血內服方	107
(三)崩漏失血內服方	108
(四)崩症內服方	109
(五)止血內服方	109

四、經閉干癆方类(共四方)

(一)經閉干癆內服方	110
(二)經閉干癆內服方	110
(三)經閉干癆內服方	111
(四)經血不調內服方	111

五、胎前方类(共三方)

(一)胎前腰疼內服方	112
(二)子悬不安內服方	113
(三)胎气搶心內服方	113

六、临产方类(共二方)

(一)难产內服方	114
(二)难产內服方	114

七、产后杂症方类(共八方)

(一)产后杂症內服方	115
(二)产后杂症外用方	115
(三)产后杂症內服方	116
(四)产后杂症內服方	116
(五)产后杂症內服方	117
(六)产后杂症內服方	117
(七)产后杂症內服方	118
(八)产后杂症內服方	118

八、产后风方类(共五方)

(一)产后风內服方	119
(二)产后风內服方	120
(三)产后风內服方	120

(四)产后风外用方	121
(五)产后风内服方	121
九、产后抽筋疼方类(共四方)	
(一)产后抽筋内服方	122
(二)产后臂疼抽搐内服方	122
(三)产后风鸡爪风内服方	123
(四)两手抽筋内服方	124
十、下乳方类(共三方)	
(一)下乳内服方	124
(二)下乳内服方	125
(三)下乳内服方	125
十一、回乳方类(共一方)	
(一)回乳内服方	126
十二、乳疮方类(共五方)	
(一)乳疼红肿外敷方	126
(二)乳疮初起内服方	127
(三)乳部肿疼内服方	127
(四)乳疮内服方	127
(五)乳瘤外用方	128

兒 科

兒科方类(共十四方)

(一)小兒风症内服方	129
(二)小兒口疮内服方	129
(三)小兒口疮内服方	130
(四)小兒疳腮外敷方	130
(五)小兒疳腮内服方	130
(六)小兒驚驚咳内服方	131
(七)小兒陣咳内服方	132

(八)小兒咳嗽內服方	132
(九)小兒咳嗽外敷方	133
(十)小兒積痞內服方	133
(十一)小兒積痞內服方	134
(十二)小兒黃疸病內服方	134
(十三)小兒疝氣內服方	135
(十四)小兒軟骨症內服方	135
(十五)小兒寸白虫內服方	136

內 科

一、头晕疼方类(共七方)

(一) 眩暈內服方

保定市北大街联合診所中医张树棠介紹

来源：自創方。

主治：眩暈（高血压）。症状：头眩心煩、四肢不适、脉弦大有力。

处方：生龙骨七錢 生牡力五錢 石决明三錢
夏枯草三錢 龙胆草三錢 元 参五錢
生 地六錢 犀 角一錢 寸 冬四錢
香 元三錢 佛 手三錢 桑寄生三錢
陈 皮二錢 杏 仁四錢 柏子仁三錢
合欢皮二錢 蔓荆子三錢 丹 皮三錢

用法：水煎服。如头疼加川芎、菊花，腎虛加山萸，內熱加黃芩、銀花，四肢麻木加桑枝、南紅花，咳嗽加川貝、百合。

治驗：（1）蘆相亭，男，年四十七岁，系河北医学院教授。症状：头晕眩、心煩、气悶、四肢麻木、沈重，經医学院检查血压为 190/120，以此方加桑枝三錢、南紅花二錢，連服十剂血压降到 154/86 而愈。（2）韓廷枫，男，五十九岁，住金台驛街四十二号。症状：头晕眩疼、周身不适，心煩而悸气短，記憶力减退，照此方服四剂症退，又加銀花五錢、菊花二錢，服六剂血压降至一百五十四而愈。

(二) 眩暈內服方

保定市穿行樓南街五十七號中醫李海濂介紹

方名：血壓速降丸(原名不老松)。

來源：衡水縣名醫劉立之大夫傳授。

主治：眩暈(高血壓)。症狀：脈弦有力，頭目眩暈疼痛，或肢體不利，口眼歪斜，昏厥不省人事等症。

處方：生 地五錢 元 參五錢 丹 皮二錢
焦梔子二錢 生赭石八錢 生龜板二錢
胆南星二錢 清 夏二錢 南紅花一錢
桃 仁二錢 明天麻二錢 勾 藤三錢
當 歸三錢 生山藥六錢 牛 夕五錢
杭白芍三錢 地 龍二錢 菊 花三錢
黃 芩三錢 知 母二錢 生石膏七錢
薄荷冰五分

制法：將以上諸藥共為細面，煉蜜為丸，每丸三錢重，貯瓶內備用。

用法：每日早晚各一丸，飯後服，白水送下。

反應：胃弱者連續用常有胸滿感，如引起胸滿時，可暫停一、二日再服，或減為每日一丸。

治驗：此方為劉大夫治高血壓的常用效方，曾治愈多人。于一九五七年傳來保定後，經張樹棠大夫等服用，證明有效，故而介紹。

按：據內經記載：諸風掉眩皆屬於肝，以上一、二兩方諸藥皆為調肝、理氣、清熱、寧神之劑，故在臨床上都護得滿意的效果。誠乃治療肝旺眩暈之良方也。

(三) 頭疼內服方

保定市杜家胡同十七號中醫賈舜卿介紹

來源：經驗方。

主治：头疼。

处方：杭菊一两 川 芎一錢

用法：以上二味水煎服。

如左侧头疼血虚者加当归三錢，右侧头疼者加桔梗五分，两侧头疼加柴胡五分、荷叶半张，冒风者加芥穗一錢，冒寒者加苏叶七分，颠顶疼者加藁本五分，脑齿疼者加細辛三分，前头疼者加白芷一錢、生地三錢，后头疼者加羌活五分。

按：菊花苦辛无毒，疗諸风头疼且有明目之功，川芎辛温治諸般头疼暈眩。故此方治疗諸般头疼，随引調用，皆有卓效；尤其在賈大夫临床运用治愈者甚多，藥簡效宏，堪称良方。

(四) 头疼外用方

保定市裕华路中医樊庆彬介紹

来源：民間驗方。

主治：头疼。

处方：千年見 透骨草 追地风 一枝蒿各二錢

用法：以上四味用紗布包好，水熬数沸洗头当时見效，数次即愈。

按：此方为清热下行之品，用治头疼，有引邪随經下降之功，故而有效。

(五) 头疼內服方

保定市杜家胡同十七号中医賈舜卿介紹

来源：自創方。

主治：热厥头疼：头疼剧烈，目赤，舌有黄苔，煩燥欲呕，善凉恶热等症。

处方：羚羊角二分 广犀角一錢 銀 花三錢
連 翹三錢 蔓荆子二錢 薄荷叶三錢
竹 茹三錢 白 芍一錢

用法：水煎服。

治驗：楊劉氏，女，五十二岁，铁路家屬，患上述病症，經服此藥而愈。

按：此方皆为寒凉之品，故对治疗因热而头疼者，效果良好。

(六) 头疼內服方

保定市光华路联合診所中医李繼曾介紹

来源：自創方。

主治：中风不語，歪痹不遂，痰火內发。

处方：沙 参三錢 扁 豆六錢 桔 梗二錢
鈴 羊三分 桑 枝三錢 当 归三錢
苏 木三錢 橘 紅二錢 桂 枝二錢
南紅花二錢 絲瓜絡二錢 龙胆草一錢
天竺黄三錢 南 星錢半

用法：水煎服，早晚各服一煎。

治驗：彭樹挂，男，六十岁，住光华路。一九五七年患中风症：舌蹇、神昏、右半身不遂，以此方服七剂而愈。

常老太太，七十四岁，住永华北路。患中风症：昏睡四日，右半身不遂，服此藥十八剂而愈。

按：此方治中风輕症，半身不遂以及痰火內发之病均有效。

(七) 治白头发方

保定市秀水胡同联合診所呂扶周同志介紹

来源：民間驗方。

主治：少年白头发。

处方：黑芝麻一升 大 枣一斤（去皮核）

制法：以上两味用淨布各包好，經九蒸九晒，將枣去皮

核，搗烂成泥状，拌入黑芝麻食之。

用法：一日服二次，每服三錢。

治驗：此方系由友人紀文白传授，中苏友好协会馬主任之父在时为医，曾以此方給其女治疗白头发，將藥服完后，其发尽黑，并与其他患者数人如法治之亦然。此系馬主任之母所述。

按：黑芝麻甘温、填精、益髓、补血、暖脾、烏鬚、黑发。大枣温中益气，故用二藥烏鬚、黑发有效。

二、瘟瘧方类(共二方)

(一) 瘟瘧內服方

保定市大阳村联合診所中医田立堂介紹

方名：达源飲。

来源：选自瘟疫論方。

主治：瘟疫及瘧疾。

处方：檳榔二錢 厚朴錢半 草果仁五分
知母二錢 白勺二錢 黃芩二錢
甘草一錢

用法：水煎服。在瘧疾发作前二小时服之。連服二剂即不再发。

治驗：保定市下閘村王惠，男，三十四岁，患瘧疾六个月，連服二剂全愈。

(二) 清热解毒內服方

保定市永华南路二十四号中医王培之介紹

方名：解温消毒飲。

来源：选自李东垣普济消毒飲加减方。

主治：乍腮。

处方：薄 荷三錢 連 翹五錢 桔 梗五錢
黃 芩四錢 川黃連二錢 元 參五錢
馬 勃三錢 陳 皮二錢 甘 草二錢
僵 蚕三錢 板 蘭根五錢 山 茨 菇五錢
犀 角二錢 蒲 公 英一兩 地 龍三錢
銀 花八錢

制法：把藥投入煎器內，添水以泡過藥為度，煎至一大茶杯。

用法：飯前空心服下，若加生石膏時，須先煮石膏數沸再下它藥。

一般服藥后隔五、六點鐘腮腫疼痛漸輕，并思飲食，連服三至五劑即能全愈。

治驗：據供方人談，余族侄王同臣，年三十九歲，于七月間患乍腮，漸至頭頸部，鼾睡嗜臥不思飲食。經中醫治療投以荊芥敗毒散不見功效，他醫又投以普濟消毒飲原方，仍無效力。病勢嚴重，昏臥嗜睡，不進飲食，頭部腫大延及項頸胸等部，由耳后通項達腋下起一瘻管化膿，一用手按兩端膿出，勢甚危險，經其內兄在南謝村請來醫生，投以此方連服五劑全愈，沒有后遺症。余即將此方記下加以整理。余甥女王瑞芙，于同年八月初也患腮腺炎，余即投以此方二劑全愈。一九五六年給保定女中學生張葵珍治療腮腺炎，一劑即愈。一九五七年十二月給永華南路二十三號王成林治療腮腺炎，服此方三劑全愈。

按：此方系王大夫在臨床會診時得來，并又經親自使用，效果良好，因此方皆為清熱解毒之品，故對時疫腮腫確有良效，但其方劑系成人量，小兒宜酌情減量用之。

三、眼病方类(共七方)

(一) 洗眼方

保定市西大街中医周志宏介绍

方名：洗眼藥方。

来源：自創方。

主治：暴发火眼，目生星翳，白膜遮睛，赤脉貫瞳，烂弦羞明。

处方：硼砂一錢 胆凡五分 明矾五分
川連一錢 枝子一錢 防风一錢
川羌活一錢 西紅花五分 当归二錢
杏仁七粒 麩仁一錢 秦皮一錢
海桐皮一錢 杭菊一錢 甘草一錢
蘆甘石童便浸煨。

制法：共为細末，水合为球，大如母指，用絲綢将藥球包好。

用法：开水冲泡藥球，洗眼。

反应：洗时微有刺痛，洗后热泪流出，經五、六分鐘后則覺快感。

治驗：蠡县城內齐二立，十八岁，农民，患气火蒙睛，三日則白睛如絮，黑睛已成白色，至十余日后則黑睛上起黑泡，高出睛外，二目失明，至半月后轉經我治，內服洗肝散、导赤散，外用洗藥，初洗不覺刺痛，洗至第三日微有痛覺，至第五日夜間洗后，眼睛大痛，微有破烈声，病者大惊，以为瞳仁破裂，覺有水液流出，又片时則痛止，暈然入睡，至天明醒后，則見窗上阳光。共服藥二十七剂，洗藥三十粒，計二月全愈。

按：此方系驅風、活血、清熱之品，故对治疗暴发火眼，

烂眩羞明等症有效，但黑睛发白怕光，刺痛流泪者不可用。

(二) 内服方

保定市东大街中医戴月舫介绍

方名：蟹睛饮。

来源：经验方。

主治：黑睛突出，形象黑豆疙瘩名为蟹睛症。

处方：杭 勺四钱 元 参三钱 生 地三钱
寸 冬四钱 川 芎一钱 石 斛一钱
黄 芩二钱五分 焦枝子一钱 石决明四钱
车前子三钱 五味子五分

用法：水煎服。

治验：赵淑云，女，十七岁，患左眼黑睛突出如豆，服此药而愈。

按：瞳人涨大是肝虚肾热，瞳孔缩小，为肝热肾虚，此蟹睛症当属肝肾之热症，此方多为清肝凉血泻火之品，故用之有效。

(三) 治瞳孔散大内服方

保定市裕华东路联合诊所中医张元衡介绍

来源：祖传经验方。

主治：瞳孔散大。

处方：熟 地三钱 白 芍三钱 当 归三钱
川 芎钱半 杞 果三钱 五味子二钱
兔丝子三钱 山萸肉三钱 天 冬三钱
寸 冬三钱 盐黄柏三钱 盐知母三钱
粉丹皮三钱 泽 夕三钱 菊 花三钱
草决明三钱 青箱子四钱 薄 荷一钱

用法：清水煎服，每日早晚各服一煎。此方用于成人量，早期治疗有特效。

禁忌：鷄、魚、羊肉及辛辣之物。

治驗：王棟材，男，三十二岁，滿城县小許成村人。症狀：患病瞳孔散大，双目失明稍有一綫之光，一月有余，經中西醫治療不效，后經張大夫治療用上方服四劑見輕，連服二十余劑全愈。

劉煥子，女，十六岁，滿城县上紫口村人，患瞳孔散大双目失明五、六個月。經中西醫治療不愈，后来保定，經張大夫用上述良方四、五劑見效，二十余劑全愈。

陳全昆，女，三十岁，住保定市南白衣庵三十一號，右目抽搐難睜，瞳孔散大，視力減低一月有余，屢治不效，經服此方四劑見效，十劑而愈。

按：據張大夫談，自行醫以來，用此方治療瞳孔散大一症，无不神效。惟方中所用之青箱子、草決明二味却系瞳孔散大之禁藥，但因張大夫是祖傳眼科，又有病歷記載，故而介紹以供參考。

(四) 眼科內服方

同前方

來源：祖傳經驗方。

主治：眼睛紅腫疼痛，目生云翳。

處方：

生	地三錢	赤	芍三錢	黃	芩三錢
焦	梔二錢	當	歸三錢	川	芎二錢
荆	芥錢半	防	風錢半	連	翹三錢
銀	花三錢	胆	草三錢	木	賊二錢
蟬	退二錢	疾	藜三錢	川	軍三錢
薄	荷三錢	車	前三錢	布包	

用法：水煎服，每日早晚飯后各服一劑。此方系成人量，一般小兒酌減。早期治療有特效。如大便不燥者，去川軍加黃連二錢。

禁忌：鷄、魚、羊肉及辛辣之物。

治驗：刘全节，男，二十八岁，住保定市西关南一胡同四号。左目因外伤引起白珠紅赤，黑珠生翳，头眼疼痛，胞肿难睜，稍有光明。于一九五五年在通县医院治疗一星期无效，又在北京同仁医院住院治疗一月未愈，后回保在市立一院治疗数日亦无效，又介紹到河北医学院治疗亦无效，此时病人疼痛难忍，飲食少进。用上方数剂痛止，飲食增加，連服二十余剂，病得全愈。

王迈庆，男，三十七岁，住保定市西关新华路十一号。于一九五六年五月間患二目紅赤生翳如綠豆大一片，用上方三剂全愈。

李洛杰，女，三十四岁，系容城县小里村人。患左目黑珠生翳已失明，左目紅赤生翳稍有光明，經河北医学院检查系角膜潰瘍，治疗数日无效，后服此方十剂全愈。

按：张大夫系祖传眼科，在临床治疗眼科是有良好成就，治愈眼科大症甚多，此方藥物多系清热散风去翳之品，故对暴发火眼，眼球紅赤生翳有效。

(五) 远視眼內服方

保定市体育場街中医沈筱斋介紹

来源：自創方。

主治：远視眼。

处方：人 参二兩 茯 苓二兩 菖 蒲一兩

远 志一两制

制法：以上共为細面，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。

用法：每服五十至七十粒，米湯送下。

(六) 近視眼內服方 保定市体育場街中医沈筱斋介紹

来源：自創方。

主治：近視眼。

处方：生 地四兩 天 冬二兩 菊 花二兩
积 壳二兩面炒

制法：共为細面，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每服百丸，清茶或黄酒送下，常服之。

按：此二方系沈大夫早年常用之有效方剂。因近年来未曾使用，故沒有病历記載。但此二方藥性平稳，患此症者可試用之。

(七) 云朦眼方

保定市小車乡水碾头保健站中医刘国兴介紹

来源：东北民間驗方。

主治：云朦眼（眼珠被白膜遮盖視物暈花）。

处方：川黃連五分 冰 片五分 台 射一分
牛 黃三厘 礞 砂四分 熊 胆三分

用法：共为极細面，用磁瓶貯藏，勿令泄味，用骨簪沾蒸餾水少許，然后再治藥面擦患处，每晚上一次。

反应：上此藥后有烧灼的感觉，但无甚妨碍，經上二、三次盾云翳发紅色即停藥。待一、二日再繼續上藥，随上随薄，照上法連續上藥，以达到痊愈为止。

治驗：在一九五四年，肇州城西北郑大庄郑姓妇女，左目被云翳遮朦大半，上此藥一料云朦全消。

按：此方对治疗病后或眼疾后期而遺留的云翳甚效。但对初得之眼疾如暴发火眼虽有云翳亦不可用。

四、鼻衄方类(共三方)

(一) 鼻衄不止外用方

保定市小紀家胡同中医王画屏介紹

来源：民間驗方。

主治：鼻衄不止。

处方：驢糞燒炭五分 血余炭二錢

用法：共為細末。每次用少許吹入鼻孔內。

治驗：郭村某某男性，在車站飯館工作，于五月間患衄血，出血甚多，約有一碗，經用此藥吹入鼻中少許即愈。

(二)鼻衄外用方 保定市北街聯合診所中医張樹棠介紹

来源：民間驗方。

主治：衄血。

处方：代鬚大葱十個。

用法：將大葱搗爛如泥，攤在青布上。貼在腳心，右鼻出血貼左，左鼻出血貼右，兩鼻孔出血，貼兩個腳心。貼十分鐘左右，其血即止。血止後，急將青布揭下，以免腳心起泡。

治驗：張洛四，男，二十四歲，住保定市北關，因患咽喉腫疼，經手術後，鼻出血不止，用此法即愈。

按：葱能止諸般出血，且此方妙在能引熱下行，故能止血。大葱到處皆有，很適合于廣大農村使用。

(三)鼻衄血內服方

保定市秀水胡同聯合診所呂抹周同志介紹

来源：民間驗方。

主治：鼻出血。

处方：鮮刺兒菜二斤（如無鮮的用干刺兒菜二斤亦可）

制法：將菜切碎，用消毒粗布包好，將汁擠出，干者水煎取汁。

用法：每服約普通飯碗一碗，一次冷服可立止出血。

治驗：保定市省府前街紀文白，少年時患鼻出血，服其他止血藥無效，後由山東傳來此方，服一劑而愈。

按：按刺兒菜(大薊)，性甘無毒，功能涼血散瘀退熱止血。凡因血熱妄行，或瘀滯日久，而忽溢血者，服此藥熱退血涼，則血可周流不滯，而無崩衄吐溢之患。但對脾胃虛寒，不思飲食，或瀉泄者，不可妄用。

五、牙疼方類(共六方)

(一)風火牙疼外用方

保定市永華北路聯合診所中醫嚴松林介紹

來源：友傳驗方。

主治：牙齦紅腫，嚼物疼痛，風火牙疼。

處方：防 風一錢 白 芷一錢 川 椒三錢
細 辛二分 鶴 虱二錢 生石膏三錢

用法：以上六味，用水兩杯半，煎至兩杯，漱口用，一日三四次，勿咽下。

反應：如誤咽下，可發生頭疼。

治驗：本市衛生局門診部章漢杰等，患牙疼用此方漱之，疼止而愈。

按：此方為清熱散風殺蟲之劑，水煎含漱，直達患處，故見效迅速。

(二)火牙疼內服方

保定市秀水胡同聯合診所呂扶周同志介紹

來源：民間驗方。

主治：火牙疼，牙齦腫疼。

處方：生鴨蛋一個 白 糖三兩 香 油二兩

用法：將鴨蛋打破，和白糖，香油調勻，服下，輕者一

次，重者二次，即愈。

按：此方为保定市民間流传很久的有效驗方，藥性甘寒滋阴、清热、潤燥，性平无毒，患火牙疼者用之最宜。

(三)风火牙疼內服方

保定市北大街联合診所中医景雅斋介紹

来源：选自真方彙录。

主治：风火牙疼，不論新久虚实上下，服之皆可立愈。

处方：生石膏一两 大生地五錢 北細辛一錢

生甘草一錢

用法：用水二茶碗煎剩一碗，温服，入口內少含片时再咽下，輕者一剂，重者二剂而愈。但体質弱者，可分作二剂服，老人及兒童，尤須少服。

治驗：保定市金庄王洛玉，男，四十五岁，患火牙疼，不能飲食，服此藥二剂痊愈。

按：按此方清胃凉血，兼散风热，故对治疗风火牙疼有效。

(四)虫蛀牙疼外用方

保定市唐家胡同中医王汉臣介紹

来源：家传驗方。

主治：虫蛀牙疼。

处方：防风 白芷 川椒 細辛各等分

用法：水煎后，俟温再加白酒一两，含漱用，勿內服。

治驗：保定市胜利胡同二十四号张蒔义，女，四十五岁，患虫蛀牙疼，用此藥一付即愈。

(五)风火牙疼內服方

保定市穿行楼南街五十七号中医李海濂介紹

来源：选自驗方。

主治：风火牙疼。

处方：元参 丹皮 薄荷 生地各三錢

用法：水煎服。

治驗：据李大夫介紹用此方曾治愈多人，今仅举二例介紹如下：1. 深县礼門寺村李占詳，一九二四年患风火牙疼，痛不可忍，多方求治无效，用此方一剂見輕，两剂痊愈。2. 深县一区馬明克(深县名医)于一九二五年患风火牙疼，經服它藥无效，后服此方三剂全愈。繼經馬明克大夫試用多人，証明效果良好。

(六) 牙齒外敷方

保定市西大街中医周志宏介紹

来源：民間土方。

主治：牙疼連腮肿，牙槽风肿疼。

处方：土蜂窩不拘多少。

用法：研为細末，醋調抹于腮际疼处，干后脫落再抹。

治驗：蠡县北大流村崔进保，长期患虫蛀牙疼，半面肿胀，用此法治愈，后隔一年又牙疼，再塗三次全愈，至今六年未犯。

六、咽喉方类(共四方)

(一) 咽喉吹藥方

保定市北大街中医郭英銓介紹

方名：喉疼散。

来源：馮海泉經驗方。

主治：咽喉口齿肿毒碎烂，音哑咽痛等症。

处方：冰 片一錢半 硼 砂六錢 辰 砂二錢
牛 黃一厘

用法：共为細末，吹喉中，一次用一分，一日吹三次。

治驗：邯鄲市孙宝山，男，三十五岁，滿口糜烂，咽喉

疼痛，用此散五天全愈。

按：此方乃外科医宗所载之冰硼散（冰片五分硼砂五錢玄明粉五錢朱砂六分）变化而来，二方所治相同。惟此方妙在去玄明粉加牛黃，其效更著，故而介紹試用。

（二）咽部吹藥方

保定市市府前街三十八号中医賈維煥介紹

来源：經驗方。

主治：咽部紅肿疼痛。

处方：白矾 蛇退各不拘多少 冰片二錢

蚕茧二十对（雌雄为一对，雄的一头尖，雌的两头圓）

用法：将白矾装入蚕茧內以蛇退堵口，用炭火烘焦研面，加入冰片再研极細面吹嗓子內。

治驗：保定市杜家胡同五号王文生，男，二十三岁，咽喉肿疼，用此藥吹之，当时見效，用藥三日全愈。

按：此方白矾酸寒清热治喉痹，蛇退咸甘平无毒烧之疗諸恶疮喉风，蚕茧甘温无毒疗諸疳疮，故对喉部肿痛有效，再加冰片散火通窍，其效尤著。

（三）咽喉吹藥方

保定市东大街联合診所中医刘仲瑄介紹

方名：吹喉立效散。

来源：經驗方。

主治：急性咽喉諸症（扁桃腺炎口腔喉头炎）。

处方：石 青一两 青 黛一两 硼 砂一两
胆 矾五錢 人中白煨五錢 元明粉五錢
冰 片三分 山豆根二錢 牛 黃少許

制法：共为細面，磁罐收貯，塞口不要透气。

用法：每次用一、二厘，吹入患处立效。

按：此方藥物多屬寒涼，故對急性喉症紅腫疼痛者，有效。

(四)喉症內服方 保定市銀定庄鄉保健站中醫李棠介紹

方名：喉症活命湯。

來源：選自白喉忌表抉微。

主治：白喉單雙乳蛾，乍腮。

處方：生 地一兩 元 參一兩 薄 荷二錢
葛 根二錢 生石膏八錢 生梔子三錢
連 翹三錢 銀 花一兩 生白芍三錢
板蘭根三錢 馬斗苓三錢 寸 冬三錢
括 蕒三錢 生甘草三錢 生大黃三錢

用法：水煎服，早晚各服一煎，但病情嚴重者，每日須服二至三劑方效，以上系成人量；年幼體弱者，可酌情減量，但喉癢者去葛根，便溏者去大黃。

治驗：王潤清，男，四十二歲，本市銀定庄村，務農。一九五六年五月感染咽喉腫爛，雙乳蛾腫大，左右乍腮，腫大如碗，疼痛，高熱惡寒，嘔吐，食水不下；全身疼痛，經治療七日服藥五劑痊愈。

張秀蘭，女，三十七歲，本市朱家堤村人，家庭婦女。於一九五七年十二月間患病——疑似白喉。咽喉布滿白塊、白條，發病急促，三小時後，咽喉疼痛厲害呼吸困難，發燒發冷，全身疼痛，因患者懷孕八月有餘，因受家庭條件限制，拒絕送院治療。繼用此方治療，一晝夜連服三劑，即行好轉，又服藥二劑五日愈。愈後良好，胎兒按期降生。

李道民，男，三十九歲，本市尙庄村人，務農。一九五七年，三月感染雙乳蛾疾患（扁桃腺腫大），咽喉全部潰爛疼痛，高熱惡寒，食水不能下咽，頭痛身疼，呼吸困難，干

噦。經服藥三劑，三日痊愈，愈后良好。

按：此方乃神仙活命飲加減而來，方中所用之藥多為辛涼清熱解毒之品，故對喉初起，或誤服表散及禁忌之藥，而造成的壞症有效。但因此症危急，用時須請醫生指導，以期安全。

七、骨哽方類(共二方)

(一)骨哽外用方

保定市西大街中西醫聯合診所中醫張幸愚介紹

方名：橄欖散。

來源：選自驗方新編。

主治：鷄骨魚刺哽阻咽喉。

處方：橄欖核一兩 梅 片五分

制法：先將橄欖核焙焦研細面，再加冰片合研即成。

用法：每次用一分吹患處，三十分鐘骨即軟化疼止，一次不效者再次，最多不過三次即愈。

治驗：治好病人很多，未作記載，主要由我個人體驗特效。一九五四年，因食雞肉卡住咽喉，疼痛萬分，它藥無效，用此散吹二次痊愈。

按：據供方人亲身体會效果良好，故推廣試用。

(二)骨哽外用方

保定市永華南路中醫李學謙介紹

來源：民間驗方。

主治：魚骨哽阻。

處方：大 蒜一瓣 白 糖一匙

用法：以生大蒜一瓣，由橫捏斷，塞入鼻孔，勿令透氣，再將白糖一匙，乾咽勿飲水，如不效再咽白糖一匙自愈，

治驗：此方曾治愈多人，惟不記姓名。韓壽臣大夫之義

女，以魚骨哽阻咽喉，肿痛万分，用此法而愈。

按：此方系民間驗方，簡單易用，有益無損，故介紹試用。

八、哮喘方類(共三方)

(一)哮喘內服方 保定市永華北路中醫于宗堯介紹

來源：自創方。

主治：咳嗽痰喘。

處方：麻黃六兩 杏仁四兩 石膏五兩
甘草四兩 陳皮一兩 蘇叶一兩

制法：共為細末，煉蜜為丸，每丸三錢。

用法：每天早晚各服一丸。

按：此方乃張仲景之麻杏石甘湯加味，在保定德生堂老藥鋪出售多年，群眾反應效果良好，故而介紹，但氣虛體弱者慎用。

(二)哮喘內服方 保定市永華南路中醫李學謙介紹

來源：民間驗方。

主治：咳嗽痰喘。

處方：甘草一錢 桔梗二錢 前胡二錢
陳皮錢半 赤芍二錢 貝母三錢
橘紅二錢 茯苓二錢 蘇子一錢
白前二錢 桑白皮二錢 法半夏二錢
旋復花錢半 百部草二錢 姜竹茹一團

用法：水煎服。

治驗：于景明，年七十二歲，住永華南路七十一號。患痰喘多年，百治無效。後經余用此方調治，三劑而愈，至今數年未犯。倘遇此証，切勿輕視，每遇患者，按方加減，无

不奇效。

按：前胡，复花清痰火实结，芩夏渗湿燥痰，桑皮川貝橘紅除痰利肺，苏子降气，故对痰喘咳嗽之实症有效。

(三)痰喘內服方

保定市西大街中医周志宏介紹

方名：百花膏。

来源：师传。

主治：肺虛热久咳嗽痰喘。

处方：冬 花一两 百 合一两 桑 皮五錢
知 母五錢 二 冬八錢 花 粉四錢
川 貝五錢 杷 叶五錢 蕁 仁五錢
苏 子五錢 萊菔子五錢 桔 梗四錢
橘 紅四錢 黄 芩四錢 蜂 蜜三斤

制法：共为細面，将蜜炼至滴水成珠，离火下藥，調勻入罐备用。

用法：每日三次，每次服一匙，口含化細咽，不要飲水。

治驗：据供方人談，用此方治愈甚多，仅举典型一例。如徐水县龙化村姐冠华，女，二十二岁，素有喘疾，因产后失調成癆，咳吐脓血一年余，經注射連霉素三十余針不愈，来保后用此藥两剂全愈。

按：冬花消痰、理肺，能治肺痛、肺萎、咳吐脓血。百合甘淡利肺，除热主久咳不已。桑皮則能泻火除痰。二母清肺止咳。花粉生津。杷叶清肺。蕁仁、苏子、卜子墜痰下气。桔梗、橘紅开肺气而化痰涎。黄芩解热，蜂蜜潤燥。故对治肺虛劳嗽而兼热者有效。

九、咳血方类(共四方)

(一) 痰中带血内服方 保定市东大街中医戴月舫介绍
来源：民间验方。

主治：久嗽午后发热体倦，痰中带血。

处方：蛤 蚧一对，白 梨四个 核桃仁二两
冰 糖四两 鲜 藕一两

用法：以上诸药共捣烂蒸熟，分四次吃完。

治验：吕金鉴，男，三十二岁。患肺病吐血后，继而痰中带血，午后作烧，身体困倦，经医院检查为肺结核，后服此方而愈。

按：蛤蚧白色入肺，主虚损痿弱，喘嗽肺萎，核桃潜精固气，梨藕能清痰止嗽，故对肺癆有效。

(二) 痰中带血内服方

保定市南关联合诊所中医孙锡九介绍

来源：祖传验方。

主治：劳伤过度，咳嗽，痰中带血。

处方：鲜白萝卜四两 蜜一两 黑 豆四两
香 墨一钱 童便一盅

用法：水煎一次服。

治验：保定市南关大街侯鸿祥，五十余岁，数年前因劳伤过度，患咳嗽痰血，服此方二剂痊愈。

按：此方系孙锡九大夫祖传良方。据其临床经验，证明治劳伤过度，而致吐血效果良好，此方药味虽属平常，确有润肺止血补虚之功，故对治疗吐血有效，胃出血尤效。

(三) 肺痛咳吐血内服方

保定市北街联合诊所中医张树棠介绍

方名：肺癰膏。

来源：师传效方。

主治：肺癰；咳吐脓血。

处方：馬齒莧汁二斤(即馬苧菜) 眞蜂蜜四两

制法：將鮮馬苧菜去根洗淨，勿帶水搗爛取汁二斤。如無鮮的，可用干馬苧菜二斤洗淨，煎沸擰汁二斤濾淨。將蜜煎沸去掉上層的腊質，然後共用微火熬成膏狀。

用法：每服二錢，日服三次，飯前白開水沖服。

反应：服藥一周內可能生紅色皮診，一二日內即消失無妨，肺癰症服後常致咳嗽增劇，但至第二周逐漸輕快，飲食增加。

禁忌：孕婦忌服，忌食韭菜、花生、羊肉。

治驗：保定市達五道廟六號許金山，男，四十二歲，患咳嗽吐浓狀臭痰已數年，經服本方三劑而愈。

按：馬齒莧酸寒無毒，能瀉熱祛風散血解毒，故對治療肺癰有效，而且此藥遍野皆有，群眾都能認識，簡而易得，實為良方。

(四)痰中帶血內服方 保定市體育場街中醫沈筱齋介紹

来源：家傳驗方。

用法：男、女老幼痰中帶血。

处方：五靈脂細面 狗胆汁

服法：以上二藥和為丸，如芡實大，每次一丸，黃酒送下。

十、吐血方類(共二方)

(一)吐血內服方 保定市永華北路中醫陳洪海介紹

方名：六子湯。

来源：武術家傳授。

主治：大口血不止，神昏，四肢无力。

处方：天冬一錢 寸冬一錢 百合一錢
橘紅五錢 桑皮一錢 生地一錢
熟地一錢 五味子一錢 骨皮五錢
貝母六錢 知母六錢 阿膠一錢
陳皮一錢 鷄子六個

用法：以上諸藥共入砂鍋內，水煎數沸，去渣飲之。渣再煎服，共服兩煎后，再把鷄子食完，輕者三四劑，重者五六劑全愈。

禁忌：忌烟酒百天。

治驗：一九五七年七月間，西關光華路三十六號王文良，男，三十三歲，因蹬三輪車用力過度，大口吐血不止，服此方五劑全愈。

（二）吐血內服方

保定市穿行樓南五十七號中醫李海濂介紹

來源：選自中醫指南驗案。

主治：大口吐血。

处方：杭 芍三錢 玉 金 打二錢 降真香二錢
側柏葉炭二錢 花蕊石打二錢

用法：清水兩茶碗，熬剩多半茶碗，徐徐飲下。

禁忌：忌服辛辣食物。

按：此方系李大夫選自中醫指南驗案，屢驗屢效，后又經衡水劉立之大夫試驗，証明此方對治療脈大唇紅之大口吐血，效果良好，故選而介紹。

十一、噎食方類（共二方）

（一）噎食內服方

保定市东大街中医戴月舫介绍

来源：民间验方。

主治：噎食。

处方：鷄食醴一兩 水 銀一分 硫 黃一分

制法：白色公鷄數只，餓不令食，俟其腹中所存之屎拉盡時，將蛇切成碎塊喂之，若不吃強喂，而後將所拉之屎收起晒干。

取一兩放在沙鍋內，焙黃研細面，再加水銀、硫黃共研之，以不見水銀星為度，貯瓶內備用。

用法：一日三次，每次服二錢。因其腥臭難吃，可裝膠囊服用。

治驗：據供方人談，其弟子張尙信，男，四十歲，滿城縣石莊人，在張家口當醫生，於一九五六年患噎食，久治不愈，羸瘦不堪，經醫院檢查確診為食道癌瘤，自謂必死，因而棄醫回籍。後經服此方一劑而愈，並回張家口工作，至今未犯。

按：此症多因氣血虧損，復忧思悲恚致使脾胃受傷，血液枯槁，氣郁生痰，痰塞而不通則氣上而不下，阻碍道路飲食難進，治法頗難，因欲健脾理痰，有妨津液，養血生津，有碍中洲；虽有養血溫補之法，但治愈者甚為罕見。今用此方，治愈噎膈一症，虽此一例，但其效頗著，故而介紹。希用此方者，將治療結果函告本會，以便進一步整理推廣。

(二)噎食內服方

保定市西大街聯合診所中醫師于贊臣介紹

方名：噎食神效散。

来源：民間效方。

主治：噎食。

处方：生姜不拘多少。

制法：于五月五日午时，用布袋将生姜包好，埋于不見天日之东厕內，过四十九日后取出，除去秽物，悬于空中，阴干为細末。

用法：病經二年服姜末三分，一年者二分各加射香三厘，白水冲服，只服一次，服后勿令吃飯，預先飲米湯一日；次日可食少量稀粥，五日后漸恢复正常飲食。

禁忌：忌食暈腥盐酱五十天，則永不再犯无反应。

十二、胃疼方类(共五方)

(一) 胃疼內服方 保定市杜家胡同中医賈舜卿介紹

方名：胃疼散。

来源：自創方。

主治：胃寒疼、酸疼、胃气滯疼。

处方：公丁香一两 油桂 广木香各二两 苏打粉一磅

制法：共为細面，貯瓶待用。

用法：疼时服二錢白开水送下。

治驗：前在医院时，鉄路职工患胃寒疼者数百人，服用此方皆驗。

吳振远，男，六十七岁，永华北路联合診所，胃疼服愈。

曹振山，男，四十岁，西大街联合診所，胃疼多年服愈。

按：方中之藥具有舒气、止痛、祛寒、和胃、寬中导滯之作用，故对郁悶、气滯受寒、停食所引起之胃疼、胃酸、呕吐、胀滿等症有效。

(二) 胃疼內服方

保定市永华北路联合診所中医严松林介紹

来源：經驗方。

主治：胸膈胀滿，头晕疼，飲食后吐黃水或綠水。

处方：半 夏三錢 陈 皮二錢 川 朴錢半
茯 苓三錢 炒白芍三錢 当 归三錢
焦梔子二錢 黄 芩二錢 二 丑炒三錢
甘 草一錢 砂 仁錢半

用法：水煎服。

治驗：解爱茹，女，四十八岁，清苑县人，患此症二年，久治不愈，服此方三剂即愈。

刘玉秀，女，五十六岁，徐水县人患此症二年，服三剂而愈。

刘佩华，女，三十三岁，住永华北路，久患此症，經服此方五剂而愈。

按：此方对脾湿、肝郁所引起之胸膈胀滿、头晕疼、食后吐黃水或綠水等症有效。

(三) 胃疼內服方

保定市大阳村联合診所中医田立堂介紹

来源：經驗方。

主治：胸滿胃疼或虫疼。

处方：厚 朴二錢 榔 片二錢 陈 皮二錢
烏 梅二錢 山 查二錢 甘 草一錢

用法：水煎服，十岁左右兒童減半。

治驗：保定市大阳村，魏老儒爱人，四十岁，久患胃病，疼时剧烈，服此藥二剂痊愈。

按：此方具有調气、寬胸、驅虫之功，故对治疗胸滿胃疼、虫疼有效。

(四) 胃疼內服方

保定市秀水胡同联合診所李鳳岭同志介紹

来源：择自医書效方。

主治：治九种胃气疼。

处方：五灵脂二錢 公丁香四分 明雄黃四分

巴豆霜四分 白胡椒四分 广木香四分

紅 花二錢 枳 壳二錢

制法：以上八味，共研細面，收貯磁瓶备用。

用法：每服三厘，置乎心中以舌舐之咽下，一小时内勿飲水，发作时服特效。

禁忌：熱疼、大便溏者忌服。

治驗：邻居亲友服此藥治愈者不計其数。

按：此方治疗胃气疼有效。但是久病及妇女經期和孕婦之胃疼患者禁用。

（五）呃逆內服方

保定市小車乡水碾头保健站中医刘国兴介紹

来源：自黑龙江省肇洲县中医联合診所得来。

主治：呃逆（西医名橫膈腹痙攣）連声不已。

处方：丽 参三錢 白 术五錢 云 苓五錢

陈 皮一錢 丁 香一錢 海南沉二錢

牛 夕三錢

用法：以上七味水煎服，重煎二次，空腹服用。

禁忌：懊怒。

治驗：此方据肇洲县中医联合診所刘喜元大夫談：治呃逆百发百中。我自得此方，也治愈很多患者。如黄花村一位姓宋的老太太，年届六十二岁，呃逆苦悶万状，連声不已，經用此方一剂痊愈。

十三、腹疼方类（共二方）

（一）腹疼內服方

保定市东大街中医戴月舫介紹

来源：民間驗方。

主治：腹中有痞块，腹疼发胀。

处方：漚鷄屎如酱样不成块的。

制法：将鷄屎用沙鍋焙成焦黄色，共为細面。

用法：每服二錢，紅糖黃酒冲服。

治驗：荷柱兒，男，二十岁，保定市段望村人，患腹中痞块硬疼发胀，經中西医久治不效羸瘦待毙，服此方而愈。

滿城江城村李某患腹中痞块、胀疼，久治不愈，服此方而愈。

按：戴月舫大夫介紹此方与金匱鷄矢醴治腹滿鼓胀之意相同，且鷄善食毒虫，屎乃毒虫所化，有以毒攻毒之妙，故用之有效。

（二）腹疼外用方

保定市西关联合診所西医邢振河介紹

来源：民間驗方。

主治：腹內痞块。

处方：梔 子七个 皮 硝二錢 鷄 蛋一个
飞罗面一撮 蜂 蜜适量 大 葱三寸带須
青 布一块 大 枣七个去核

制法：将上藥搗烂，以鷄蛋去皮合蜂蜜而成膏。

用法：摊在青布上，貼敷患处，三日一換，数次即愈。

按：此方有軟坚、清热、通阳、活血之功，故治痞块有效。

十四、吐瀉方类(共三方)

（一）吐瀉內服方

保定市北大街联合診所中医景雅斋介紹

方名：卫生防疫宝丹。

来源：选自衷中参西录。

主治：时疫、霍乱、转筋，上吐上泻、肚疼、伤热中暑、头目眩暈、恶心呕逆，积食不消、食后悶倦、卒中昏倒、心气不舒、神經錯乱、关窍不通、一切暑热之症，无不立愈、治腸胃炎其效尤著。

处方：辽細辛細末一兩半 粉甘草細末十兩

白 芷細末一兩 卜荷冰四錢 朱 砂五兩

梅 片二錢

制法：先将五味藥和勻，用水泛为丸，晾干，不宜日晒，再用朱砂为衣，装入布袋闔光。

用法：每服一至二錢，白水送下。

平素口中含化，預防疫癘，一次服四至五粒。

按：衷中参西录一書，系名医張錫純大夫所著，此方是他一生經驗良方。經景雅齋大夫選用后屢治屢效。据北大街联合診所張樹棠大夫談，由于此方疗效显著，每年夏季銷藥三十余斤，治愈患者不下数百人，确有推广的价值。

(二) 霍乱內服方

保定市东大街联合診所中医刘仲瀛介紹

来源：安新县潘齡皋传。

主治：霍乱吐泻，絞腸腹痛。

处方：紫油桂一錢 麝 香一分 硫 黃一分

丁 香一錢

制法：共为細末。

用法：如遇此症撒肚臍上，用暖臍羔盖好。以上之藥每人能用八九次，用后腹內覺有通和，其疼即止，吐泻亦随之轉輕或即愈，无反应。

治驗：余在安新县每年預备，用之有特效，治愈人甚多，病历并无記載。

（三）治黎明五更泄方

保定永华南路五十一号中医申道安介紹

方名：坎中丹。

来源：选自衷中参西录。

主治：黎明五更泄久則令人衰极，腰部冷痛。

处方：純硫黃一两 赤石脂一两

用法：以上二味共为細末。飯前早晚各服一次，每服五分，白开水送下，服后以感溫暖为度，倘无上述感觉，即加大服量。加至有上述感觉即不可再加。

治驗：曾用此方，給三人进行治疗，都已痊愈。

楊树棠的母亲六十七岁，住本市东大街一四六号，其人形容憔悴，面包蒼黃，削瘦，面帶冷象，患此病三十余年，近日病情轉重，日泻十余次，一直未曾治好，身体虛极，自去年十一月三日起，日服此藥二次，每次服五分加至一錢，繼續服藥四个月，終于痊愈。

樊段臣，男，六十七岁，西大街一一八号，照前面方法服用此藥，黎明泄得愈。

张錫亭，男，五十四岁，城南白团村人，臂寒腰腿寒痛，尿頻浊，脉两尺沉迟，服藥两月痊愈。

按：此方为衷中参西录张大夫經驗良方，又經申大夫临床应用証明有效，故选而介紹。

十五、腸痛方类(共一方)

(一) 腸痛內服方

保定市唐家胡同八十八号中医边清臣介紹

方名：大黃牡丹皮湯。

主治：腸痛、腹疼按之劇疼（盲腸炎）。

处方：生大黃二錢 芒 硝三錢 桃 仁三錢
牡丹皮三錢 双 花五錢 蒲公英五錢
敗將草五錢 枳 壳二錢 粉甘草二錢

用法：水煎服。

禁忌：已化膿便血者不可用。

治驗：据边清辰大夫談：用此方曾治愈十余人，屢試屢驗。仅举一例，如保定市唐家胡同穆玉霞，女，二十三岁，于一九五七年患腸痛，少腹右側劇疼拒按，体温增高，就診前經省医院检查为盲腸炎，該人因怕动手术前来就診，服此方一剂，次日疼止症消。

按：腸痛之症，有急性慢性两种，維急性者变化甚速，設居僻乡尤为危急，在其初发腹疼不堪之际，如服此方誠可济急。但因此症危急，用时須經医生指导，以免用之不当，发生不測。

十六、阴寒方类(共一方)

(一) 阴寒外用方

保定市秀水胡同联合診所夏节同志介紹

来源：民間驗方。

主治：治阴寒（性交后肚子疼）。

处方：七分漳丹八分矾 七粒胡椒細細研

一分火硝共四味 醋合为丸用手团

男左女右扶膝坐 透汗一身乐安然

用法：令患者盘坐，将团好的药丸，放在臍上，男人以左手，女人以右手扶之，汗出即愈。

治驗：此方是我青年时由穆姓妇女所传，說她的老人得过此症，非常有效，因諄囑传方，简单快当。我虽未亲自試驗过，但据了解，其疗效还是可靠的。故而献出，以供研究实验。

按：此方在民間流传已久，又是被群众所重視之有效歌括驗方，且所用之法，妙在由外达内，以驅寒邪，邪去而阴阳合，阴阳合病則愈。方意吻合，用法可靠，患此症者，可大胆試用。

十七、臟症方类(共七方)

(一) 全身水肿內服方

保定市北大街联合診所中医张树棠介紹

来源：选自医書单方。

主治：全身水肿。

处方：鮮鯽魚一条 砂仁面二錢 甘草面一錢

用法：鯽魚一条，約五六两重者，去鱗腸肚洗淨，將砂仁甘草装入魚腹中，用綫縫好，放在碗內，加水清蒸，不用油盐酱醋，分三次当菜吃。

禁忌：忌盐二十一天（注意此魚一条，可分三次吃，不可或多或少），吃数魚即愈。

反应：尿多。

治驗：滿城小馬坊村赵洛新之妻，四十五岁，患周身浮腫，曾在张家口經中西医治疗数月未愈，于五四年七月来保，

吃六条魚痊愈（张家口医院証明系心脏和肾脏性浮肿）。

按：鯽魚和胃行水，砂仁甘草醒脾調胃和中行气，故对治疗水肿有效，但非峻剂必須連續服用方可奏效。因此方性平，最适合久病体弱之患者服用。

（二）全身水臌內服方

保定市杜家胡同中医賈舜卿介紹

来源：民間驗方。

方名：金蟬散。

主治：水臌（全身水肿按之不起小便不利）。

处方：气蛤蟆一个（腹部鼓胀者良） 广砂仁男用八粒女用七粒

用法：将砂仁納入气蛤蟆肚中，用泥将該蛙裹住，在火上煨紅，取出研細末，黃酒送下，水由小便出而愈。

禁忌：忌盐百日。

治驗：保定市正文閣紙店經理高銀祿的爱人，四十三岁，患水臌：全身肿甚，两腿如桶、腹如瓮、臍突出、股际黄水淋漓，背胸头頸面肿，按之不能即起，小便短少，用湯剂久治不效，認為不救，后用此方一付，一日小便数盆而愈。

按：气蛤蟆医名龟，俗名青蛙、田鷄，甘寒无毒，能利水消肿。砂仁辛温而瀉无毒，消化水谷，散寒飲、消胀、痞，通滯气。兼用黃酒散寒，开瘀消食，通絡之功，其效更速。故对治疗水肿有效。

（三）臌症內服方

保定市玄坛庙街中医赵庆福介紹

方名：臌症散。

来源：祖传驗方。

主治：水臌、气臌。

处方：广砂仁八粒 白豆蔻八个 菜青蛙一个