

Rectification à effectuer dans le polycopié du cours « LES NOMBRES COMPLEXES ».

1. Page 8, proposition 2.2, 1.(b) :

Lire " $|e^{i\theta}| = 1$, $\arg(e^{i\theta}) = \theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$ ".

2. Page 9.

(a) Remarque 3.1 : Lire "**Z** = **1** au lieu de $r = 1$ ".

(b) Exemple 3.1 :

Lire " $z' = \sqrt{2} \left(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12) \right)$ et $z'' = -\sqrt{2} \left(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12) \right)$ ".

- Lire "Pour $x = 0$ on aura $y^2 = -a$ qui n'a de racines dans $\mathbb{R}$ que si $a < 0$, **les solutions de (12)** sont dans ce cas $z' = i\sqrt{-a}$ et $z'' = -i\sqrt{-a}$ ".
- Lire "Pour $y = 0$ on aura $x^2 = a$ qui n'a de racines dans $\mathbb{R}$ que si $a > 0$, **les solutions de (12)** sont dans ce cas $z' = \sqrt{a}$ et $z'' = -\sqrt{a}$ ".

3. page 11.

(a) Lire "Si $\Delta = 0$ alors $z = -\frac{b}{2a}$ est une racine double **de** (17)".

(b) Lire "Si $\Delta \neq 0$, soient δ' et $-\delta'$ les racines carrées de Δ , donc (17) **possède deux solutions** distinctes $z' = \frac{-b + \delta'}{2a}$ et $z'' = \frac{-b - \delta'}{2a}$ ".

Fin.