

E-BOOK · PECUÁRIA A PASTO

Quem planta capim

quer colher arroba.

Da matéria seca ao resultado por hectare: o que a pesquisa e as fazendas mostram sobre as forrageiras híbridas.

Eloir Daltoé · Engenheiro Agrônomo

BARENBRUG

SOBRE O AUTOR

Eloir Daltoé

Engenheiro agrônomo e diretor da **Duagro**, revenda Barenbrug do Brasil no Rio Grande do Sul.



Engenheiro agrônomo

Técnico em agropecuária

Tecnólogo em Processos Gerenciais e Gestão do Agronegócio

Eloir Daltoé é engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária e tecnólogo em Processos Gerenciais e Gestão do Agronegócio.

É diretor da Duagro, empresa especializada em soluções forrageiras e sistemas de produção para a pecuária, com atuação voltada à intensificação de pastagens, ao planejamento forrageiro e à pecuária de alto desempenho.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Intensificação de pastagens
- Planejamento forrageiro
- Pecuária de alto desempenho

DUAGRO

Revenda da Barenbrug do Brasil no Rio Grande do Sul desde 2015.

ANTES DE COMEÇAR

Uma pergunta muda a conta inteira.

Quando o assunto é pastagem, a conversa costuma começar pela tonelada de matéria seca, pelo teor de proteína ou pelo preço do quilo da semente. São números importantes, mas nenhum deles, sozinho, paga a conta da fazenda.

Este e-book nasce da palestra do engenheiro agrônomo **Eloir Daltoé** e organiza, em linguagem direta, um raciocínio simples: o pasto é o meio; a arroba é o fim. O que interessa ao pecuarista é quanto cada hectare entrega de carne — e quanto disso fica no bolso.

Ao longo das próximas páginas você vai encontrar o caminho entre a forragem e o resultado, os dados de pesquisa que mostram o salto das forrageiras híbridas e casos reais de três fazendas que mediram, hectare por hectare, o que mudou.

Os resultados apresentados vêm de ensaios, laudos e fazendas específicas. Eles variam conforme solo, clima, manejo e sistema de produção. Use-os como referência e construa o seu plano junto com o técnico de confiança da sua propriedade.

NESTE E-BOOK

1	A pergunta que muda o resultado	04
2	Matéria seca é meio, arroba é fim	05
3	Forrageira, manejo e animal	06
4	A era dos híbridos: o que a pesquisa mostra	07
5	Casos reais no campo	12
6	Considerações finais	18
7	Os híbridos Barenbrug	20

> A qualidade do pasto já indica a arroba antes do boi entrar no piquete.
>
> ELOIR DALTOÉ

1 A PERGUNTA CERTA

A primeira pergunta nem sempre é a correta.

Na hora de escolher uma forrageira, três perguntas aparecem quase sempre — e todas fazem sentido.

- "Quantas toneladas de matéria seca esse capim produz?"
- "Quanto de proteína esse capim tem?"
- "Quanto custa o quilo da semente?"

O problema é que cada uma delas olha para um pedaço do sistema. Tonelada de matéria seca sem qualidade não vira carne. Proteína alta em pouca forragem não sustenta lotação. E o preço da semente é um custo de implantação que se dilui ao longo de vários ciclos de uma pastagem perene.

Por isso, antes de comparar números isolados, vale trocar a pergunta de partida.

A PERGUNTA QUE MUDA O RESULTADO

"Quanto eu pretendo produzir e ganhar por hectare?"



Por que essa pergunta funciona: ela obriga a olhar para o sistema inteiro — quanto o pasto produz, com que qualidade, quantos animais ele suporta, quanto cada animal ganha e quanto isso vale. É a meta de produção que define a escolha da forrageira, e não o contrário.

2 O CAMINHO ATÉ O RESULTADO

Matéria seca é meio. Arroba é fim.

A produção de matéria seca é só o primeiro elo de uma corrente. O indicador que paga a conta está no fim do processo, não no começo dele.

01	02	03	04	05	06
MS/ha	**Qualidade**	**Lotação**	**GMD**	**@/ha/ano**	**R$/ha/ano**
Quanto o pasto produz	Proteína e digestibilidade	Capacidade de suporte	Desempenho do animal	O que sai da porteira	O que fica no bolso

ELO POR ELO

Matéria seca por hectare mostra o volume que o pasto produz — incluindo a sazonalidade entre águas e seca, que é onde muitas fazendas perdem desempenho.

Qualidade (proteína e digestibilidade) define quanto dessa forragem o animal consegue transformar em ganho de peso.

Lotação é a capacidade de suporte: quantos animais o hectare sustenta ao longo do ano.

GMD, o ganho médio diário, é a resposta do animal à oferta e à qualidade do pasto.

Juntos, eles chegam ao que realmente importa: **arrobas por hectare por ano** e, depois de pagos os custos, **reais por hectare por ano**.

A CONTA QUE INTERESSA

Produção anual de matéria seca × Qualidade da forragem em cada estação × Lotação animal =

@ produzidas ao ano

> Não é apenas quanto pasto eu tenho, mas como e quantas arrobas esse hectare me entrega.

É por isso que uma forrageira deve ser avaliada pelo conjunto: mais forragem e forragem melhor — dois ganhos ao mesmo tempo.

3 SISTEMA DE PRODUÇÃO

Os três precisam andar juntos.

Nenhum elo trabalha sozinho. Uma forrageira de alto potencial mal manejada entrega pouco; um rebanho de boa genética sobre um pasto fraco também.

1

Forrageira

Entrega o potencial

A genética define o teto: quanto o pasto pode produzir, com que qualidade e com que distribuição ao longo do ano.

2

Manejo

Transforma potencial em forragem

Correção e adubação do solo, altura de entrada e saída, descanso dos piquetes. Sem manejo, o potencial genético não se expressa.

3

Animal

Transforma forragem em produto

Genética, sanidade e categoria animal determinam quanto da forragem colhida vira quilo de carne ou litro de leite.

CUSTO OU INVESTIMENTO?

A formação é paga uma vez. A performance rende por vários ciclos.

Na pastagem, o custo da formação reflete o investimento de implantação. Já a performance dessa área — incrementada por uma genética forrageira superior — é o fator gerador de resultado ano após ano.

Comparar forrageiras apenas pelo preço da semente é olhar para a parcela que se paga uma única vez e ignorar a que se repete a cada ciclo de pastejo. Em uma pastagem perene, a diferença de produção por hectare se acumula; o custo de implantação, não.



4 GENÉTICA FORRAGEIRA

A era dos híbridos

A genética animal evoluiu e provou seu valor no campo. A genética de plantas forrageiras está seguindo o mesmo caminho. Mas por que, de maneira geral, ela ainda não recebe a devida atenção?

4 O QUE A PESQUISA MOSTRA

Foi aqui que os híbridos chamaram a atenção.

Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) da UFU, na Fazenda Capim Branco, em Uberlândia (MG). Média de dois anos.


UM VCU EM CONDIÇÕES DE BAIXO INVESTIMENTO

O ensaio foi implantado em solo com saturação por bases inferior a 40%, recebendo na implantação 2 t/ha de calcário, 100 kg/ha de MAP e 100 kg/ha de ureia. Nos dois anos seguintes, não houve nova adubação. As condições representam um cenário de baixo investimento tecnológico, próximo ao encontrado em muitas áreas de pastagem no Brasil. **Mesmo assim, os híbridos mantiveram desempenho superior ao Marandu.**

Marandu (testemunha) · cv. *Cayana* · cv. *Sabiá*


PRODUÇÃO DE FORRAGEM

t MS/ha/ano · média de dois anos




PRODUTIVIDADE ANIMAL

@/ha/ano · média de dois anos



ACÚMULO DE FORRAGEM POR ÉPOCA

t MS/ha · médias gerais · Marandu × *Cayana*



+85% na seca

+54% nas águas

DIFERENÇA SOBRE O MARANDU

cv. *Sabiá*
+4,8 t MS/ha/ano
+7,4 @/ha/ano

cv. *Cayana*
+8,55 t MS/ha/ano
+8,0 @/ha/ano

Ensaio VCU realizado na Fazenda Capim Branco, em Uberlândia (MG), pela UFU, coordenado pelo Prof. Leandro Barbero.

4 O QUE A PESQUISA MOSTRA

Dois anos de ensaio, o mesmo padrão.

Os resultados se repetem nos dois anos de avaliação — o que reforça que a diferença não vem de uma safra favorável, e sim da genética.

Comparativo VCU — Marandu, *Cayana* e *Sabiá*


Cultivar	Ano 1 (t MS/ha/ano)	Ano 2 (t MS/ha/ano)	Média de forragem (t MS/ha/ano)	Produtividade animal (@/ha/ano)
Marandu	14,71	11,93	13,30	19,00
cv. *Cayana*	**23,95**	**19,75**	**21,85**	**27,04**
cv. *Sabiá*	**19,95**	**16,30**	**18,10**	**26,40**

Ensaio VCU — Fazenda Capim Branco, Uberlândia (MG), UFU.

> "Mesmo sob baixa fertilidade e sem adubação nos dois anos seguintes à implantação, a superioridade dos híbridos sobre o Marandu se manteve."
>
> ELOIR DALTOÉ

Produção por estação: *Cayana* e *Sabiá* × Marandu

Na avaliação de produção de forragem por estação, *Cayana* e *Sabiá* foram comparados ao Marandu e a outros três materiais híbridos. Os dois Barenbrug lideram — e a vantagem fica ainda maior na seca.



Produção de forragem por estação (kg MS/ha)

Na seca: *Cayana* 8.615 e *Sabiá* 7.761 kg MS/ha, contra 4.189 do Marandu. Nem todo híbrido é igual — a escolha da cultivar pesa no resultado.

4 O QUE A PESQUISA MOSTRA

Da matéria seca à carne.

Análise bromatológica independente, com amostras coletadas em janeiro de 2026. O próprio laboratório estima o ganho de peso a partir da qualidade da forragem.

CV.
Cayana
Brachiaria híbrida

17,6% proteína bruta
123 kg carne por t de MS
1,41 kg GMD estimado

CV.
Carcará
Panicum híbrido

23,3% proteína bruta
130 kg carne por t de MS
1,47 kg GMD estimado

> A qualidade do pasto já indica a arroba antes do boi entrar no piquete.
> ELOIR DALTOÉ

GMD estimado é a projeção de ganho de peso diário que a forragem permite, calculada pelo laboratório a partir do seu valor nutricional — antes de qualquer pesagem. Os dados vêm de laboratório independente, não do fornecedor da semente.

Mais forragem. E forragem melhor.

Além da quantidade, a qualidade. Em média, as forrageiras híbridas apresentam valores nutricionais superiores aos das cultivares convencionais — e são esses números que se convertem em carne por tonelada de matéria seca colhida.

Indicador	Híbridos	Convencionais
Proteína bruta	**16–20%**	**~12%**
Digestibilidade	65–73%	55–60%
Carne por tonelada de matéria seca	**80–100 kg**	**50–70 kg**

Faixas de referência apresentadas por Eloir Daltoé. Os valores variam conforme manejo, fertilidade do solo e estágio da planta.

Fonte: 3RLab Ribersolo — Laboratório de Análises Agropecuárias (selos NFTA e Rock River Laboratory), Resultados de Nutrição Animal, amostras de jan/2026. Valores pontuais das amostras analisadas.

4 O QUE A PESQUISA MOSTRA

Um ano inteiro, dez cortes.


Área experimental da Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Não é uma amostra pontual: é o acompanhamento de um ciclo completo.

24.977
kg MS/ha no ano
cv. *Cayana*

21.203
kg MS/ha no ano
cv. *Sabiá*

20–21%
proteína bruta média nos dois híbridos

35,5
dias de intervalo médio entre cortes



Matéria seca por corte (kg MS/ha). O 6° corte não teve leitura de matéria seca registrada na planilha do ensaio.

DIGESTIBILIDADE DA FDN (TTNDFD)

média do ano, %



A digestibilidade da fibra dos dois híbridos — 64% e 66% — ficou acima da alfafa no mesmo ensaio (51%). A alfafa é uma referência de qualidade muito respeitada na pecuária leiteira do Sul.

Na estimativa de produção de leite a partir da forragem, os híbridos chegaram a **37.873 kg de leite/ha** no ano com o *Cayana* e **32.749 kg** com o *Sabiá*.

Isso não é sorte de uma safra boa. É o padrão do ano inteiro.

Fonte: Planilha de acompanhamento — Ensaio Cotrijal, Não-Me-Toque (RS), jan/2023 a jan/2024. Produção de leite estimada a partir da qualidade da forragem.

5 CASOS REAIS

Do ensaio para a porteira.

As evidências de pesquisa já apontavam nessa direção. Faltava olhar para o dado certo dentro das fazendas.

Nas próximas páginas, casos com medição real — de cria, recria e terminação — mostram o que muda quando forrageira, manejo e animal trabalham juntos.



CASO REAL · CICLO COMPLETO

Fazenda Santa Tereza

Começar pelo solo, e não pela semente. Em 2018, a fazenda iniciou o trabalho de intensificação corrigindo a base. Os híbridos vieram depois — e com eles, os índices reprodutivos.

Perfil da propriedade	
Área total	**5.500 ha**
Área de pecuária	**2.100 ha**
Início do trabalho	**2018**
Híbridos implantados	**550 ha**
Composição	80% *Brachiaria* · 20% *Panicum*
Cultivar em destaque	cv. *Sabiá*

Azevém no inverno e híbridos tropicais na primavera, no verão e no outono garantem forragem de qualidade o ano todo.

TAXA DE PRENHEZ

62% → 87%

PESO MÉDIO À DESMAMA

157 → 211 kg

São **54 kg a mais por bezerro desmamado** e 25 pontos percentuais a mais de prenhez. Na cria, oferta e qualidade de forragem o ano inteiro aparecem direto nos índices reprodutivos.


CASO REAL · NOVILHO PRECOCE

Fazenda Santa Tereza

Terminação intensiva a pasto · cv. *Cayana*

83 hectares divididos em 4 piquetes, 416 animais e manejo rotacionado orientado pelo resíduo de pasto.

Indicador	Resultado
Entrada · 07/11/2022	**280 kg/cab**
Saída · 28/04/2023	**485 kg/cab**
Período	172 dias
Ganho por animal	205 kg
GMD	**1,19 kg/animal/dia**
Lotação	5 animais/ha
Suplementação	0,2% do PV · 16% PB



1.028 kg

de peso vivo por hectare em 172 dias

O equivalente a **34,26 @/ha** de peso vivo (30 kg por arroba), num sistema a pasto com suplementação leve.

A EVOLUÇÃO DO LOTE EM 172 DIAS

ENTRADA · nov/2022 **SAÍDA · abr/2023**



280 kg **+205 kg** **485 kg**

O QUE ESSE CASO ENSINA

Lotação de 5 animais por hectare é capacidade de suporte — é o que o pasto aguenta. Com GMD de 1,19 kg/dia ao longo de quase seis meses, a soma de lotação e desempenho individual é o que gera mais de uma tonelada de peso vivo por hectare. Nenhum dos dois, sozinho, chegaria lá.

CASO REAL · RECRIA E ENGORDA INTENSIVA

Fazenda Cristal

O que 1 hectare entregou no primeiro ciclo · cv. *Cayana*

Um hectare, 260 dias de utilização: 90 dias de terminação com 14 animais/ha, seguidos de 170 dias de recria com 8 animais/ha.

Indicador	Terminação · 90 dias	Recria · 170 dias	Resultado · 260 dias
Animais/ha	14,0	8,0	—
GMD	1,46 kg	0,55 kg	—
Peso produzido/ha	**1.853 kg**	**748 kg**	**2.601 kg**
Valor produzido/ha	R$ 25.015	R$ 11.220	R$ 36.235
Custo de suplementação	R$ 9.604	R$ 952	R$ 10.556
Implantação + adubação	R$ 4.500	—	—


260 dias
de utilização no primeiro ciclo

2.601 kg
de peso vivo produzido por hectare

R$ 21.179
de saldo por hectare

> O custo de implantação é do primeiro ciclo. A pastagem é perene.
>
> ELOIR DALTOÉ

Esse é o caso que fecha a conta. Do valor produzido (R$ 36.235) saem a suplementação (R$ 10.556) e o investimento de implantação e adubação (R$ 4.500): sobram R$ 21.179 por hectare. E a implantação não se repete — a pastagem estará lá no ano seguinte, e no outro.



Valores do primeiro ciclo, conforme apresentados na palestra. Preços e custos referentes ao período avaliado.



CASO REAL · RECRIA A PASTO

Fazenda Ventura

Dois olhares sobre a mesma fazenda: uma medição detalhada em 9 hectares de recria intensiva e o resultado do módulo comercial de 400 hectares.

Case 1 · Recria intensiva a pasto

Medição em 9 hectares

Área	**9 ha**
Animais	**76 novilhas**
Divisão	**4 piquetes**
Período de avaliação	**210 dias**
GMD	**0,608 kg/cab/dia**
Produção por hectare/dia	**5,1 kg**
Produção no período	**1.078 kg/ha**
Suplementação	**0,3% do PV**
Custo de implantação	**R$ 2.870/ha**
Outras despesas	**R$ 860/ha**

1.078 kg/ha

35,93 @/ha em 210 dias · alta produção em curto período

Case 2 · Recria a pasto, sistema comercial

Módulo de 400 hectares

Área do módulo	**400 ha**
Lotação média	**4 a 5 recrias/ha**
Carga animal média	**≈ 1.800 kg PV/ha**
Período de utilização	**out/nov a abr/mai**
Ganho por animal	**150 a 200 kg no período**
Suplementação	**somente mineral**
Adubação anual	**200 kg/ha de 16-16-16**
	+ 150 kg/ha de ureia

≈ 800 kg/ha/ano

26,6 @/ha (240 dias) · produção sustentável com baixo custo



CASO REAL · FAZENDA VENTURA

O mesmo hectare, duas realidades.

Mesma região, mesmo tipo de solo, mesma data. De um lado da cerca, pasto formado com híbrido; do outro, Marandu — em pleno período seco.

Boa parte da pecuária brasileira ainda opera muito abaixo do que aquele hectare poderia entregar. O potencial não precisa ser criado do zero: ele já existe na área. O que muda é a decisão de genética, de manejo e de gestão em cima dele.

O potencial já estava lá. Foi apenas uma questão de "destravar".

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E VISÃO DE FUTURO


O impacto da genética já é conhecido.

O impacto dos ganhos genéticos no agronegócio é conhecido. Na agricultura, a semente híbrida mudou o patamar de produtividade.

Em cerca de cinquenta anos, a produtividade média do milho no Brasil saiu de 1,6 para 7,2 toneladas por hectare. Hoje, a grande maioria da área cultivada usa sementes híbridas. Ninguém discute mais se vale a pena: a genética virou parte do pacote básico de quem quer produzir.

Na pecuária a lógica é a mesma. Assim como a genética animal transformou o desempenho dos rebanhos, a genética das forrageiras agora entrega mais forragem e forragem de melhor qualidade no mesmo hectare.

PRODUTIVIDADE DO MILHO NO BRASIL



+350%
de produtividade em 50 anos

91%
da área de milho já é híbrida

Fonte: Abrasem · Embrapa · Conab

AGRICULTURA

Só se manteve competitivo quem adotou a semente híbrida.

PECUÁRIA

A lógica é a mesma — e a tecnologia já existe.

Tudo o que foi apresentado neste e-book aponta na mesma direção: os ensaios de pesquisa, os laudos de laboratório e as fazendas que mediram o resultado. O próximo salto da pecuária a pasto passa pela genética forrageira — desde que ela venha acompanhada de solo corrigido, manejo bem feito e animais capazes de converter a forragem em carne.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E VISÃO DE FUTURO

Intensificar é trabalhar vários componentes.

Pecuária é a interação entre ambiente, planta e animal. A forrageira híbrida eleva o teto de produção, mas o resultado aparece quando todos os componentes evoluem juntos.

Solo	Planta	Manejo	Animal
Fertilidade	Genética	Sistema produtivo	Genética
Textura	Produtividade	Estrutura	Consumo
Aspectos físico-químicos	Qualidade	Operação	Conversão

O QUE FICA DESTA LEITURA

- A meta é arroba por hectare por ano — matéria seca é o meio para chegar lá.
- Quantidade e qualidade precisam vir juntas: mais forragem e forragem melhor.
- A seca é onde a genética forrageira mais faz diferença no desempenho do rebanho.
- A implantação é paga uma vez; a performance da pastagem perene rende por vários ciclos.
- Os casos que deram certo começaram pelo solo e mediram o resultado.

PERGUNTAS PARA LEVAR AO SEU TÉCNICO

- Qual é a minha meta de @/ha/ano — e qual é o meu número hoje?
- Como está a fertilidade do solo das áreas que quero intensificar?
- Quanto da minha produção de forragem eu perco na seca?
- Minha estrutura de piquetes e água permite manejo pelo resíduo?
- Qual categoria animal aproveita melhor o pasto que vou formar?

A Barenbrug não emite recomendação individual de solo e adubação: ela deve ser feita pelo agrônomo responsável pela sua propriedade.

7 OS HÍBRIDOS BARENBRUG

Genética própria para o pasto brasileiro.

Fundada em 1904 na Holanda e presente em mais de 20 países, nos seis continentes, a Barenbrug mantém no Brasil um programa próprio de melhoramento de forrageiras tropicais.

Dele nasceram três híbridos exclusivos — *Sabiá*, *Cayana* e *Carcará* — avaliados em ensaios de Valor de Cultivo e Uso e acompanhados em fazendas de todo o país. Nas próximas páginas, a ficha técnica de cada um.



BRACHIARIA HÍBRIDA
Sabiá
+36%
produtividade animal vs. Marandu

BRACHIARIA HÍBRIDA
Cayana
+42,2%
produtividade animal vs. Marandu

PANICUM HÍBRIDO
Carcará
+4,4 @/ha/ano
vs. Mombaça

PUREZA ACIMA DO PADRÃO

Espécie	Mínimo MAPA	Padrão Barenbrug
Brachiaria (*Sabiá, Cayana*)	60%	95%
Panicum (*Carcará*)	40%	90%

Instrução Normativa nº 30/2008 (MAPA). Análise lote a lote em laboratório próprio (LASBAR).

Mais pureza significa mais semente viável em cada saco — e menos risco de levar sementes de plantas daninhas para a área.

TECNOLOGIA YELLOW JACKET®

- **F** **Fungicidas** · proteção contra fungos de armazenamento
- **I** **Inseticidas** · contra insetos sugadores e mastigadores
- **B** **Bioestimulante** · acelera o crescimento inicial
- **N** **Nutrientes** · macro e micronutrientes de liberação rápida

+80%
MS de raízes nos primeiros 48 dias

+19,5%
acúmulo médio de forragem em 7 cortes

Resultados com cv. Mulato II em Guaíra (SP).

cv. *Sabiá*

Híbrido de porte ereto e exigência média em fertilidade, com alta resposta à adubação e excelente consumo animal.

DESEMPENHO VS. MARANDU (TESTEMUNHA)

+36%
produtividade animal

+7 @
por hectare por ano

+47%
produção na seca (avaliações VCU)

+62%
lâmina foliar na estação seca

POTENCIAL E QUALIDADE

Hábito de crescimento	**Ereto**
Exigência em fertilidade	**Média**
Resposta à adubação	**Alta**
Consumo animal	**Excelente**
Acúmulo de forragem	**9,1 a 29,6 t/ha/ano**
Produtividade animal	**14,9 a 38,5 @/ha/ano**
Proteína bruta	**9,2% a 21%**
Digestibilidade (lâmina foliar)	**78% a 82%**

IMPLANTAÇÃO E MANEJO

Taxa de semeadura (ideal)	**10 kg/ha**
Profundidade de semeadura	**1 a 2 cm**
Pastejo rotacionado · entrada	**30 cm**
Pastejo rotacionado · saída	**15 a 20 cm**
Pureza mínima	**95%**

Uso	**Precipitação mínima**	**Altitude máxima**	**Máximo sem chuva**
Pastejo, silagem e pré-secado	800 mm	1.800 m	6 meses

Porte ereto, exigência média em fertilidade e alta resposta à adubação. O destaque está na seca: é quando a diferença em produção e em lâmina foliar mais aparece no desempenho do rebanho.

Fonte: Barenbrug do Brasil. Faixas obtidas em ensaios; os resultados variam conforme solo, clima e manejo. Valores máximos de *Sabiá* e *Cayana*: acúmulo de forragem em sistema irrigado (média de 2 anos) e proteína bruta média anual do ensaio Cotrijal (RS). Proteína bruta máxima do *Carcará*: laudo 3RLab Ribersolo (jan/2026).

cv. Cayana

Híbrido semi-decumbente de alta exigência em fertilidade e alta resposta à adubação, com até 985 perfilhos no período das águas.

DESEMPENHO VS. MARANDU (TESTEMUNHA)

+42,2%
produtividade animal

+8 @
por hectare por ano

+66%
produção de carne na seca

985
perfilhos no período das águas (até)

POTENCIAL E QUALIDADE

Hábito de crescimento	**Semi-decumbente**
Exigência em fertilidade	**Alta**
Resposta à adubação	**Alta**
Consumo animal	**Excelente**
Acúmulo de forragem	**9,7 a 30,7 t/ha/ano**
Produtividade animal	**12,1 a 32,6 @/ha/ano**
Proteína bruta	**11,9% a 20%**
Digestibilidade (lâmina foliar)	**80,6% a 81,1%**

IMPLANTAÇÃO E MANEJO

Taxa de semeadura (ideal)	**10 kg/ha**
Profundidade de semeadura	**1 a 2 cm**
Pastejo rotacionado · entrada	**32 cm**
Pastejo rotacionado · saída	**16 a 20 cm**
Pureza mínima	**95%**

Exigências de solo
Saturação por bases (V%) acima de 60% · fósforo (P) acima de 7 ppm · potássio (K) de 3% a 5% da CTC.

Uso
Pastejo, silagem e pré-secado

Precipitação mínima
800 mm

Altitude máxima
1.800 m

Máximo sem chuva
6 meses

Desenvolvido em 12 anos de pesquisa e avaliado em ensaios VCU sob corte e pastejo na Fazenda Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia. Por ser de alta exigência em fertilidade, entrega o máximo potencial em solos corrigidos.

Fonte: Barenbrug do Brasil. Faixas obtidas em ensaios; os resultados variam conforme solo, clima e manejo. Valores máximos de *Sabiá* e *Cayana*: acúmulo de forragem em sistema irrigado (média de 2 anos) e proteína bruta média anual do ensaio Cotrijal (RS). Proteína bruta máxima do *Carcará*: laudo 3RLab Ribersolo (jan/2026).

BARENBRUG

cv. Carcará

Panicum híbrido de porte ereto, alta resposta à adubação e excelente consumo animal — mais lâmina foliar e mais arroba por hectare.

DESEMPENHO VS. MOMBAÇA (TESTEMUNHA)

+4,4 @	+19%	+22%	+26%
por hectare por ano	de rentabilidade	acúmulo de forragem	lâmina foliar produzida

POTENCIAL E QUALIDADE

Hábito de crescimento	**Ereto**
Exigência em fertilidade	**Alta**
Tolerância à má drenagem	**Média**
Acúmulo de forragem	**12,5 a 22,9 t/ha/ano**
Produtividade animal	**15,1 a 27,6 @/ha/ano**
Proteína bruta	**6,9% a 23,3%**
Digestibilidade (MS total)	**63,6% a 66,2%**
Digestibilidade (lâmina foliar)	**66,4% a 74,6%**

IMPLANTAÇÃO E MANEJO

Taxa de semeadura (ideal)	**8 a 10 kg/ha**
Profundidade de semeadura	**0,5 a 1 cm**
Pastejo rotacionado · entrada	**70 a 80 cm**
Pastejo rotacionado · saída	**35 a 40 cm**
Emergência	**7 a 21 dias**
Pureza mínima	**90%**

Uso	**Precipitação mínima**	**Altitude máxima**	**Máximo sem chuva**
Pastejo, silagem e pré-secado	800 mm	1.800 m	6 meses

Panicum híbrido de porte ereto e alta exigência em fertilidade. A emergência ocorre entre 7 e 21 dias após o plantio. A semeadura deve ser mais rasa que a das braquiárias (0,5 a 1 cm).

Fonte: Barenbrug do Brasil. Faixas obtidas em ensaios; os resultados variam conforme solo, clima e manejo. Valores máximos de *Sabiá* e *Cayana*: acúmulo de forragem em sistema irrigado (média de 2 anos) e proteína bruta média anual do ensaio Cotrijal (RS). Proteína bruta máxima do *Carcará*: laudo 3RLab Ribersolo (jan/2026).



Afinal,

quem planta capim quer colher arroba.

A Barenbrug desenvolve genética forrageira desde 1904. No Brasil, as cultivares híbridas *Sabiá*, *Cayana* e *Carcará* foram criadas para transformar o potencial de cada hectare em resultado. Fale com um representante Barenbrug e com o técnico da sua fazenda.

Cultive Confiança.

BARENBRUG

Cultive Confiança.

barenbrug.com.br · @barenbrugdobrasil

Conteúdo baseado na palestra "Quem planta capim quer colher arroba", de Eloir Daltoé, engenheiro agrônomo. Os resultados apresentados referem-se a ensaios, laudos e propriedades específicas e variam conforme solo, clima, manejo e sistema de produção. Janelas de plantio e recomendações técnicas devem ser validadas com o técnico local e o Zoneamento Agrícola (ZARC/MAPA).