BARENBRUG DO BRASIL

Base de Conhecimento Oficial: Cultivar Brachiaria Híbrida Sabiá

Compilado Completo de 60 Perguntas e Respostas para Treinamento Comercial, Suporte Técnico e Agente de IA (RD Conversas)

BLOCO 1: PERGUNTAS FUNDAMENTAIS, PLANTIO E MANEJO (Q1 a Q20)

Q1: O que é o capim Sabiá?

R: É uma braquiária híbrida desenvolvida pela Barenbrug a partir do cruzamento entre a Brachiaria brizantha e a Brachiaria ruziziensis, selecionada na 4ª geração de cruzamentos. Ele recebeu o nome 'Sabiá' por ser extremamente rústico e se adaptar perfeitamente a diferentes condições de ambiente e solo, assim como o pássaro nativo da América do Sul.

Q2: Para qual tipo de uso o Sabiá é indicado?

R: Ele é um cultivar muito versátil. É indicado para pecuária de corte (cria, recria e engorda intensiva a pasto), pecuária de leite, e possui excelente aptidão para a produção de silagem e pré-secado.

Q3: Qual é a taxa de semente (semeadura) recomendada por hectare?

R: A recomendação varia de acordo com as condições de plantio: 10 kg/ha para condição ideal (solo bem preparado e semeadura em linha); 12 kg/ha para condição intermediária; e 15 kg/ha para condições adversas, sendo a recomendação específica para aplicações via drone, avião, áreas irregulares ou de morro.

Q4: Qual é a profundidade correta para a semeadura do Sabiá?

R: A regra de ouro é manter a semente rasa, entre 1 e 2 cm de profundidade. Se for enterrada a mais de 2 cm (por exemplo, uso incorreto de grade pesada), a emergência será severamente atrasada ou as plantas não terão força para germinar.

Q5: O Sabiá pode ser estabelecido em solos arenosos ou de média fertilidade?

R: Sim. O Sabiá é uma forrageira de média exigência em fertilidade (V% de 50 a 60%, Fósforo mínimo de 5 mg/dm³ e Potássio de 3 a 5% da CTC). Pode ser estabelecido em solos arenosos, desde que sejam feitas a devida correção e adubação para suprir as necessidades nutricionais da planta.

Q6: O Sabiá pode ser plantado em áreas de várzea ou solos alagados?

R: Não. O Sabiá possui baixa tolerância à má drenagem e ao encharcamento prolongado. Para áreas de várzea ou sujeitas a acúmulo frequente de água, a recomendação oficial da Barenbrug é a Brachiaria humidicola.

Q7: Com quantos dias posso realizar o primeiro pastejo no Sabiá?

R: Em geral, entre 60 e 90 dias após o plantio, dependendo da fertilidade e do clima. É fundamental entrar primeiro com animais leves para realizar o despontamento, o que estimula um forte perfilhamento e acelera o fechamento do solo.

Q8: Qual a altura ideal de manejo para entrada e saída dos animais?

R: No pastejo rotacionado, a altura de entrada é de 30 cm e a de saída de 15 a 20 cm. No pastejo contínuo, a altura média de manejo deve ser mantida entre 25 e 30 cm.

Q9: O que fazer se o pasto de Sabiá ultrapassar os 30 cm de altura?

R: Se passar de 30 cm, o pasto perde eficiência, alonga o colmo e ocorre sombreamento da base. É necessário realizar o ajuste de carga animal, aumentando o número de cabeças para rebaixar a pastagem ao ponto ideal.

Q10: É verdade que o Sabiá se destaca na época da seca?

R: Sim, esse é seu maior diferencial. Na seca, o Sabiá acumula 42% a mais de forragem total e 50% a mais de lâminas foliares (folhas verdes) em comparação ao Marandu, acabando com o problema do 'boi sanfona'.

Q11: O Sabiá resiste à seca extrema do Nordeste (semiárido)?

R: O Sabiá exige precipitação mínima de 800 mm/ano para expressar seu potencial. Porém, em caso real na Fazenda Redenção em Pureza (RN), num ano de seca histórica com apenas 250 mm de chuva no período (100 mm pós-plantio em solo arenoso), ele sobreviveu e permaneceu verde graças às suas raízes profundas e calibrosas.

Q12: O Sabiá é indicado para o pastejo diferido (pasto vedado)?

R: Excelente. Por ter florescimento tardio, ao ser vedado para a seca ele entrega uma proporção de lâminas foliares superior a 100% e acúmulo de massa seca de folhas superior a 130% em relação ao Marandu e à Decumbens no final do período de diferimento.

Q13: O Sabiá apresenta resistência às cigarrinhas-das-pastagens?

R: Sim. Apresenta resistência similar ou superior aos cultivares mais resistentes do mercado contra Notozulia e Deois, além de destacar-se pela altíssima resistência à cigarrinha-da-cana (Mahanarva fimbriolata).

Q14: Quantas arrobas a mais por hectare o Sabiá pode produzir comparado ao Marandu?

R: Em ensaios oficiais do MAPA, o Sabiá entregou em média 36,1% a mais de produtividade animal, representando 7 arrobas a mais por hectare/ano em relação ao Marandu, atingindo tetos de até 38,5 @/ha/ano em Xinguara (PA).

Q15: Qual é o teor de Proteína Bruta (PB) do Sabiá?

R: A matéria seca total apresenta de 9,2% a 13,4% de PB, chegando a 13,4% a 14,0% nas folhas isoladas. Ressalta-se que o teor de PB varia conforme a época do ano, fase vegetativa, manejo e fertilidade do solo.

Q16: O Sabiá é tolerante a geadas no inverno?

R: Sim, desde que manejado corretamente. Recomenda-se rebaixar a planta antes do inverno para proteger as folhas na base, facilitando o pastejo. Seu florescimento tardio também evita a perda precoce de qualidade.

Q17: O Sabiá pode ser utilizado em consórcio com milho (ILP)?

R: Sim. Em espaçamento de 50 cm entre linhas de milho, não é necessário aplicar herbicida de contenção, pois o desenvolvimento inicial do Sabiá é mais tardio e o milho o sombria naturalmente. Em espaçamentos de 70-80 cm, o uso de subdose de herbicida pode ser necessário.

Q18: Como é a adaptação do Sabiá em áreas de morro e terreno declivoso?

R: Muito boa. Devido ao seu intenso perfilhamento (850 perfilhos/m² nas águas e 760 na seca), ele cobre rapidamente o solo. Em áreas de morro, recomenda-se a taxa de semeadura de 12 a 15 kg/ha.

Q19: Como funciona o sistema radicular e o tempo de estabelecimento do Sabiá?

R: Possui um sistema radicular profundo e calibroso (raízes grossas) que busca umidade e nutrientes nas camadas profundas do solo. Como investe muita energia inicial na raiz, pode apresentar um tempo de germinação e estabelecimento um pouco maior do que braquiárias convencionais.

Q20: Qual a proposta de valor resumida do Sabiá para o pecuarista?

R: Segurança e rendimento em um único cultivar: 34% a mais de forragem no ano, +42% de massa e +50% de folhas na seca, fim do 'boi sanfona', resistência a cigarrinhas e média de +7 @/ha/ano.

BLOCO 2: NUTRIÇÃO DE SOLO, QUALIDADE E DESEMPENHO (Q21 a Q35)

Q21: Qual a exigência química de solo para o Sabiá (V%, P e K)?

R: Recomendado para solos de média a alta fertilidade, exigindo Saturação por Bases (V%) de 50% a 60%, Fósforo (P) mínimo de 5 mg/dm³ e Potássio (K) de 3 a 5% da CTC.

Q22: O Sabiá apresenta boa recuperação no início das chuvas?

R: Sim. Por manter maior índice de área foliar e folhas vivas durante o período seco, o Sabiá apresenta uma rebrota e recuperação muito mais rápida e vigorosa no início da estação chuvosa.

Q23: Qual é o potencial de produção de matéria seca por hectare ao ano?

R: O acúmulo de forragem varia de 9,1 a 28,7 toneladas de Matéria Seca (MS) por hectare/ano, dependendo do nível de adubação, solo e pluviometria da região.

Q24: O Sabiá pode ser utilizado para a confecção de silagem e pré-secado?

R: Sim, além do pastejo direto para gado de corte e leite, apresenta excelente valor nutricional e facilidade de colheita para silagem e pré-secado.

Q25: Até qual altitude acima do nível do mar o Sabiá pode ser plantado?

R: O cultivar Sabiá demonstra ampla adaptabilidade, podendo ser cultivado em áreas com altitude de até 1.800 metros.

Q26: Quantos meses de estiagem sem chuva o Sabiá consegue suportar?

R: Suporta períodos de até 6 meses sem chuva, mantendo tolerância média à seca e produção foliar superior às testemunhas durante a estiagem.

Q27: Como é a aceitação e palatabilidade do Sabiá pelo gado?

R: Excelente. Por ter porte mais baixo, hábito ereto e pouca tendência ao alongamento de colmo, o gado apresenta altíssima aceitabilidade tanto das folhas quanto dos colmos.

Q28: Qual é o índice de digestibilidade do capim Sabiá?

R: A digestibilidade da matéria seca total varia de 69,5% a 81,5%. Considerando exclusivamente a fração foliar (lâmina foliar), a digestibilidade atinge de 78% a 82%.

Q29: Qual a densidade de perfilhos do Sabiá comparada ao Marandu?

R: O Sabiá emite 850 perfilhos/m² nas águas (contra 760 do Marandu) e mantém 760 perfilhos/m² na seca (contra apenas 600 do Marandu), garantindo alta densidade de pasto.

Q30: Quando ocorre a inflorescência (florescimento) do Sabiá no Brasil Central?

R: O florescimento ocorre a partir do mês de abril no Brasil Central. Por ser tardio, retarda a lignificação da planta e mantém a qualidade da forragem por mais tempo na transição para o inverno.

Q31: Qual o motivo da escolha do nome 'Sabiá' para o cultivar?

R: Uma homenagem ao pássaro Sabiá, símbolo de adaptabilidade e presença na fauna sul-americana, representando a rusticidade e a facilidade de manejo do cultivar.

Q32: Como o Sabiá atua tecnicamente para eliminar o 'boi sanfona'?

R: Distribuindo melhor a oferta de comida: produz 65% nas águas e 35% na seca (diferente do Marandu, que concentra 80% nas águas e cai para 20% na seca), mantendo o ganho de peso constante no inverno.

Q33: Qual o teto produtivo de carne por hectare registrado pelo Sabiá em ensaios oficiais?

R: Em Xinguara (PA), o Sabiá atingiu o teto produtivo oficial de 38,5 arrobas por hectare ao ano sob pastejo.

Q34: Como o Sabiá responde ao aumento da adubação nitrogenada?

R: Apresenta altíssima resposta. Ao elevar a dose de Nitrogênio de 50 kg/ha para 200 kg/ha, a produção total de forragem aumenta 45% e a produção de folhas praticamente dobra (+77%).

Q35: O que comprovou o caso de sucesso da Fazenda Redenção no Rio Grande do Norte?

R: Comprovou a rusticidade e segurança da semente: em solo arenoso e sob seca histórica de 111 anos (250 mm de chuva total, 100 mm pós-plantio), o Sabiá permaneceu verde graças às raízes profundas, motivando a expansão da área de 30 para 200 hectares.

BLOCO 3: GENÉTICA, RESISTÊNCIA E DADOS DE CAMPO (Q36 a Q55)

Q36: Quais as espécies genitoras do híbrido Sabiá?

R: É um híbrido interespecífico resultante do cruzamento entre Brachiaria brizantha e Brachiaria ruziziensis, selecionado na 4ª geração de cruzamentos pela Barenbrug.

Q37: O Sabiá forma colmos duros e rejeitados pelo gado na seca?

R: Não. Possui elevada relação folha-colmo e colmos macios, mantendo excelente palatabilidade e evitando a formação de 'bucha' ou talos rejeitados.

Q38: Quem foi o produtor e a fazenda responsável pelo teste no semiárido do RN?

R: Paulo Roberto Coutinho, proprietário da Fazenda Redenção em Pureza (RN), acompanhado pelo gerente André e pelo canal CropAgrícola.

Q39: Em quais locais foram realizados os ensaios regionais oficiais (VCU) do Sabiá?

R: Em Xinguara (PA), Pontes e Lacerda (MT), Unemat (MT), UFU em Uberlândia (MG) e Colinas do Tocantins (TO).

Q40: Qual a maior diferença anual de arrobas registrada entre o Sabiá e o Marandu?

R: Em Xinguara (PA), a diferença foi de 11,1 @/ha/ano a favor do Sabiá (38,5 @/ha vs 27,4 @/ha do Marandu).

Q41: O que ocorre se o Sabiá for submetido a mais de 300 mm de chuva mensal com acúmulo de água no solo?

R: A planta sofrerá mortalidade, pois possui baixa tolerância ao encharcamento e alagamento de solo.

Q42: Qual a vantagem do alto perfilhamento do Sabiá na época das águas e na seca?

R: Proporciona maior densidade de plantas por metro quadrado, cobrindo o solo rapidamente, reduzindo moscas/daninhas e aumentando o tamanho do bocado do animal.

Q43: Por que o Sabiá é ideal para sistemas de terminação e semiconfinamento a pasto?

R: Pela alta entrega de massa foliar no pastejo diferido (vedação), mantendo teores de proteína e digestibilidade foliar elevados no pico da seca.

Q44: Como o Sabiá se comporta perante o ataque da cigarrinha-da-cana (Mahanarva)?

R: Apresenta altíssima resistência, mantendo folhas verdes e sanidade saudável com o mínimo de necrose ou clorose foliar.

Q45: O Sabiá é uma boa alternativa para substituir áreas de Brachiaria decumbens afetadas por cigarrinhas?

R: Sim, excelente opção, pois a B. decumbens é altamente suscetível a cigarrinhas e o Sabiá oferece total resistência com maior produtividade de carne.

Q46: Como o florescimento tardio impacta o valor nutricional da pastagem?

R: Retarda o processo de maturação da planta, impedindo que o capim fique 'sazonado' ou perca proteína precocemente no final da estação chuvosa.

Q47: Qual o incremento de massa foliar ao aplicar 200 kg de N/ha no Sabiá?

R: O acúmulo exclusivo de folhas cresce mais de 77% em comparação à dose de 50 kg de N/ha.

Q48: Por que a semeadura profunda (>2 cm) prejudica o estabelecimento do Sabiá?

R: Porque a semente esgota suas reservas de energia antes de conseguir emergir da superfície do solo, reduzindo drasticamente o estande de plantas.

Q49: É necessário usar herbicida de contenção no consórcio de Sabiá com milho a 50 cm?

R: Não, o sombreamento natural pelo milho é suficiente devido ao desenvolvimento inicial mais tardio da parte aérea do Sabiá.

Q50: Como realizar a sobressemeadura de aveia no inverno sobre o Sabiá?

R: Recomenda-se realizar o rebaixamento do pasto de Sabiá e efetuar a sobressemeadura com plantadeira em linha para melhor contato semente-solo.

Q51: Como manejar o Sabiá em regiões sujeitas a geadas no inverno?

R: Efetuar o rebaixamento da pastagem antes do frio para que as folhas fiquem protegidas na base, facilitando o pastejo e a rebrota pós-geada.

Q52: Qual a porcentagem média de digestibilidade das folhas do Sabiá?

R: Varia entre 78% e 82% de digestibilidade da matéria seca das folhas.

Q53: Quais protocolos o MAPA exigiu para o registro e lançamento do Sabiá?

R: Cumpriu 2 anos de ensaios oficiais de VCU (Valor de Cultivo e Uso) sob corte e avaliações de VCU sob pastejo com desempenho animal.

Q54: Qual a diferença do manejo do Sabiá em relação a capins de porte alto como o Mombaça?

R: O Sabiá é manejado mais baixo (entrada aos 30 cm e saída a 15-20 cm), facilitando o controle e exigindo apenas ajuste de carga quando passa da altura.

Q55: Qual o retorno financeiro médio do Sabiá por hectare ao ano?

R: Na média de 7 arrobas a mais por hectare/ano (+36,1%), o ganho adicional de carne paga o investimento da semente no primeiro ciclo e gera margem de lucro líquida superior.

BLOCO 4: TECNOLOGIA DE SEMENTES YELLOW JACKET® (Q56 a Q60)

Q56: O que é a tecnologia Yellow Jacket® presente nas sementes do Sabiá?

R: É a tecnologia exclusiva de revestimento e tratamento de sementes da Barenbrug, onde a semente do Sabiá é incrustada e protegida antes de ir ao campo.

Q57: Qual a composição do revestimento Yellow Jacket® que envolve a semente?

R: O revestimento inclui defensivos agrícolas (fungicidas e inseticidas para proteção contra pragas de solo) e uma carga de nutrientes essenciais para o arranque inicial da germinação.

Q58: Quais os benefícios práticos do Yellow Jacket® na hora do plantio?

R: Protege contra pragas de solo (formigas/cupins) e fungos, fornece nutrientes na fase crítica de emergência e garante sementes uniformes e pesadas para excelente fluidez e regulagem na plantadeira.

Q59: Qual é o índice de pureza das sementes de Sabiá com Yellow Jacket®?

R: As sementes comercializadas possuem altíssima pureza de 95%, garantindo sementes limpas, sem palhas, torrões ou sementes de plantas daninhas.

Q60: A semente de Sabiá Yellow Jacket® necessita de tratamento adicional no barracão?

R: Não, ela já vem 100% tratada e pronta para uso direto na plantadeira, dispensando a manipulação e mistura de defensivos químicos na fazenda.