Base de Conhecimento Oficial: Cultivar Carcará

Guia Técnico-Comercial de Referência (60 Perguntas e Respostas) para Treinamento de Equipe, Suporte Agronômico e Agente de IA

Documento Oficial de Treinamento e Base de Respostas Rápidas | Espécie: Megathyrsus maximus (syn. Panicum maximum) | Cultivar: Carcará (híbrido) | Desenvolvido por: Barenbrug do Brasil

Bloco 1 — Perguntas fundamentais, plantio e manejo (Q1 a Q20)

Conceitos botânicos, recomendações de uso, sistemas de pastejo, taxas e profundidade de semeadura.

Q1: O que é o cultivar Carcará?

R: O Carcará é um cultivar híbrido intraespecífico de Megathyrsus maximus (syn. Panicum maximum) desenvolvido pela Barenbrug do Brasil voltado para intensificação e alta performance forrageira.

Q2: Quais são as recomendações oficiais de uso agronômico do Carcará?

R: É recomendado oficialmente para pastejo direto, produção de silagem e produção de feno pré-secado.

Q3: O Carcará é indicado para bovinos de corte e de leite?

R: Sim, o Carcará é indicado para ambos os sistemas de criação de bovinos em pastejo (leite e corte).

Q4: O cultivar pode ser utilizado em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP)?

R: Sim, ele é recomendado para sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) devido à sua alta produção de forragem e adaptabilidade.

Q5: O Carcará possui aceitabilidade por equinos?

R: Sim, testes de validação em fazendas comerciais registraram boa aceitabilidade da forragem por equinos.

Q6: Qual é o hábito de crescimento da planta?

R: O cultivar apresenta hábito de crescimento ereto.

Q7: Qual é o sistema de pastejo recomendado para o Carcará?

R: Recomenda-se estritamente o sistema de pastejo rotacionado, devido à sua alta exigência em manejo e fertilização do solo.

Q8: O pastejo contínuo é recomendado para o Carcará?

R: Não, o manejo sob pastejo contínuo não é recomendado para o cultivar.

Q9: Qual é a altura de entrada dos animais no pastejo rotacionado?

R: A altura recomendada de entrada dos animais no piquete é entre 70 e 80 cm.

Q10: Qual é a altura de resíduo (saída dos animais) no pastejo rotacionado?

R: A altura recomendada de resíduo para retirada dos animais é entre 35 e 40 cm.

Q11: O que ocorre se o manejo ultrapassar a altura de entrada de 80 cm?

R: Deve-se adotar manejo adequado para não ultrapassar a altura recomendada de 70 a 80 cm nem deixar a pastagem florescer precocemente, preservando a qualidade forrageira.

Q12: Qual é a taxa de semeadura recomendada em condições ideais?

R: Em condições ideais de preparo e adequação de fertilidade do solo, a recomendação oficial é de 8 a 10 kg/ha de sementes.

Q13: Qual é a taxa de semeadura recomendada em condições intermediárias?

R: Em condições intermediárias de implantação, a taxa recomendada é de 12 a 15 kg/ha de sementes.

Q14: Qual é a recomendação de semeadura para condições adversas?

R: A semeadura em condições adversas não é recomendada.

Q15: Qual é a profundidade de semeadura correta para o Carcará?

R: A semente deve ser semeada a uma profundidade de 0,5 a 1,0 cm.

Q16: Quantos dias leva para ocorrer a emergência de plântulas?

R: Com boa umidade no solo, a emergência das plântulas ocorre entre 7 e 21 dias após a semeadura.

Q17: Qual é a janela recomendada para a semeadura do Carcará?

R: A semeadura pode ocorrer durante toda a estação chuvosa, desde que se respeite um período mínimo de 90 dias com chuva antes do fim das águas para pleno estabelecimento.

Q18: Qual é a exigência mínima de precipitação pluviométrica para o cultivar?

R: O cultivar exige uma precipitação mínima de 800 mm anuais.

Q19: Qual é o limite de altitude máxima recomendado para o Carcará?

R: A altitude máxima de cultivo recomendada é de 1.800 metros.

Q20: Quais métodos de plantio foram validados nos ensaios de campo da Fase T?

R: Foram validados os métodos a lanço sem incorporação, lanço incorporado e lanço compactado, todos com taxa experimental de 10 kg/ha.

Bloco 2 — Nutrição de solo, qualidade e desempenho (Q21 a Q35)

Exigências nutricionais de solo, dados bromatológicos de PB e digestibilidade, produção de MS e ganho zootécnico em arrobas.

Q21: Qual é a exigência em fertilidade do solo do Carcará?

R: O Carcará é classificado como uma forrageira de alta exigência em fertilidade de solo.

Q22: Como é o potencial de resposta do Carcará à adubação?

R: Apresenta elevado potencial e alta capacidade de resposta à adubação quando cultivado em solos corrigidos.

Q23: O Carcará pode ser implantado em solos arenosos?

R: Sim, ele pode ser cultivado em solos arenosos e argilosos, desde que sejam feitas as devidas correções de nutrientes via calagem e adubações de estabelecimento e manutenção.

Q24: Quais foram os parâmetros de solo no ensaio de pastejo VCU (Fase G) em Uberlândia/MG?

R: O solo apresentou pH H2O 5,94; P de 6,84 mg/dm^3; K+ de 0,38 cmolc/dm^3; Ca2+ de 1,76 cmolc/dm^3; Mg2+ de 1,02 cmolc/dm^3; Al3+ de 0,00 cmolc/dm^3; H+Al de 2,54 cmolc/dm^3; SB de 3,15 cmolc/dm^3; CTC (T) de 5,69 cmolc/dm^3; V% de 54,20% e saturação por alumínio (m%) de 0,00%.

Q25: Em quais níveis de saturação por bases (V%) o cultivar foi testado nos ensaios sob corte (Fase C)?

R: Foi testado em solos com V% de 52% (Araguaína/TO), 56% (Guaíra/SP), 61% (Carmolândia/TO), 78% (Xinguara/PA) e 93% (Pontes e Lacerda/MT).

Q26: Qual é a amplitude oficial de acúmulo de matéria seca (t/ha/ano) do Carcará?

R: O cultivar produz entre 12,5 e 22,9 toneladas de matéria seca por hectare ao ano (t MS/ha/ano).

Q27: Qual é a faixa oficial de produtividade animal (@/ha/ano) do Carcará?

R: A produtividade animal registrada situa-se entre 15,1 e 27,6 arrobas por hectare ao ano (@/ha/ano).

Q28: Qual foi a vantagem em arrobas do Carcará frente ao cultivar Mombaça no VCU sob pastejo?

R: O Carcará produziu 4,43 @/ha/ano a mais que o Mombaça, representando um acréscimo de 19,1% no ganho por área.

Q29: Qual foi a superioridade do Carcará em acúmulo de forragem total frente ao Mombaça no VCU?

R: O Carcará acumulou 4,15 t MS/ha a mais de forragem total em relação ao Mombaça, superando a testemunha em 22,1%.

Q30: Qual foi o aumento de produção de lâminas foliares frente ao Mombaça?

R: O Carcará produziu 3,87 t MS/ha a mais de lâmina foliar ao ano, superando o Mombaça em 26,0%.

Q31: Qual é o teor de Proteína Bruta (PB) na matéria seca total da forragem?

R: Os teores de Proteína Bruta ao longo do ano na forragem total variam entre 6,9% e 16,6%.

Q32: Qual é o teor de Proteína Bruta (PB) nas lâminas foliares do Carcará?

R: Nas lâminas foliares, o teor de Proteína Bruta atinge entre 8,3% e 19,0%.

Q33: Qual é a digestibilidade da matéria seca total da forragem?

R: A digestibilidade da matéria seca total situa-se entre 63,6% e 66,2%.

Q34: Qual é a digestibilidade específica da matéria seca das lâminas foliares?

R: A digestibilidade das lâminas foliares varia entre 66,4% e 74,6%.

Q35: Como o consumo animal da forragem é classificado oficialmente?

R: O consumo animal da forragem do Carcará é classificado como excelente.

Bloco 3 — Genética, resistência e dados de campo (Q36 a Q55)

Histórico experimental (PM175), tolerâncias climáticas, sanidade (cigarrinhas, lagartas), arquitetura foliar e ensaios regionais.

Q36: Qual foi o código de linhagem experimental do Carcará durante seu desenvolvimento?

R: O cultivar foi avaliado ao longo de todas as etapas de pesquisa sob o código experimental PM175.

Q37: Há quanto tempo a Barenbrug conduziu pesquisas até a validação do Carcará?

R: Foram conduzidos mais de 10 anos de estudos em laboratório e avaliações a campo pelos times de P&D.

Q38: Como o Carcará se posicionou em acúmulo de forragem no ensaio de corte em Guaíra/SP?

R: Ficou em 1° lugar com 16,69 t MS/ha/ano, superando o Mombaça (14,61 t) e o Tanzânia (14,16 t).

Q39: Como o Carcará se posicionou em acúmulo de forragem em solo arenoso em Araguaína/TO?

R: Ficou em 1° lugar no ensaio VCU sob corte com 12,74 t MS/ha/ano, superando o Mombaça (11,63 t) e o Massai (11,56 t).

Q40: Qual produção anual de MS foi registrada no ensaio regional de Xinguara/PA?

R: Registrou acúmulo de 22,87 t MS/ha/ano em solo arenoso de alta fertilidade.

Q41: Qual produção anual de MS foi registrada no ensaio regional de Pontes e Lacerda/MT?

R: Registrou acúmulo de 14,51 t MS/ha/ano em solo argiloso de alta fertilidade.

Q42: Qual produção anual de MS foi registrada no ensaio regional de Carmolândia/TO?

R: Registrou acúmulo de 12,51 t MS/ha/ano em solo argiloso de média fertilidade.

Q43: Como é a resistência do Carcará às cigarrinhas-das-pastagens?

R: O Carcará apresenta resistência moderada a cigarrinhas.

Q44: Quais espécies de cigarrinha foram monitoradas nos ensaios com o cultivar?

R: Foram avaliadas infestações por espécies dos gêneros Notozulia sp. e Mahanarva spp..

Q45: Qual é o nível de tolerância do Carcará à seca?

R: Sua tolerância à seca é classificada oficialmente como média.

Q46: Qual é o período máximo de estiagem sem chuvas tolerado pelo cultivar?

R: O cultivar tolera períodos secos de até 6 meses sem chuvas.

Q47: Como é a produção e velocidade de rebrota do Carcará durante o período seco?

R: O cultivar apresenta menor produção de massa e menor velocidade de rebrotação durante o período de seca.

Q48: Qual é a classificação oficial de tolerância do Carcará à má drenagem do solo?

R: A tolerância oficial à má drenagem é classificada como média.

Q49: O que os testes agronômicos de campo relataram sobre a tolerância ao encharcamento?

R: As avaliações de campo (Fase T) apontaram tolerância superior ao encharcamento temporário em relação a outros materiais.

Q50: Como se comparam as folhas do Carcará com as dos cultivares Massai e Mombaça?

R: O Carcará diferencia-se por apresentar folhas mais largas e maior composição de folhas na massa de forragem.

Q51: Como é a relação folha/colmo e a arquitetura do pasto no Carcará?

R: Possui boa relação folha/colmo e melhor estrutura de dossel forrageiro, o que confere maior facilidade de bocado no pastejo.

Q52: Qual é a densidade de perfilhos por m² registrada na Fase T em São Sepé/RS?

R: Foram registrados 48 perfilhos/m² na primeira avaliação (29/01/2021) e 47 perfilhos/m² na segunda avaliação (26/02/2021).

Q53: Quais ocorrências de pragas e doenças exigem monitoramento preventivo a campo?

R: Ensaios da Fase T relataram ataques pontuais de lagartas (em Pontes e Lacerda/MT), cigarrinhas Mahanarva (em Sapucaia/PA) e manchas foliares.

Q54: Como foi configurado o ensaio oficial de pastejo (Fase G) em Uberlândia/MG?

R: O ensaio foi conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC) com 3 repetições, parcelas de 2,0 hectares e corredores de 3 metros de largura.

Q55: Qual produtividade de sementes genéticas brutas foi obtida sob pivô central na pesquisa?

R: Em colheita com sacos de voal (safra 2018/19), obteve-se produtividade de 425,1 kg/ha sob pivô central, com índice de tetrazólio (TZ) de 84%.

Bloco 4 — Tecnologia de sementes Yellow Jacket® (Q56 a Q60)

Incrustamento tecnológico, pureza mínima de 90%, fungicidas, inseticidas, bioestimulantes e nutrição radicular.

Q56: O que é a tecnologia Yellow Jacket® presente nas sementes do Carcará?

R: É o tratamento de incrustamento industrial exclusivo da Barenbrug que incorpora fungicidas, inseticidas de amplo espectro, nutrientes e bioestimulantes.

Q57: Qual é a taxa de pureza física mínima das sementes de Carcará comercializadas?

R: A pureza mínima garantida é de 90%, muito superior aos 40% mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Q58: Qual é a função dos fungicidas e inseticidas presentes no tratamento Yellow Jacket® ?

R: Os fungicidas protegem contra fungos de armazenamento e doenças de solo, enquanto os inseticidas oferecem proteção prolongada antes, durante e após a emergência contra insetos sugadores e mastigadores.

Q59: Qual é o benefício do bioestimulante contido no pacote tecnológico Yellow Jacket® ?

R: Promove maior crescimento inicial, estimula o enraizamento profundo, desenvolve folhas mais vigorosas e proporciona formação mais rápida do pasto.

Q60: Qual é o papel do complexo de macro e micronutrientes na tecnologia Yellow Jacket® ?

R: Fornece nutrição de partida para as plântulas, promovendo maior produção inicial, melhor qualidade e ampliação da resistência a pragas e doenças.

Síntese da Proposta de Valor

Q: Qual é a proposta de valor central do Panicum híbrido cv. Carcará em uma frase?

R: O Panicum híbrido cv. Carcará é a ferramenta definitiva de intensificação e alta performance forrageira da Barenbrug, entregando excelente adaptabilidade com mais de 10 anos de pesquisa, até 19% de proteína bruta nas folhas e produtividade comprovada de 4,43 arrobas a mais por hectare ao ano frente ao Mombaça.