



**UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA**

Universidad Jesuita

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

PARCIAL PRÁCTICO 2

CICLO LECTIVO 2020

PROFESOR:

- Guibert, Roberto

ALUMNO:

- Bulacio, Baltazar

Segundo Parcial de Regularización - 24/06/2020

Problema 1: Resuelva la ecuación lineal de primer orden:

$$y'(x) + 3y(x) = x \cdot e^{-3x}$$

Con dato inicial $y(0) = \frac{1}{2}$

Resolución:

$$P(x) = 3$$

$$Q(x) = x \cdot e^{-3x}$$

Se realiza la integral de $P(x)$:

$$\int P(x)dx \rightarrow \int 3 dx = 3x$$

Se plantea la fórmula general para la resolución de una ecuación diferencial lineal:

$$y \cdot e^{\int P(x)dx} = \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \right]$$

$$y \cdot e^{3x} = \left[\int x \cdot e^{-3x} \cdot e^{3x} dx \right] \rightarrow y \cdot e^{3x} = \int x dx$$

$$y \cdot e^{3x} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y_g = \frac{\frac{x^2}{2} + C}{e^{3x}}$$

$$y_g = \frac{x^2 \cdot e^{-3x}}{2} + C \cdot e^{-3x} \rightarrow y_g = \frac{x^2 + C}{2 \cdot e^{3x}}$$

Aclaración: la expresión calculada anteriormente es la solución general de la ecuación lineal

Al tener como condición inicial $y(0) = \frac{1}{2}$, se obtiene:

$$y_g = \frac{x^2 \cdot e^{-3x}}{2} + C \cdot e^{-3x} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{0^2 \cdot e^{-3 \cdot 0}}{2} + C \cdot e^{-3 \cdot 0} \rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$y_p = \frac{x^2 \cdot e^{-3x}}{2} + \frac{e^{-3x}}{2}$$

Simplificando a la mínima expresión se obtiene:

$$y_p = \frac{x^2 + 1}{2 \cdot e^{3x}}$$

Respuesta


La solución particular de la ecuación diferencial es:

$$y_p = \frac{x^2 + 1}{2 \cdot e^{3x}}$$

Problema 2: Calcule la circulación del campo:

$$\vec{F} = (e^y - y)\hat{i} + \left(\frac{1}{2}x^2 + (x + y) \cdot e^y\right)\hat{j}$$

A lo largo de la curva C que se muestra en la siguiente figura:



Resolución:

Para la resolución del problema se debe realizar el problema en coordenadas polares, por ende se plantea lo siguiente:

$$x = r \cdot \cos \theta \quad y = r \cdot \sin \theta$$

Para obtener los límites de integración, primero se deben observar los radios de las distintas circunferencias. En este caso se visualizan dos radios, $r = 1$ y $r = 2$.

Por lo tanto los límites de integración de r se definen de la siguiente manera:

$$1 \leq r \leq 2$$

Para obtener los límites de integración de θ , se puede observar en el gráfico que las dos circunferencias están limitadas por las rectas a 45 grados ($y = x$) y a 135 grados ($y = -x$)

$$45^\circ \rightarrow \frac{\pi}{4} \quad 135^\circ \rightarrow \frac{3\pi}{4}$$

Por lo tanto los límites de integración de θ se definen de la siguiente manera:

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$$

Se puede realizar el ejercicio utilizando el teorema de Green debido a que se cumplen las siguientes condiciones:

- La superficie contenida dentro de la curva cerrada es simplemente conexa.
- El sentido de la curva es antihorario

Resolviendo con el teorema de Green, se plantea lo siguiente:

$$I = \oint_D \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$I = \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

$$I = \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} ((x + e^y) - (e^y - 1)) r \cdot d\theta \cdot dr$$

$$I = \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (x + 1) r \cdot d\theta \cdot dr$$

Aquí se debe reemplazar a "x" por " $r \cdot \cos \theta$ ". Por lo tanto queda lo siguiente:

$$I = \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (r \cdot \cos \theta + 1) r \cdot d\theta \cdot dr$$

$$I = \int_1^2 (r^2 \cdot \cos \theta + r \cdot \theta) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} dr$$

$$I = \int_1^2 \left(r^2 \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + r \cdot \frac{3\pi}{4} \right) - \left(r^2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + r \cdot \frac{\pi}{4} \right) dr$$

$$I = \int_1^2 \left(r^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + r \cdot \frac{3\pi}{4} - r^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - r \cdot \frac{\pi}{4} \right) dr$$

$$I = \int_1^2 \left(r \cdot \frac{3\pi}{4} - r \cdot \frac{\pi}{4} \right) dr$$

$$I = \int_1^2 \left(\frac{\pi \cdot r}{2} \right) dr$$

$$I = \left(\frac{\pi \cdot r^2}{4} \right) \Big|_1^2$$

$$I = \left(\frac{\pi \cdot 2^2}{4} \right) - \left(\frac{\pi \cdot 1^2}{4} \right)$$

$$I = \left(\frac{4 \cdot \pi}{4} \right) - \left(\frac{\pi}{4} \right) \rightarrow I = \frac{3\pi}{4}$$

Respuesta

La circulación de campo a lo largo de la curva C tiene un valor de $\frac{3\pi}{4}$


Problema 3: Calcular el volumen subtendido por la función:

$$f(x, y) = x \cdot y^2$$

Sobre el triángulo con vértices en los puntos (0,0), (1,2) y (2,2)

Resolución:

Para poder resolver este ejercicio se debe realizar el gráfico, el cuál es el siguiente:



Visualizando el gráfico, se puede concluir que la región de integración es una región del tipo 2.

Por lo tanto, los límites de integración para “y” serán los siguientes:

$$0 \leq y \leq 2$$

Los límites de integración para “x”, serán funciones en “y”, por lo tanto se deben obtener las rectas ubicadas en el gráfico:

$$\text{Recta 1} \rightarrow (0,0) \text{ a } (1,2)$$

$$(1,2) - (0,0) = (1,2)$$

$$(x,y) = (0,0) + t \cdot (1,2)$$

$$x = t \quad y = 2t \rightarrow t = \frac{y}{2}$$

Se igualan los “t” y se obtiene la ecuación de la recta;

$$x = \frac{1}{2}y$$

$$\text{Recta 2} \rightarrow (0,0) \text{ a } (2,2)$$

$$(2,2) - (0,0) = (2,2)$$

$$(x,y) = (0,0) + t \cdot (2,2)$$

$$x = 2t \rightarrow t = \frac{x}{2} \quad y = 2t \rightarrow t = \frac{y}{2}$$

Se igualan los “t” y se obtiene la ecuación de la recta;

$$\frac{1}{2}x = \frac{1}{2}y \rightarrow x = y$$

Definiendo los límites de integración para “x”;

$$\frac{y}{2} \leq x \leq y$$

Planteando la integral doble queda:

$$V = \int_0^2 \int_{\frac{y}{2}}^y x \cdot y^2 dx dy$$

$$V = \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} \cdot y^2 \right) \Big|_{\frac{y}{2}}^y dy$$

$$V = \int_0^2 \left(\frac{y^2}{2} \cdot y^2 \right) - \left(\frac{\left(\frac{y}{2}\right)^2}{2} \cdot y^2 \right) dy$$

$$V = \int_0^2 \left(\frac{y^4}{2} - \frac{y^4}{8} \right) dy$$

$$V = \int_0^2 \frac{3}{8} y^4 dy$$

$$V = \int_0^2 \frac{3 \cdot y^5}{40} dy$$

$$V = \left(\frac{3 \cdot y^5}{40} \right) \Big|_0^2$$

$$V = \left(\frac{3 \cdot 2^5}{40} \right) - \left(\frac{3 \cdot 0^5}{40} \right)$$

$$V = \left(\frac{96}{40} \right) \rightarrow V = \frac{12}{5}$$

Respuesta

El volúmen subtendido por la función tiene un valor de $\frac{12}{5}$.