


Rappels (regarder le tableau aussi)

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- N'oubliez vos noms en toutes les feuilles, les unités, des flèches au-dessus des vecteurs, etc.
- Norme produit vectoriel: $|\vec{a} \wedge \vec{b}| = \|a\| \|b\| \sin \theta(\vec{a}, \vec{b})$.
- Si $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est dite une base orthonormée directe, on a: $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$, $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$, $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.




- Repère de Frenet : $\dot{s} = \|\vec{v}\|$, $\vec{v} = \dot{s}\vec{T}$ et $\vec{a} = \ddot{s}\vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{N}$
- Moment d'une force par rapport à O : $\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}$

Q1 Produit vectoriel (7pts)

La force électromagnétique appliquée à une particule M de charge q , vitesse \vec{v} , dans un champ électrique \vec{E} et champ magnétique \vec{B} est donné par $\vec{f}_{EM} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. On pose $\vec{f}_E = q\vec{E}$, $\vec{f}_M = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$. On va considérer que q est **négligeable** et $\vec{E} = -E\vec{u}_y$, $\vec{B} = B\vec{u}_x$, $\vec{v} = -v\vec{u}_z$, avec E, B et v nombres réels **positifs**.

- (1,0pt) Placer le troisième vecteur de la base cartésienne à l'origine des plans Oxy et Oxz (rappel: utilisez la notation \otimes ou \odot , respectivement des vecteurs rentrant ou sortant du plan.). Vous pouvez répondre sur le sujet ou recopier ces figures dans votre feuille de réponse.
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs \vec{v} , \vec{B} et \vec{E} (obs: dans les deux plans, la taille des flèches n'est pas important).
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs \vec{f}_E et \vec{f}_M (même observations que b)).
- (1,5pts) Calculer l'expression de \vec{f}_{EM} en fonction de q, E, B et v .
- (1,5pts) Calculer le moment de \vec{f}_{EM} par rapport à O quand la particule se trouve dans la position générique $O\vec{M} = a\vec{u}_x + b\vec{u}_y + c\vec{u}_z$.

**Q2 : le skieur (13pts)**

Un skieur de masse m monte une colline jusqu'à son sommet, et puis il redescend de l'autre côté de la colline. Les équations paramétriques $x(t) = ct$, $y(t) = at^2 + bt$ permettent de décrire son mouvement, avec les constantes $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$. Les forces importantes sont \vec{R}_N , la réaction normale, \vec{P} , le poids, et \vec{f} , une force de propulsion ou de freinage appliquée par le skieur, toujours tangentielle au mouvement. La norme de l'accélération de la pesanteur est notée g , tel que $\vec{g} = -g\vec{u}_y$ pointe vers le bas. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement en repère de Frenet.

- (1,0pt) Déterminez l'équation de la trajectoire $y = y(x)$. Quel est le nom de cette courbe?
- (1,5pt) Dessiner la trajectoire à partir de $t = 0s$ et jusqu'à l'instant t_f lorsqu'il arrive à la fin de la colline, c'est-à-dire, quand il revient à $y = 0$. Déterminez t_f et la position (x, y) du sommet.
- (1,25pt) Dessiner les vecteurs \vec{T} et \vec{N} de la base de Frenet en trois instants: i) avant le sommet, ii) sur le sommet et iii) après le sommet.
- (1,75pt) Déterminer $\vec{v}(t)$ et \vec{T} en coordonnées cartésiennes.
- (1,25pt) Déterminer $\vec{a}(t)$ en coordonnées cartésiennes.
- (1,5pt) Calculer $\dot{s}(t)$ et $\ddot{s}(t)$.
- (1,75pt) Appliquer le PFD en repère de Frenet quand le skieur se trouve au sommet de la colline. On va supposer que le rayon de courbature R_c à ce point est connu.
- (1,5pt) Déterminer le rayon de courbure R_c , en particulier au sommet de la trajectoire.
 - (1,5pt) Déterminer les conditions nécessaires sur la constante c (si aucune) tel que le skieur ne décolle pas au sommet de la colline (obs: d'abord, il faut réfléchir à ce qui se passe pour de la réaction normale).