

# Lógica de predicados

Clase 04

IIC 1253

Prof. Cristian Riveros

# Lógica proposicional y sus limitaciones

Todos los hombres son mortales.

Sócrates es hombre.

---

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

¿cómo podemos modelar esta deducción en **lógica proposicional**?

# Lógica proposicional y su poder expresivo

Todo número natural es par o impar

2 no es impar

---

Por lo tanto, 2 es par

¿cómo podemos modelar esta deducción en **lógica proposicional**?

¿qué le falta a la lógica proposicional?

- objetos (no solo proposiciones).
- predicados.
- cuantificadores: **para todo** ( $\forall$ ) o **existe** ( $\exists$ ).

# Lógica de predicados

Lógica de predicados  $\subseteq$  Lógica de primer orden

Lógica nos permitirá expresar propiedades de estructuras como:

- Números naturales.
- Enteros, racionales, reales, etc.
- Grafos, árboles, palabras, etc.
- Estructuras en general.

Podremos definir propiedades como:

- Para todo número  $n$ , existe un  $m$  tal que  $n \geq m$ .
- Para todo vértice  $v_1$  y  $v_2$ , si  $(v_1, v_2) \in E$ , entonces  $(v_2, v_1) \in E$ .

# Outline

Predicados

Cuantificadores

# Outline

Predicados

Cuantificadores

# Predicados

## Ejemplos

1.  $x$  es par

2.  $x \leq y$

3.  $x + y = z$

¿cuál de estos ejemplos son **proposiciones**?

Ninguno!!

Pero, si reemplazamos las **variables** por objetos obtenemos **proposiciones**:

1. 2 es par, 3 es par, ...

2.  $2 \leq 3$ ,  $6 \leq 0$ ,  $10 \leq 5$ , ...

3.  $10 + 5 = 15$ ,  $3 + 8 = 1$ , ...

# Predicados

## Definición

- Un **predicado**  $P(x)$  es una afirmación abierta, cuyo valor de verdad depende del objeto en el cual es evaluado.

## Ejemplos

- $P(x) := x$  es par
- $R(x) := x$  es primo
- $M(x) := x$  es mortal



# Predicados

## Definición

- Un **predicado**  $P(x)$  es una afirmación abierta, cuyo valor de verdad depende del objeto en el cuál es evaluado.
- Para un predicado  $P(x)$  y un valor  $a$ , la **valuación**  $P(a)$  es el valor de verdad del predicado  $P(x)$  en  $a$ .

¿cuál es el valor de verdad de las siguientes valuaciones?

- $P(x) := x$  es par
- $R(x) := x$  es primo
- $M(x) := x$  es mortal

$P(2)$

$P(3)$

$R(31)$

$M(\text{Socrates})$

$M(\text{Zeus})$

# Predicados n-arios

## Definición

- Un **predicado n-ario**  $P(x_1, \dots, x_n)$  es una afirmación con  $n$  variables, cuyo valor de verdad depende de los objetos en el cuál es evaluado.
- Para un predicado  $P(x_1, \dots, x_n)$  y valores  $a_1, \dots, a_n$ , la **valuación**  $P(a_1, \dots, a_n)$  es el valor de verdad de  $P$  en  $a_1, \dots, a_n$ .

¿cuál es el valor de verdad de las siguientes valuaciones?

- $O(x, y) := x \leq y$
- $S(x, y, z) := x + y = z$
- $Padre(x, y) := x$  es padre de  $y$

$O(2, 3)$        $S(5, 10, 15)$        $S(4, 12, 1)$        $Padre(\text{Homero}, \text{Bart})$

¿cuál es el valor de verdad de  $O(\frac{2}{3}, \frac{4}{7})$ ? ¿ $O(\text{Homero}, \text{Bart})$ ?

# Predicados y dominio

## Definición

- Un **predicado n-ario**  $P(x_1, \dots, x_n)$  es una afirmación con  $n$  variables, cuyo valor de verdad depende de los objetos en el cuál es evaluado.
- Para un predicado  $P(x_1, \dots, x_n)$  y valores  $a_1, \dots, a_n$ , la **valuación**  $P(a_1, \dots, a_n)$  es el valor de verdad de  $P$  en  $a_1, \dots, a_n$ .
- Todos los predicados están restringidos a un **dominio** de evaluación.

## Ejemplos de predicados y sus dominios

- $O(x, y) := x \leq y$  sobre  $\mathbb{N}$
- $S(x, y, z) := x + y = z$  sobre  $\mathbb{Q}$
- $Padre(x, y) := x$  es padre de  $y$  sobre todas las personas

# Predicados y dominio

## Definición

- Un **predicado n-ario**  $P(x_1, \dots, x_n)$  es una afirmación con  $n$  variables, cuyo valor de verdad depende de los objetos en el cuál es evaluado.
- Para un predicado  $P(x_1, \dots, x_n)$  y valores  $a_1, \dots, a_n$ , la **valuación**  $P(a_1, \dots, a_n)$  es el valor de verdad de  $P$  en  $a_1, \dots, a_n$ .
- Todos los predicados están restringidos a un **dominio** de evaluación.

## Notación

- Para un predicado  $P(x_1, \dots, x_n)$ , diremos que  $x_1, \dots, x_n$  son las **variables libres** de  $P$ .
- Un predicado **0-ario** es un predicado sin variables y tiene valor de verdad verdadero o falso sin importar la valuación.

# Predicados compuestos (o formulas)

## Definición

Un predicado es **compuesto** si es un predicado básico, o la negación ( $\neg$ ), conjunción ( $\wedge$ ), disyunción ( $\vee$ ), condicional ( $\rightarrow$ ), bicondicional ( $\leftrightarrow$ ) de predicados compuestos sobre el **mismo dominio**.

El **valuación** de un predicado **compuesto** corresponde a la valuación recursiva de sus conectivos lógicos y predicados básicos.

## Ejemplos

Para los predicados  $P(x) := x$  es par y  $O(x, y) := x \leq y$  sobre  $\mathbb{N}$ :

- $P'(x) := \neg P(x)$
- $O'(x, y, z) := O(x, y) \wedge O(y, z)$
- $P''(x, y) := (P(x) \wedge P(y)) \rightarrow O(x, y)$

# Outline

Predicados

Cuantificadores

# Cuantificador universal

Sea  $P(x, y_1, \dots, y_n)$  un predicado compuesto con dominio  $D$ .

## Definición

- Definimos el cuantificador **universal**:

$$P'(y_1, \dots, y_n) := \forall x. P(x, y_1, \dots, y_n)$$

donde  $x$  es la **variable cuantificada** y  $y_1, \dots, y_n$  son las **variables libres**.

- Para  $b_1, \dots, b_n$  en  $D$ , definimos la valuación:

$$P'(b_1, \dots, b_n) = 1$$

si **para todo**  $a$  en  $D$  se tiene que  $P(a, b_1, \dots, b_n) = 1$ , y 0 en otro caso.

# Cuantificador universal (ejemplos)

## Definición

Para  $b_1, \dots, b_n$  en  $D$  y  $P'(y_1, \dots, y_n) := \forall x. P(x, y_1, \dots, y_n)$ , definimos:

$$P'(b_1, \dots, b_n) = 1$$

si **para todo**  $a$  en  $D$  se tiene que  $P(a, b_1, \dots, b_n) = 1$ , y 0 en otro caso.

## Ejemplos

Para los predicados  $P(x) := x$  es par y  $O(x, y) := x \leq y$  sobre  $\mathbb{N}$ :

- $O'(y) := \forall x. O(x, y)$   $O'(2) = \forall x. O(x, 2)$
- $O''(x) := \forall y. O(x, y)$   $O''(0) = \forall y. O(0, y)$
- $P_0 := \forall x. P(x)$
- $P'_0 := \forall x. (P(x) \vee \neg P(x))$



# Cuantificador existencial

Sea  $P(x, y_1, \dots, y_n)$  un predicado compuesto con dominio  $D$ .

## Definición

- Definimos el cuantificador **existencial**:

$$P'(y_1, \dots, y_n) := \exists x. P(x, y_1, \dots, y_n)$$

donde  $x$  es la **variable cuantificada** y  $y_1, \dots, y_n$  son las **variables libres**.

- Para  $b_1, \dots, b_n$  en  $D$ , definimos la valuación:

$$P'(b_1, \dots, b_n) = 1$$

si **existe**  $a$  en  $D$  tal que  $P(a, b_1, \dots, b_n) = 1$ , y 0 en otro caso.

# Cuantificador existencial (ejemplos)

## Definición

Para  $b_1, \dots, b_n$  en  $D$  y  $P'(y_1, \dots, y_n) := \exists x. P(x, y_1, \dots, y_n)$ , definimos:

$$P'(b_1, \dots, b_n) = 1$$

si **existe**  $a$  en  $D$  tal que  $P(a, b_1, \dots, b_n) = 1$ , y 0 en otro caso.

## Ejemplos

Para los predicados  $P(x) := x$  es par y  $O(x, y) := x \leq y$  sobre  $\mathbb{N}$ :

- $O'(y) := \exists x. O(x, y)$   $O'(2) = \exists x. O(x, 2)$
- $O''(x) := \exists y. O(x, y)$   $O''(2) = \exists y. O(2, y)$
- $O'''(x, y) := \exists z. O(x, z) \wedge O(z, y)$   $O'''(1, 2)$
- $P_0 := \exists x. P(x)$

# Interpretación de cuantificadores

Sea  $P(x)$  un predicado compuesto sobre el **dominio**  $D = \{a_1, a_2, \dots\}$ .

Los cuantificadores **universal** y **existencial** se pueden “interpretar” como:

$$\forall x. P(x) \quad := \quad P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge P(a_3) \wedge \dots \quad = \quad \bigwedge_{i=1}^{\infty} P(a_i)$$

$$\exists x. P(x) \quad := \quad P(a_1) \vee P(a_2) \vee P(a_3) \vee \dots \quad = \quad \bigvee_{i=1}^{\infty} P(a_i)$$

# Es posible combinar cuantificadores

¿qué significan las siguientes formulas?

Para los predicados  $P(x) := x \text{ es par}$  y  $O(x, y) := x \leq y$  sobre  $\mathbb{Z}$ :

- $\forall x. \forall y. O(x, y)$
- $\exists x. \exists y. O(x, y)$
- $\forall x. \exists y. O(x, y)$
- $\exists x. \forall y. O(x, y)$
- $\forall x. P(x) \rightarrow \exists y. O(x, y)$

# Predicados compuestos (con cuantificadores)

## (re)Definición

Decimos que una predicado es **compuesto** (o también formula) si es:

- un predicado básico,
- la negación ( $\neg$ ), conjunción ( $\wedge$ ), disyunción ( $\vee$ ), condicional ( $\rightarrow$ ), bicondicional ( $\leftrightarrow$ ) de predicados compuestos sobre el mismo dominio o
- la cuatificación **universal** ( $\forall$ ) o **existencial** ( $\exists$ ) de un pred. compuesto.

El **valuación** de un predicado **compuesto** corresponde a la valuación recursiva de sus cuantificadores, conectivos lógicos y predicados básicos.

# Predicados compuestos (mas ejemplos)

¿qué representan las siguientes formulas?

Para los predicados  $x \leq y$ ,  $x = y$ , e  $x + y = z$  sobre  $\mathbb{Z}$ :

- $C(x) := x + x = x$
- $L(x, y) := x \leq y \wedge \neg(x = y)$
- $S(x, y) := L(x, y) \wedge \neg \exists z. (L(x, z) \wedge L(z, y))$
- $U(x) := \exists y. S(y, x) \wedge C(y)$
- $I := \forall x. \exists y. \exists z. x + y = z \wedge C(z)$