

Nome: GABARITO

Matrícula: _____

- Responda às questões individualmente.
- O uso do computador é exclusivo para o GNU Octave disponível no sistema operacional Ubuntu logado na conta Prova.
- Não use rotinas prontas além das já disponíveis no GNU Octave instalado.
- As questões são de múltipla escolha, nelas, assinale com X a alternativa correta.

FÓRMULAS

Derivação e Integração

Fórmulas de Diferenças Finitas

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h) \\f'(x) &= \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h) \\f'(x) &= \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h} + O(h^2) \\f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \\f'(x) &= \frac{f(x-2h) - 4f(x-h) + 3f(x)}{2h} + O(h^2)\end{aligned}$$

Regra do Ponto Médio

$$\int_a^b f(x) dx = hf\left(\frac{a+b}{2}\right) + O(h^3)$$

Regra do Trapézio

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + O(h^3)$$

Regra de Simpson

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] + O(h^5)$$

Integração de Romberg

$$\begin{aligned}R_{1,1} &= \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] \\R_{k,1} &= \frac{1}{2} \left[R_{k-1,1} + \frac{h}{2^{k-2}} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f\left(a + (2i-1)\frac{h}{2^{k-1}}\right) \right], \quad k > 1 \\R_{k,j} &= R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}\end{aligned}$$

Quadratura de Gauss

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{j=1}^n w_j f(x_j)$$

n	x_j	w_j
1	0	2
2	$\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$	1
3	0 $\pm \sqrt{\frac{3}{5}}$	$\frac{8}{9}$ $\frac{5}{9}$
4	$\pm \sqrt{(3 - 2\sqrt{6/5})/7}$ $\pm \sqrt{(3 + 2\sqrt{6/5})/7}$	$\frac{18 + \sqrt{30}}{36}$ $\frac{18 - \sqrt{30}}{36}$

Problemas de Valor Inicial

$$y' = f(y, t), \quad t > a, \quad y(a) = y_a$$

Método de Euler

$$\begin{aligned}y^{(1)} &= y_a, \\y^{(k+1)} &= y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)})\end{aligned}$$

Método de Euler Melhorado

$$\begin{aligned}y^{(1)} &= y_a, \\\bar{y}^{(k+1)} &= y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)}), \\y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{h}{2} [f(y^{(k)}, t^{(k)}) + f(\bar{y}^{(k+1)}, t^{(k+1)})]\end{aligned}$$

Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

$$\begin{aligned}y^{(1)} &= y_a \\y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \\k_1 &= hf(y^{(k)}, t^{(k)}) \\k_2 &= hf(y^{(k)} + k_1/2, t^{(k)} + h/2) \\k_3 &= hf(y^{(k)} + k_2/2, t^{(k)} + h/2) \\k_4 &= hf(y^{(k)} + k_3, t^{(k)} + h)\end{aligned}$$

Método de Adams-Bashforth de 2ª Ordem

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + \frac{h}{2} [3f(y^{(k)}, t^{(k)}) - f(y^{(k-1)}, t^{(k-1)})]$$

Método de Adams-Bashforth de 3ª Ordem

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + \frac{h}{12} [23f(y^{(k)}, t^{(k)}) - 16f(y^{(k-1)}, t^{(k-1)}) + 5f(y^{(k-2)}, t^{(k-2)})]$$

Método de Adams-Bashforth de 4ª Ordem

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{h}{24} [55f(y^{(k)}, t^{(k)}) - 59f(y^{(k-1)}, t^{(k-1)}) \\&\quad + 37f(y^{(k-2)}, t^{(k-2)}) - 9f(y^{(k-3)}, t^{(k-3)})]\end{aligned}$$

Método de Adams-Moulton de 4ª Ordem

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{h}{24} [9f(y^{(k+1)}, t^{(k+1)}) + 19f(y^{(k)}, t^{(k)}) \\&\quad - 5f(y^{(k-1)}, t^{(k-1)}) + f(y^{(k-2)}, t^{(k-2)})]\end{aligned}$$

Tabela 1

i	1	2	3	4	5
x	-0,20	-0,16	-0,12	-0,08	-0,04
$y_i = f(x_i)$	0,961	0,975	0,986	0,994	0,998

Questão 1 (1,0 Ponto). Considere a seguinte função:

$$f(x) = \frac{\sin(x^2 - 1) + \cos(x)}{\sin(x)^4 + \cos(x)^4}.$$

Calcule a aproximação da $f'(1)$ usando a fórmula de diferenças finitas regressiva de ordem 2 (i.e. com erro de truncamento de ordem h^2) com $h = 0,03$. Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $7,8436048 \times 10^{-1}$
b) $7,8436137 \times 10^{-1}$
c) $7,8435951 \times 10^{-1}$
d) $7,8435740 \times 10^{-1}$
e) $7,8436318 \times 10^{-1}$

Questão 2 (1,0 Ponto). Considere o conjunto de pontos $\{(x_i, y_i = f(x_i))\}_{i=1}^5$ dado na Tabela 1. Seja, também, $D_{+,h}f(x)$ a aproximação de $f'(x)$ dada pela fórmula de diferenças progressiva de ordem 1 (i.e. com erro de truncamento de ordem h). Calcule o valor de $(D_{+,h}f(-0,16) + D_{+,h}f(-0,08))/\pi$ e assinale a alternativa que corresponde a este valor com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $1,1936621 \times 10^{-1}$
b) $1,1936677 \times 10^{-1}$
c) $1,1936103 \times 10^{-1}$
d) $1,1935893 \times 10^{-1}$
e) $1,1935855 \times 10^{-1}$

Questão 3 (1,0 Ponto). Considere a seguinte função:

$$f(x) = \frac{\sin(x^2 - 1) + \cos(x)}{\sin(x)^4 + \cos(x)^4}.$$

Calcule a aproximação de:

$$\int_{-1,5}^{-0,5} f(x) dx$$

dada pela regra de Simpson (simples). Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $8,3628001 \times 10^{-1}$
b) $8,3627148 \times 10^{-1}$
c) $8,3627225 \times 10^{-1}$
d) $8,3628684 \times 10^{-1}$
e) $8,3627717 \times 10^{-1}$

Questão 4 (1,0 Ponto). Considere o conjunto de pontos $\{(x_i, y_i = f(x_i))\}_{i=1}^5$ dado na Tabela 1. Calcule a aproximação de:

$$\int_{-0,20}^{-0,04} f(x) dx$$

dada pela regra do ponto médio composta com 2 subintervalos. Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 5 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $1,5752 \times 10^{-1}$
b) $1,5669 \times 10^{-1}$
c) $1,5686 \times 10^{-1}$
d) $1,5725 \times 10^{-1}$
e) $1,5730 \times 10^{-1}$

Questão 5 (1,0 Ponto). Calcule a aproximação de:

$$\int_{-2}^{-1} \frac{\sin(x^2 - 1) + \cos(x)}{\sin(x)^4 + \cos(x)^4} dx$$

dada pela regra do trapézio composta com 7 subintervalos. Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $7,9867580 \times 10^{-1}$
b) $7,9868090 \times 10^{-1}$
c) $7,9868247 \times 10^{-1}$
d) $7,9867439 \times 10^{-1}$
e) $7,9868335 \times 10^{-1}$

Questão 6 (1,0 Ponto). Calcule a aproximação de:

$$\int_{-2}^0 \frac{\sin(x^2 - 1) + \cos(x)}{\sin(x)^4 + \cos(x)^4} dx$$

dada pela quadratura de Gauss-Legendre de 2 pontos composta com 2 subintervalos (i.e. divida o intervalo de integração em 2 subintervalos de mesmo tamanho). Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) 1,2612993
b) 1,2613050
c) 1,2612894
d) 1,2613088
e) 1,2612895

Questão 7 (1,0 Ponto). Considere o seguinte problema de valor inicial:

$$t^2 \frac{dy}{dt} = \sin(2t) - 2ty, \quad t > 1,1, \\ y(1,1) = 2.$$

Use o método de Euler com $h = 0,02$ para computar o valor aproximado de $y(2)$. Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $6,0198536 \times 10^{-1}$
b) $6,0197940 \times 10^{-1}$
c) $6,0198460 \times 10^{-1}$
d) $6,0198602 \times 10^{-1}$
e) $6,0197892 \times 10^{-1}$

Questão 8 (1,0 Ponto). Considere o seguinte problema de valor inicial:

$$t^2 \frac{dy}{dt} = \sin(2t) - 2ty, \quad t > 1,1, \\ y(1,1) = 2.$$

Use o método de Adams-Bashforth de 4ª ordem com $h = 0,02$ para computar o valor aproximado de $y(2)$. Inicialize-o pelo método de Euler melhorado. Assinale a alternativa que corresponde a aproximação de $y(2)$ com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $6,1315217 \times 10^{-1}$
b) $6,1314306 \times 10^{-1}$
c) $6,1316096 \times 10^{-1}$
d) $6,1315336 \times 10^{-1}$
e) $6,1314669 \times 10^{-1}$

Questão 9 (1,0 Ponto). Considere o seguinte problema de valor inicial:

$$t^2 \frac{dy}{dt} = \sin(2t) - 2ty, \quad t > 1,1, \\ y(1,1) = 2.$$

Use o método de Runge-Kutta de quarta ordem com $h = 0,02$ para computar o valor aproximado de $y(2)$. Assinale a alternativa que corresponde a este valor com 8 dígitos significativos por arredondamento.

- ☒ a) $6,1314282 \times 10^{-1}$
b) $6,1313438 \times 10^{-1}$
c) $6,1315176 \times 10^{-1}$
d) $6,1314282 \times 10^{-1}$
e) $6,1315067 \times 10^{-1}$

Questão 10 (1,0 Ponto). Considere que o método de diferenças finitas seja usado para resolver o seguinte problema de valor de contorno:

$$-u_{xx} - u_x = f(x), \quad 0 < x < 1, \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0.$$

Considere, também, que as fórmulas de diferenças finitas centrais de ordem 2 sejam usadas para discretizar as derivadas na equação diferencial. Então, usando uma malha uniforme de $n = 11$ pontos, este problema fica aproximado por um problema discreto da forma $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, onde A é a matriz 11×11 deste problema linear, $\mathbf{b} = (0, f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_{n-1}), 0)$ o vetor dos termos constantes associado e $\mathbf{u}_i \approx u(x_i)$ nos pontos da malha $x_i = (i-1)h$, $h = 1/(n-1)$. Assinale a alternativa que corresponde ao elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz A .

- ☒ a) $-\frac{1}{h^2} - \frac{1}{2h}$
b) $-\frac{1}{h^2} + \frac{1}{2h}$
c) 0
d) $-\frac{2}{h^2} + \frac{1}{2h}$
e) $-\frac{2}{h^2} - \frac{1}{2h}$