

40-100
5-4

40-100
8-4

Estadística

Pag 83

1. (a) n° classes $= \sqrt{K} \rightarrow \sqrt{40} \approx 6 \rightarrow 5$ ou 6 classes
 $K = n^{\circ}$ de elementos

Limita	X_i	f_i	$f_i\%$	F_i	$F_i\%$
72,5-73,5	73	5	12,5	5	12,5
73,5-74,5	74	9	22,5	14	35,0
74,5-75,5	75	15	37,5	29	70,1
75,5-76,5	76	5	12,5	34	85,1
76,5-77,5	77	6	15,5	40	100,1

$X_i \rightarrow$ ponto médio

amplitude = $max - min$

$f_i \rightarrow$ frequência absoluta

$$77,5 - 72,5 = 4,6$$

$f_i\% \rightarrow$ frequência percentual

$F_i \rightarrow$ frequência acumulada


$$largura = A/K$$

$F_i\% \rightarrow$ frequência acumulada percentual

$$4,6/6 \approx 0,77 \rightarrow 1$$

arredondando

tilibra



c) $Q_1 \sim \frac{1(40+1)}{4} = 10 \text{ posição (25\% menores)} \rightarrow 74,2$

$Q_2 \sim \frac{2(40+1)}{4} = 20 \text{ e a } 2 \text{ (mediana)} \rightarrow \frac{74,7 + 74,7}{2} = 74,7$

$Q_3 \sim \frac{3(40+1)}{4} = 30 \text{ posição (75\% maiores)} \rightarrow 75,6$

72,9 / 73,2 / 73,3 / 73,4 / 73,4 / 73,5 / 73,6 / 74,0 / 74,1 / 74,2 / 74,3 / 74,3 / 74,4 /
74,4 / 74,5 / 74,6 / 74,6 / 74,7 / 74,7 / 74,7 / 74,7 / 74,7 / 74,8 / 74,8 / 74,9 / 75,0 /
75,0 / 75,1 / 75,1 / 75,6 / 75,8 / 75,9 / 76,0 / 76,0 / 76,5 / 76,8 / 77,0 / 77,1 / 77,3

77,5



d)

72,9

74,2

74,7

75,6

77,5

72

73

74

75

76

77

78