SIGNOS DE ALARMA DESPUÉS DE UNA CAIDA

FRACTURA EVIDENTE

HEMORRAGIA INTENSA

DOLOR

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO

INFLAMACIÓN

PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN SIGNO DE ALARMA, ASISTIR A CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO

Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina
Servicio de Salud Ñuble

Ministerio de Salud

Prevención de Caidas

HODOM HSC

*Se estima que **uno de cada tres Adultos Mayores** sufre una o más caídas al año.*

Las caidas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad, mortalidad y dependencia.

Pues, el temor de volver a caer puede provocar limitación en la realización de las actividades de la vida diaria como: levantarse, deambular al interior de la casa, salir al exterior, aumentando el grado de dependencia.

Condiciones del ambiente

- *EDAD: Debido a la disminución de reflejos y aparición de rigidez, inestabilidad- balanceo al andar, problemas visuales o disminución de la audición*
- *ENFERMEDADES CRÓNICAS: Aquellas mal controladas o descompensadas.*
- *ENFERMEDADES AGUDAS: Aquellas de inicio súbito.*
- *MEDICAMENTOS: Administrar de acuerdo a indicación médica. NO AUTOMEDICARSE.*
- *ESTADO MENTAL Y COGNITITVO: Problemas de memoria, de atención, alucinaciones, concentración y confusión, entre otros.*
- *DÉFICIT EN RED DE APOYO: Es vital contar con redes de familiares, amigos y/o cuidadores.*

¿Cómo prevenir las caídas en el domicilio?

- *Evitar alfombras móviles.*
- *Evitar suelos irregulares, resbaladizos, con desniveles o escalones muy altos.*
- *Iluminación adecuada, en especial en la noche.*
- *Evitar pantuflas.*
- *Usar calzado firme y cómodo.*
- *Evaluar la necesidad de instalar barras de sujeción en baños y pasillos.*
- *Evitar que muebles o artefactos bloqueen los pasillos.*
- *Usar los dispositivos de apoyo indicados, tales como bastones, andadores o lentes y audífonos.*
- *Mantener catres clínicos con barandas arriba, cama baja aprox 60 cm desde el suelo.*
- *Vigilancia y supervisión por familiares.*