EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85863
SERVICIO : TRAUMATOLOGIA HSC
FECHA : 2024-06-03 11:10:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CESAR EDMUNDO CHANDIA TORRES			RUN	: 9.813.514-6
F.Nac	: 03-05-2024	Edad	: 0 AÑO, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-06	Fecha Egreso	: 2024-06-03 11:10:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. S82.8-FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

FRACTURA EXPUESTA DE PILON TIBIAL DERECHO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. S82.3-FRACTURA DE LA EPIFISIS INTERIOR DE LA TIBIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. S81-HERIDA DE LA PIERNA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. T12.X-FRACTURA MIENBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE INGLESA CON COMPLEJA FRACTURA DE PILON TIBIAL DERECHO C3 AO EXPUESTA POR MEDIAL, TRAS RECIBIR ASEO QUIRURGICO Y FIJACION EXTERNA DE URGENCIA EN HCHM CHILLÁN EL 03/05. DADO COMPROMISO DE PARTES BLANDAS ANTEROMEDIAL SE REALIZA REDUCCION Y OTS DEFINITIVA DE FIBULA Y REPOSICIOAMIENTO DE FIJADOR EXTERNO EL 09/05. CON ADECUADA EVOLUCION DE PARTES BLANDAS AUNQUE SIN RESOLUCIÓN COMPLETA DE ESCARA ANTEROMEDIAL EN ZONA DE EXPOSICION, SE REALIZA REDUCCION Y OTS DE TIBIA DISTAL MAS APORTE DE AUOTINJERTO DE CRESTA ILIACA Y SUSTITUTO ÓSEO EL DÍA 24/05, CON PLACA ANTEROLATERAL POR MISMO ABORDAJE AL Y PLACA POSTEROMEDIAL POR ABORDAJE PM TRATANDO DE ALEJARSE LO MAS POSIBLE DE ESCARA ANTEROMEDIAL Y CON COLOCACION DE PLACA ALEJADA DE DICHO DEFECTO. ADICIONALMENTE SE FIJA MALEOLOMEDIAL CON TORNILLOS CANULADOS. POSTERIORMENTE MANEJO DE HERIDA DE EXPOSICION CON CURACIONES AVAMZADAS Y PARCHE DE PLAQUETAS, CON ADECUADA EVOLUCION, ESTANDO HOY HERIDA DE APROX 2 X 3 CMS COMPLETAMENTE GRANULADA. SE DA DE ALTA PARA COMPLETAR CURACIONES AVANZADAS POR HODOM Y MANEJO ANTIBIOTICO VIA ORAL.

PLAN DE MANEJO:

CURACIONES, ATB ORAL Y REHABILITACION AMBULATORIA.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO CON PIE EN ALTO
2. NO APOYAR EXTREMIDAD OPERADA, MOVILIZARSE CON ANDADOR Ó 2 BASTONES
3. USO DE BOTA ORTOPEDICA (SOLO RETIRARLA PARA CURACIONES, DUCHA O ASEO DIARIO Y EJERCICIOS)
4. PARACETAMOL 500 MG, 2 CADA 8 HRS POR 7 DIAS
5. CELECOXIB 200 MG 1 CADA 12 HRS POR 4 DIAS
6. XARELTO 10 MG, 1 AL DIA POR 15 DIAS
7. ACIDO FOLICO 5 MG, 1 AL DIA POR 15 DIAS
8. VITAMINA C 500 MG, 2 AL DIA POR 15 DIAS
9. CIPROFLOXACINO 500 MG, 1 CADA 12 HRS POR 7 DIAS
10. CURACIONES AVNAZADAS POR HODOM DIA POR MEDIO

11. CONTROL EN POLICLINICO DE TRAUMATOLOGIA CON DR OLID EN 7 DIAS
12. CONTROL SOS EN URGENCIA

Control en: 7 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

OLID TORRES ARTURO ALEJANDRO
MEDICO TRATANTE
15905245-1

JEFE SERVICIO