



Protamina



Indicaciones:

- Revertir anticoagulación con **heparina** ante **sangrado serio (Urgente)**. Efectividad mayor en HNF que en HBPM
(100%) (50-60%)

Dosis:

Heparina No fraccionada (HNF) → SUSPENDA INFUSIÓN

1 mg por cada 100 U de HNF en las últimas 2 a 2,5 hrs
(MÁXIMO 50 mg)

Ej. 8 ml/hr = 800 U x 2 = 1600 U = 16 mg de protamina

Titular dosis según tiempo de suspensión de BIC heparina

- Inmediata: 1 mg por c/100 U
- Entre 30-60 min atrás: 0,5 - 0,75 mg por c/100 U
- >2 hrs atrás: 0,25 - 0,375 mg por c/100 U

Controlar TTPK a los 5-15 min, si aun prolongado y con sangrado, considerar nueva dosis más baja

Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM)

Enoxaparina (Clexane):

- < 8 hrs: 1 mg por cada mg de enoxaparina (MAX 50 mg)
- > 8 hrs: 0,5 mg por cada mg de enoxaparina (MAX 50 mg)

Dalterparina (Fragmin)

- 1 mg por cada 100 U de dalterparina (MAX 50 mg)

Administración: Vial de 50 mg en 5 ml (10 mg/ml) de forma directa; no requiere dilución

Lento, max a 5 mg/min (50 mg en 10 min) por efectos adversos: Hipotensión y bradicardia

Precaución: Sangrado por rebote de heparina 8-9 hrs post protamina, hipotensión

