



Idarucizumab

PRAXBIND®



Fragmento humanizado de un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a dabigatrán

Unidad: Cada vial contiene 2,5 g de idarucizumab en 50 ml
Caja contiene 2 viales

Preparación: no requiere dilución.

Administración: Infusión consecutiva de los 2 viales en 5-10 min cada uno o como 2 inyecciones en bolo.

Inicio de Acción: Rápido, en minutos. Tiempo medio de cese de sangrado: 2,5 hrs (N Engl J Med 2017; 377:431-441)

Duración de efecto: usualmente 24 hrs

Dosis: **5 g (2 viales de 2,5 g c/u)**

Indicaciones: Sangrados con riesgo vital inminente o necesidad de procedimientos urgentes en pacientes usuarios de dabigatrán. En estudio clínicos la administración fue indicada hasta una media de 18 hrs post última dosis de dabigatrán. (Si disponible, solicite tiempo de trombina). Dabigatrán sin acción luego de 2,5-3,5 días. En caso de falla renal su efecto puede prolongarse

NO REQUIERE AJUSTE EN FALLA RENAL NI HEPÁTICA

Precaución: No revierte otros NACOS. La reversión de la anticoagulación somete al paciente al riesgo tromboembólico de base del paciente. Dabigatrán puede ser reiniciado a las 24 hrs.

