



Octaplex®



Concentrado protrombínico de 4 factores inactivos

II - VII - IX - X ; También Prot C y S

Unidad: 500 U (polvo liofilizado)

(Unidades medidas de acuerdo a U de Factor IX)

Preparación: disolver polvo liofilizado en diluyente incluido (20 ml)

Velocidad de infusión: 1 ml/min x 5 min, luego 2 -3 ml/min

Administración: Directa, vía periférica o CVC.

Inicio de Acción: Rápido, descenso importante de INR en 10 min

Duración de efecto: 6- 8 hrs

Dosis: Establecida para lograr $\text{INR} \leq 1,2$ en 1 hr

Dosis variable	
INR: 2-2.5	22.5-32.5 UI/kg (0.9-1.3 mL/kg)
INR: 2.5-3	32.5-40 UI/kg (1.3-1.6 mL/kg)
INR: 3-3.5	40-47.5 UI/kg (1.6-1.9 mL/kg)
INR: >3.5	>47.5 UI/kg (>1.9 mL/kg)
Dosis Máxima: 3000 UI o 120 ml	

Estudios recientes establecen que dosis fijas de 1500-2000 U son equivalentes a dosis ajustadas por INR

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al producto, Alergia a Heparina o HIT tipo 2 (contiene heparina), Déficit de IgA con anticuerpo anti IgA

No recomendada: Alteración de la coagulación en daño hepático crónico (no estudiado), Precaución en CID

NO OLVIDE ADMINISTRAR VITAMINA K

